

EX LIBRIS
LUDOV. DAVID.
MURET,
DOCT. MEDIC. MONSP.



IO. ZACHAR. PLATNERI

PROFESSORIS MEDICINAE

NUPER APUD LIPSIENSES PRIMARI

ARS MEDENDI

SINGVLIS MORBIS

ACCOMMODATA.



L I P S I A E

SVMTIBVS CASPARI FRITSCH

MDCCLXV.

CAR. PHILIPPO GESNERO

VIRO ILLVSTRI

ET DOCTRINAE FIDEIQVE

EXPERTAE

SERENISS. ELECT. SAXON. ARCHIATRO

ET AVLAE CONSILIARIO

S. D. P

FRIDERICVS PLATNERVS

Ante duos menses, Vir Illustris, nihil tale cogitanti, libri a patre meo scripti nondum publicati, de cuius argumento narranti non constabat,

)(2

edi-

editionem a Fritschio nostro parari, forte nunciatur. Vix fidem habui, etenim, perfectum et limatum opus quod post mortem suam voluisset pater meus edi, ab eo nullum relictum esse, facile recordabar. Quare, ut, quid hoc rei esset, cognoscerem; conueni Fritschium, qui non negauit, se primas artis medendi lineas, a parente meo in praelectionum suarum usum ductas, sibi vero viri intelligentis beneficio oblatas, suis impensis ita exscribendas curare, uti in parte libri, quam videre possem, factum sit: ceterum se sperare, hunc laborem nec infructuosum sibi, nec artis medicae studiosis inutilem et minus iucundum futurum esse. Commemorabat deinde, purgandi apud me consilii sui causa, suum in patrem meum, etiam post eius mortem, amorem semper duraturum; paterni nominis

minis apud exteros gratiam; curam orationis non inuenustae, quam libri paterni ostendant; et multa simul alia, quae modesto silentio premere, quam ambiciosius repetere, malo. Etsi vero, neque verbis, neque precibus, apud Fritschium nostrum percipi, nihil tamen apud eum, imprimis ex parte libri machinis perscripta, et, opere non absoluto, piperis venditoribus omnino deuouenda, non leue damnum praetendentem, potui efficere. Urgebam, sed nequidquam; patrem omnes commentarios et aduersaria sua, Ioh. Beniam. Boehmero, inter discipulos quondam inprimis dilecto, ea conditione, vt nihil eorum in publicum emitteret, codicillis suis legasse. Fidem seruasse et illum, et alterum Boehmerum, ad quem, post fratris immaturam mortem, legatum transferit, Georgium Rudolphum,

Vitebergam fama eruditionis suae or-
nantem. Penes hunc Patris exem-
plum, et metuendum esse cuilibet libra-
rio, ne si in apographum parum accu-
ratum inciderit, et paternam memo-
riam iniuria afficiat, et lucri spem de-
ponere cogatur. At, vt aiunt, furdo
narrabatur fabula, et erat in Fritschio
nostro in doctrinam patris nomenque
fiducia ea, quae, etsi minorem in hac
caussa forte optassem, displicere ta-
men filio non posset. Narrabat prae-
terea, se aliquot doctos huius vrbis
medicos, externos etiam, quorum au-
ctoritatem sequi, sine periculo suo,
et paterni nominis, possit, super hoc
libro consuluisse; omnes librum eden-
dum censuisse, non parum vtilitatis
sine dubio artis medicae studiosis al-
laturum; sperare se ideo, me consilio
in patris mei nec odium, nec iniu-
riam, suscepto, obfuturum amplius
non esse.

Quid

Quid ergo faciam Gesnere, Vir Illustris, animoque meo carissime! victus sum, victus sum, inquam, Fritschii viri boni humanitate, qui nullis argumentorum armis vinci posse persuasus, animo non nihil commoto, et vt ingenuè fatear, propemodum irato, ad eundem veneram: Imo passus sum, librum machinis perscribi, perscriptumque edi: ea tamen lege, vt nec filiorum, nec ceterorum heredum, nec Boehmeri V. D. sed solius librarii voluntati hanc quidem editionem deberi, liceret mihi in limine libelli monere lectores.

Sic ergo hic liber abit in orbem, destitutus tamen omni, vel ipsius scriptoris, vel alius in eodem genere, e quo scriptus est, docti hominis commendatione. Enimuero fin et ego abiturum sine litteris commendatitiis dimittam, vereor ne in patrem opti-

me de me meritum, cuius pectus honesto generoso incoctum erat, memoria vero sancta mihi semper futura est, piaculum committere, bono cuique viro, videar.

Cui autem, si in mea commendatione nonnihil facultatis sit, lubentius commendem? aut cui potius confidam, quam Tibi, Vir Illustris, quem et ex animi sententia amo atque diligo, et a quo scio me vicissim amari? cui commendem lubentius? quam Gesnero, paterni amici, et benevolentissimi mihi viri filio, humanitate, urbanitate, doctrina, elegantiaque, magno isti Iohanni Matthiae, cuius ossa molliter cubent! simillimo?

Atque profecto apud Te hic liber eo faciliorem aditum habiturus est, quo minus eundem ab orationis puritate intellexeris abhorrere: cuius studio pater meus Gesnerorum, Ernesti-

nestiorumque arctissimam suauissimamque sibi, vtilissimam a prima aetate mihi, familiaritatem et perennaturas eorumdem laudes consecutus est. In orationis autem genere, quantum ego quidem iudicare valeo, hic liber plerosque forte superabit; est enim satis purum, maxime perspicuum, et neque breuitate nimis compressum, neque verborum copia laxum, tiro-num denique ingenii in primis accommodatum, quos tamen saepe perspicuitas magis, quam nimia elegantiae cura iuuat. Quod velim non minus recordari nimis seueros Grammaticos, quam curatiorem limam huic libello, scriptore suo orbato, contigisse nunquam.

Ecce ergo Illustris Gesnere, hic liber, qualiscunque demum sit, post mortem auctoris ad Te venit, benevolentiam tutelamque Tuam, me qui-

dem interprete, rogaturus, Num vero ea negaueris libro Platneri? quem Tu saepe apud me professus es, Te inter multos Tuae artis scriptores diligere. Num negaueris mihi? Tui amantissimo homini! Gesnerus non sis, si hoc possis.

Atque hic liber Tuo fauore praefidioque maxime indiget, ne scriptoris sui memoriae obsit magis, quam profit. Non leue enim periculum probabilibus scriptoribus contrahitur, si libri nondum perfecti, et limae magis, quam publicae luci, ab iisdem destinati, eorum tamen nomine in fronte, hederæ in modum, appenso, edantur. Quod solemne est librariis, qui non raro etiam ab viris claris praefationes commendatitias emendicant, exornandis nouitiis scriptoribus iisdemque facilius frequentiusque vendundis accommodatas. Atque frequenter

quenter bonis, copiosis, vendibilibus-
que scriptoribus accidit, vt librarii
morti ipsi, a vendendi et lucri facien-
di opportunitate eosdem excludere
conanti, vehementer repugnare vi-
deantur, et Vespasiano, lucri odorem
e re qualibet bonum putanti, similes,
istos viros, quamuis mortuos, nolint,
et cum iis rei familiaris augendae op-
portunam occasionem e manibus suis
dimittere, sed schedis potius vndique
collectis, iisque forte ab ignoto ho-
munculo ordinatis, tali rudi indige-
staque mole libros, minuendae ma-
gis auctorum famae, quam conser-
uandae idoneos, curent exaedificari.
Atque ii profecto non dissimiles sunt
parasitis, quibus, si forte per nu-
ptiarum aut aliam occasionem aliquot
dies lautissimo potu ciboque vfi sint,
non prius e nuptiali domo abire so-
lemne est, quam omnibus adeo co-
quorum

quorum coquarumque loculis ita curiose excussis, vt certi esse possint, gulae suae nihil amplius sperandum superesse.

Id vero non huius libri caussa, in cuius limine Te, Optime Gesner, alloquor, dictum sit. Nam profecto pater meus non pertinet ad Polygraphos, quod genus hominum, si quidem multos libros vendibiles ediderunt, librariorum studia inprimis incendit: deinde Fritschius noster, vt Tu, Vir Illustris, optime nosti, eo est animo, vt honesto nunquam anteponat vtile; neque tamen alienum visum est, ista hoc loco vel propterea commemorare, vt patefiat, non vanum esse metum patrem amantis filii, librum paternum, quem sciat ab ipso auctore nondum publicae luci fuisse destinatum, edi aegre patientis,

tis, inprimis fin sit ex eo genere, de quo ipse iudicare non possit, vir etiam desit doctus et clarus, qui praestare vtilitatem et fauorem libro sui nominis fide velit. Et bone Deus! quomodo tandem, dignusne sit hic liber, qui edatur, an indignus? sciam ego, quid iuris Professori cum morbis? quos ignorare vel nomine malo, quam meo incommodo eorum naturam, et iis medendi rationem, etsi salutarem, molesta experientia pernoscere. Quare hoc mihi non fumo, quod si fumere velim, nemo facile det, vt me super huius libri pretio statuere posse putem; sed hoc moneo lectores, hoc Te, Vir Illustris, vehementer obtestor, vt, quantum possis, ipse moneas Tuae artis peritos, hunc librum scriptum forte ante triginta annos, quamuis postea per praelectionum opportunitatem inter-

interdum auctum et emendatum,
scriptore eius ante octodecim an-
nos mortuo, nunc demum ex apo-
grapho prodiisse. Quod inprimis
monendum propterea putavi, quo-
niam morbis medendi rationem per
viginti annos mutatam et auctam ef-
fe, inuentis plerisque, quorum men-
tio in hoc libro fieri non potuit, e
doctissimis viris et audiui, et ex
actis diurnis cognoui. Quare, quae
in hoc libro aliter dici non potue-
runt, si praesenti artis Tuae disci-
plinae non omnino conuenire vide-
ris, noli temporis, quo scriptus liber,
quo mortuus est Platnerus, obli-
uisci. Ceterum non diffiteor, me e
doctissimis Medicis iisque non pau-
cis, inter quos, vt viuentes taceam,
erat profecto Tui ipsius, id est, ae-
quissimi viri iudicio, Iankius, com-
munis amicus noster, cuius morte
magnae

magnae et iustissimae spes Lipsiae
meae interceptae sunt, saepe au-
diuisse, artem morbis medendi, a
Parente meo adumbratam, ita be-
ne scriptam esse, ut dolendum sit,
eum librum publica luce arceri. Id
num ex animi sententia dixerint?
Tu Vir Doctissime videris, cuius iu-
dicium, quamvis, quod vel Prin-
cipalis fiducia et honorifica Tibi,
et Saxoniae, principes suos opti-
mos amanti, salutaris, docet, in hoc
genere acutissimus sis, patris causa
non metuo; quod scio eius memo-
riam Te malle confirmare laudando,
quam carpendo labefactare.

Ita vale Doctissime Gesnere, hunc
librum optima lege Tibi addictum,
me ipsum item Tuum, fratrem etiam
meum, Ernestum, nuper *Ludwigii*,
Medici apud nos primarii, Virique
Cele-

Celeberrimi, auctoritate et institutio-
ne vberima, primis artis medicae
honoribus donatum, quem non mi-
nus ac me ipsum summa Tui fiducia
tenet, commendatissimos Tibi habe.
Atque ita quidem vale, iterumque
Optime Gesnere vale! Scripsi in
Acad. Lipf. a. d. XVI. Septembr. a. c.
cIo Io CCLXV

Q. D. B. V.



Q. D. B. v

PROLEGOMENA.



§. 1.

Praxis clinica est illa Medicinae pars, quae ea, quae in Institutionibus, videlicet Pathologia, et Semiotica, nec non Therapeutica et Diaetetica, tradita fuerunt, singulis morbis accommodat, et, quomodo singuli cognosci et curari debeant, docet. Siue, est illa disciplinae medicae pars, quae docet morbum praesentem detegere et curare.

§. 2.

Complectitur itaque singulorum morborum historiam, Aetiologiam, Symptomatologiam, Diagnosin, Prognosin, et medendi Methodum, additis nonnullis praeceptis particularibus, quas vulgo Cautelas vocant, et quas docuit Experientia.

§. 3.

Auxilia petuntur ex triplici fonte. Curamus enim morbos viâ, seu rerum non naturalium usu, pharmacis,

A

et

et manu; seorsim traditur Chirurgia. Haec potissimum manu ferramentisque curat, sed hodie Chirurghi plurimum quoque morborum curationes suscipiunt, quae solis medicamentis, praecipue extrinsecus admotis, absoluuntur.

§. 4.

Nemo Praxin clinicam discere potest, nisi animum illius modo dictis disciplinis bene praeparatum et cum his etiam cognitionem habeat Materiae medicae, Chemiae, Pharmaceuticae, et nisi medicamenta in aptis concinnisque formulis possit recte componere.

§. 5.

Arti nostrae semper nocentissimae fuerunt Hypotheses, et his superstructa Systemata. Et in genere nimium philosophandi studium. Praestat diligens et sine praconcepta opinione facta observatio, causarumque proximarum cognitio, quibus post medendi ratio accommodata sit.

§. 6.

Legendi sunt boni Autores, inter Veteres prae aliis Hippocrates, Celsus, Aretaeus, Alexander Trallianus, Celsus, Aurelianus; inter Recentiores Fernelius, Hollerius, Duretus, Nicolaus et Carolus Pisones, Ballonius, Petrus Forestus, Schenckius, Tulpius, Sydenhamius, Stahlus, Hoffmannus, Boerhaavius.

§. 7.

Tirones caueant, ne legant Autores, qui rariores morborum historias scripserunt. Nam prius ex LOMMIO aliisque noscendae sunt morborum simplicium historiae, post tandem ad rariora transeundum est.

§. 8.

Nihil discantibus nocentius est, quam si audiant legantque magistros, qui in confutandis aliis diligentiores sunt, nunquam vero Autoribus vel aliis debitas laudes tribunt.

§. 9.

§. 9.

Oportet, si fieri potest, eum, qui arti studeat, lectulos aegrotantium frequentare, ut, praecunte magistro, morbis mederi discat. Sunt, qui, si ad aegrotos veniunt, putant, se in alium terrarum orbem delatos.

§. 10.

Vt Pharmaceuticam discat, sedulo adeat officinas, et videat, ne errores in scribendis formulis committat.

§. 11.

In morbis chronicis cognoscendis plurimum semper iuvat corporum post mortem sectio. Quibus deest frequentior occasio, legant BONETI *Sepulchretum*.

§. 12.

Medicus vero, qui iam aliis mederi vult, vitam viuat sine omni scelere puram, et omnia agat ex intemerata conscientia, pius sit, haud superstitiosus.

§. 13.

Medicus sit humanus, mitis ac comis et vere gratus. Displicet nimia seueritas et taciturnitas. Saepe tamen apud prudentiores haud minus nocet verula garrulitas. Distinguendi sunt homines, et his etiam accommodandi familiares sermones. Taciturnitas, qua ea, quae aegris ignominiosa esse possunt, celantur, vel maxime necessaria est.

§. 14.

Omni opere enitendum est medenti, ut aeger habeat fiduciam.

§. 15.

Odiosa est rerum propriarum gloriosa ostentatio aliorumque contemptus.

§. 16.

In contemptum veniet Medicus, qui serui ministerio aegrotantium et Magnatum fauorem aucupatur, et nimis officiosus est.

§. 17.

Lotii examen interdum valde necessarium est, nec apud Magnates inspectionem aluiarum foccum, si necessitas requirit, recusare Medicus potest; hoc tamen praeter necessitatem haud fiat. In plebeiis ab aliis sciscitandum est, quae-
nam fuerint deiectiones.

§. 18.

Vocatus adsit promptus, etiam, si necessitas postulat, tempore nocturno; caueat tamen, ne nimis frequenter aegrotos inuisat. Distinguendum est inter acutos chronicosque morbos. In acutis saepe valde necessarium est, ut Medicus aliquoties aegrum inuisat et attentius obseruet omnia.

§. 19.

Pauperibus opem ferat, et vel paucio fostro contentus sit, vel illis gratis medeatur.

§. 20.

Cultum corporis non negligat. Veste indutus sit decora, non nimis splendida; intolerabilis est Medicus, qui vel male, vel bene olet. *Non bene olet, qui semper olet.*

§. 21.

Sit nec temerarius nec timidus, et caueat, ne hanc de se opinionem faciat.

§. 22.

Nil turpius est in Medico, quam ebriositas.

§. 23.

Omnia consideranda sunt in aegro, quem inuisit Medicus. Sexus, in foeminis menstruorum fluxus, gestatio, partus, aetas, corporis habitus, vitae genus, labor corporis et animi, victus, luxus, sobrietas etiam et diosyncrasia et temperamentum, solidorum robur ac infirmitas, fluidorum quantitas, et quae in his esse solet varia acrimonia. Prudentis Medici est, nec ea ignorare, quae aeger celare vult, si ad morbum aliquid faciunt.

§. 24.

§. 24.

Simul debet considerare coelum, in quo viuit aeger, vrbium ac prouinciarum situm, atque aëra et aquas, et qui in iis regionibus sunt morbi epidemici et endemii. Nec minus necessaria obseruatio est conclauis, in quo decumbit aeger. Animaduertere etiam debet anni tempora ipsasque tempestates. Ex his optimae aequales, siue frigidae siue calidae fuerint, pessimae, quae maxime variant. CELSVS *Libr. II. Cap. I. HIPPOCRATES de aëre et locis.*

§. 25.

Ex aegro etiam sciscitari debet, quacnam morbi fuerint initia? quanam fuerint praegressi alii? qua ratione hi curati? Quacnam ante morbi ingressum aegro euenerint? v. g. animi pathemata, vigiliae, error in aëris mutatione, victu, et in omni rerum non naturalium vsu. Minora non negligenda, v. g. vestium aut stragulorum subita mutatio aliquando morborum grauissimorum causa est. Inter nocentia sunt etiam, quae extrinsecus corpori admoventur.

§. 26.

Porro Medicus considerare debet motus actionesque vitales, pulsum, respirationem, actiones naturales, appetitum, nauseam, sitim, praecipue varias excretiones, tum naturales, tum morbosas, et excretorum materiam ac mutationes, nec non omnes animales humanasque actiones. De omnibus praecepit Semiotica.

§. 27.

Prae caeteris in omnibus morbis alui ratio habenda est, in foeminis adultis et iunioribus menstruorum.

§. 28.

Si partes solidae affectae sunt, videat, quacnam pars sit, quae aegrotat, num cutis, adeps, musculus, tendo, nervus, glandula &c.

§. 29.

Ex his collatis intelligere poterit, qualis sit morbus. In hoc tamen definiendo, nec non in prognosi formanda,

non nimis praeceptis sit. Aliquando praestat, Medicum, si nondum veram morbi notitiam habet, vel de eo adhuc dubitat, quiescere, vel quaedam, quae minoris efficaciae sunt, dare, et interea omnia diligentius observare, vel domi collatis omnibus, quae observauerat, morbi naturam eruere. Sciendum enim est, morbos plerumque compositos esse, non raro corruptos.

§. 30.

Vbi adhuc de morbo dubitat Medicus, hoc occultandum est aegro, ne hic de medentis peritia dubitet.

§. 31.

Medicamentis utatur paucis, aut selectis, bene praeparatis. Plus tamen fidat rationali medendi methodo, quam magnificis de specierum virtute pollicitationibus. Minime negligat Diaeticam. Medicum decet consilio esse potentem ac promptum, non vero medicamentorum, saepe inutile ac nocentium, farragine ac varietate molestum.

§. 32.

Auxilia bene distinguat. Ridiculum est, si Medicus morbos, qui scalpelli opem postulant, se pharmacis curaturum esse pollicetur.

§. 33.

Morbos desperatos curandos haud suscipiat, nisi formata prognosi.

§. 34.

In formanda prognosi cautus sit; nec facile ipsi aegro mors praefagienda est.

§. 35.

In ipsa curatione, rationem sequutus, ante omnia morborum causas, si fieri potest, tollat, non vero symptomata, nisi vrgeant.

§. 36.

Natura hominis *ἀνθρώπου* est. Hoc qui ignorat, maximam artis partem ignorat. Gloria prima Medici servitus, i. e. scit Medicus, se naturae servum esse.

§. 37.

§. 37.

Medicus vero, qui naturae in curandis morbis, maxime chronicis, nimium tribuit, ac fere soli confidit, ineptus est, et parum proficit.

§. 38.

In curandis morbis vitur natura auctis motibus vitalibus, naturalibusque inprimis excretionibus. Decet Medicum, hanc imitari, et, inprimis in acutis, magis sollicitum esse de iuuandis se- et excretionibus, quam de corrigenda materia. Nec tamen prorsus haec negligenda est.

§. 39.

In corrigenda materia plurimum confert victus, maxime in morbis chronicis.

§. 40.

In acutis diligens obseruator sit crudtatis, coctionis, criseos, temporum criticorum. Hoc etiam in chronicis necessarium quandoque est.

§. 41.

Si excretiones moliri oportet, videndum, vt materia mobilis sit. Haec quandoque talis est ab initio, vbi turget, saepius coctione mobilis redditur. Excretiones fiant per loca congrua. Etiam videndum est, vt, dum vna excretio augetur, altera non prorsus vel nimium cohibeatur.

§. 42.

Non turbandae sunt criticae euacuationes, cauendum vero, ne eas, quae ab aliis causis proficiuntur, pro criticis habeamus.

§. 43.

Virium summa ratio habenda est, illacque conferandae sunt, magis tamen congruo regimine atque victu, quam medicamentis cardiacis. Aliquando debilitas necessaria est, quam si tollit Medicus cardiacis, aegrum occidere potest, e. g. in haemorrhagiae metu.

§. 44.

Vigente morbo et paroxysmo, abstinendum a mouentibus et euacuantibus, si quaedam mouenda sunt; in febribus

bus acutis hoc fiat a primis initiis, et in intermittentibus tempore intercalari.

§. 45.

Si heroicis medicamentis medendum est, caute hoc fiat, nec ad illa praeter necessitatem properandum.

§. 46.

Male agunt, qui vix non quotidie medicamenta mutant, nec non illi, qui praeter necessitatem nimis pretiosis vtuntur.

§. 47.

Nausea aegrorum, qui omnis generis medicamenta auersantur, expugnari debet variis blandimentis, vehiculo mutato, et ad palatum accommodato.

§. 48.

Frequens est medentibus et aegris fallacia causae, vt causae, a qua tamen cauendum.

§. 49.

Caueat sibi Medicus, ne decipiatur a mendacibus aegris; ipsa enim eius methodus dubia reddi potest.

§. 50.

In praescribendis formulis accurationem adhibeat, et medicamenta, quae nocere possunt, literis, non characteribus exprimat.

§. 51.

In perhibendis testimoniis non facilis sit. Sibi caueat, ne ab eorum, qui talia sibi expetunt, fraudibus decipiatur.

§. 52.

Post superatum morbum, victum atque regimen conueniens imperare debet.

§. 53.

Si soltrum exigendum est, distinguendi sunt aegrotantium mores, opes aliaque.

§. 54.

Semper medentem eo eniti oportet, vt, tum obseruatione propria, tum bonorum Auctorum lectione indies magis in arte proficiat.

DE

DE FEBRIBVS IN GENERE.

§. 1.

Febbris est morbus, omnibus hominibus frequentissimus, vniuersalis, cum eo totum corpus afficiatur. Est febris vel idiopathica, vel symptomatica. Distinguunt nonnulli ideo in febres et morbos febriles, seu, qui sunt cum febre. Talis est inflammatio, quae sine febre esse nequit. Distinguuntur febres in chronicas et acutas. Acutae non solum celerius finiuntur, sed habent etiam periculum. Lenta tardius finitur, sed est cum periculo. Alia distinctio est in intermittentes, continuas, continentes. Alia inter epidemicas, et inter simplices vel sporadicas.

§. 2.

In omni febre omni tempore velocior pulsus, seu celer et frequens. In febre ab internis causis antecedit spastica contractio, quae si vehemens fuerit, est et cum horrore. Etiam sub horrore pulsus velox est, sed debilis. Igitur febris a causis internis ortae signum pathognomonicon est pulsus velox, horror, et qui hunc insequitur aestus. Velocior sanguinis motus ab excitatione, vel assumpto calido, vel extrinsecus irritante, ortus, est sine praegresso horrore.

§. 3.

Horror absoluitur spastica contractione nervorum, praecipue spinalium et organorum motui voluntario interuentium. In his musculis magna esse solet debilitas, cum oscitatione, pandiculatione, frigore, pallore, rigore, sensus imminutione, et tandem, si ille motus vehementior est, tremore, ac quasi conuulsione.

§. 4.

In horrore itaque febrili oritur illud frigus, quod etiam tactu sentimus, ex eo, quod spasmio illo sanguis magis

IO DE FEBRIBVS IN GENERE.

versus cor exprimitur, et quod cor non satis valenter contrahitur: Physiologia enim docet, calorem in corpore oriri ex motu et attritu sanguinis elastici et vasorum retinentium.

§. 5.

Debilitas oritur a denegato influxu fluidi arteriosi et neruei in musculos, propter quam causam etiam sensus imminuitur.

§. 6.

Pulsus velox signum pathognomonicon febris est, quod omni tempore manet. Nam horror et aestus non semper. Pulsus hic etiam sub horrore, sed in quartana aliquando pulsus rarus et tardus ac debilis sub horrore videtur. Sed tunc pulsus magis est inaequalis. Nam tardi sunt maiores pulsus, intermedii plures celerrimi. Pulsus velocior oriri videtur, quia multus sanguis circa cordis ventriculum dextrum congeritur, et quia etiam sanguis maiori in copia fertur in arterias coronarias, dum ille per minores arterias in peripheria corporis, durante illo spasmo, haud libere mouetur. Debilis vero contractio cordis oritur, ut videtur, a minori influxu fluidi neruei per nervos cardiacos, et hoc fit, quoniam sanguis in motu suo impeditus, non, ut decet, ad cerebrum adpellitur.

§. 7.

Sub horrore oritur anxietas praecordiorum et difficilis respiratio, quia pulmones sanguine replentur. Pallor faciei et totius corporis oritur, quia sanguis illo spasmo externo versus interiora vrgetur. Pallor magis conspicuus est, ubi cutis vel nulla, vel tenerior est, in labris, genis, et sub oculis. Sub vnguibus sanguis quasi haerere et quiescere videtur, unde mutatio coloris in magis obscurum.

§. 8.

Omnes, qui febre intermittente moriuntur, extinguuntur sub horrore, non sub aestu, et qui ex febribus continuis, praecipue inflammatoriis, et orta gangraena pereunt,
ante

ante mortem nouo horrore et spasmo commouentur. Pessimum est, si aeger intus summum aestum sentit, frigentibus externis. Oritur hoc, si humida corporis per diathesin inflammatoriam ita coacta sunt, vt per minima vasa, a corde remotiora, moueri nequeant.

§. 9.

Post horrorem sequitur aestus, qui non a veloci solum, sed valido etiam cordis motu proficiscitur. Quia vero tamen, si ab initio spasmus nondum prorsus remisit, est maior renisus in arteriis, vehementiorque attritus, et ob id caloris augmentum.

§. 10.

Calor bonus est, si per corpus omne aequalis; si vna pars prae altera calet, id peius est, et in febre metuenda huius inflammatio, vel haec iam praefens est.

§. 11.

Calor aliquando adeo vehemens est, vt fere eandem vim habeat, quam ignis elementaris, cuius rei testimonium est anthrax pestilentialis.

§. 12.

In hecticis calor fere continuus est, sentiunt tamen aegri remissionem et exacerbationem. Calor in his eo tempore augetur, quo nouus chylus, quamuis etiam paucus, sanguini admiscetur, qui veluti humor crudus ab infirmis visceribus subigi non potest, et hunc nouum motum excitat.

§. 13.

Quo maius frigus est in febris accessione, eo maior plerumque metuenda est febris.

§. 14.

Differentia est inter hos duos motus, a quibus frigus et calor proficiscuntur. Prior proficisci videtur a causa continente et proxima febris, alter a vi vitae seu natura, qua illa expugnatur.

§. 15.

§. 15.

Tandem post aestum, tum in paroxysmis, tum periodicis febrium, remittit illa spastica contractio. Pulsus, qui durus erat, mollior fit, et mitigantur symptomata, fiunt salutares excretiones. Haec omnia vero contingunt, si febris in salutem tendit.

§. 16.

Quod ad exitum febrium pertinet, illa saepe sponte curatur, si non turbata, nec a mala causa orta fuerit. Imo febris saepe corpus ab aliis grauioribus noxis tutum praestat. Febre virus contagiosorum et epidemicorum morborum expellitur. Per intermittentes, quartanam praecipue, *desperati caeteroquin morbi*, melancholia, mania et epilepsia etc. curantur.

§. 17.

Febris itaque vel in sanitatem tendit et corpus ab inhaerente malo liberat, vel finitur morte, vel mutatur in alium morbum.

§. 18.

Soluuntur febres vel crisi, vel excretionem pedetentim facta, quam λύσις seu solutionem proprie vocant, vel mutatione materiae peccantis in benignam, sine excretionem, quam Therapiam assimilationem vocant. Hoc vltimum raro contingit. Exemplum dare potest v. g. febris a vehementissima siti orta, si coacti humores aqua copiosius ingesta diluuntur.

§. 19.

Causa mortis in febribus haerere solet in minimis vasculis, in quibus fit obstructio. Nam a lentore febrili fieri potest obstructio, inflammatio, gangraena. Idem oriri potest a causa contraria, nimium resolutis humoribus, si isti in arterias laterales feruntur, quibus plerumque accedit acrimonia. Hoc praecipue fit in visceribus.

§. 20.

§. 20.

Febris mutatur in alium morbum, si materia peccans nec perfecte immutari, nec penitus eliminari potuit. Id quod fit, si vires deficiunt, quae saepe peruersa medendi ratione conuelluntur, si partes solidae atonia laborant, si materia peccans copia, acrimonia, et nocendi facultate, vel etiam idiosyncrasia peccat. Ex his febribus fiunt exanthemata, tumores, erysipelas, abscessus, cacoehymia, et, si mala materia in partes nobiliores conuertitur, cachexia. Nam febris, etiam intermittens, praecipue in corpore imbecillo, si diutius toleratur, humores inuertit, et non raro in cachexiam degenerat.

§. 21.

Febrium causa proxima et continens non satis nobis nota est. Sufficit Medico, nosse, in corpore viuo eam esse conditionem, vt, datis quibusdam corpori aduersus, excitetur hic motus.

§. 22.

Causae remotiores admodum variae sunt. In genere omnes res non naturales, aër calidus, frigidus, nebulosus, paludosus, effluuiis variis et incognita morborum epidemicorum causa fretus, tempestatum vicissitudo; cibus et potus, copia, acrimonia, duritie peccans, fames, vigiliae, nimia et corporis et animi exercitatio, quies, animi pathemata, Venus, aliae euacuationes immodicae, retenta, insensibilis transpiratio, sudor, vrina, bilis acris; humor quiescens, et qui per quietem et corporis calorem corrumpitur, pus, sanies, ichor, vermes, calculi et omne quod dolorem excitat, siue intus haereat, siue extrinsecus admoveatur; venena, medicamenta. Vna ex frequentioribus causis est obstructio in corpore viuo, maxime sanguinis.

§. 23.

A turbatis actionibus vitalibus, a quibus naturales, animales et humanae dependent, fiunt symptomata febris. Sunt quaedam, quae febribus essentialia sunt, v. g. velocior pulsus

pulsus in omni febre ardente, delirium in phrenitide. Alia vero sunt *ἐπιγεγόμενα*, seu accidentalia, v. g. conuulsio in illis ipsis febribus, delirium in febre intermittente vel catarrhali. Saepe symptomata essentialia faciunt ad expugnandam materiam peccantem, v. g. exanthemata in nonnullis febribus. Alterum genus symptomatum morbum acerbiores facit. Priora diagnosin dant, vltima prognosin.

§. 24.

Symptomata cum febre finiuntur, quibus raro medendum. Si tamen illa, praecipue *ἐπιγεγόμενα* seu accidentalia, et quae ad morbum non pertinent, suspecta videntur, et maius periculum, quam ipse morbus, adferre possunt, illis medendum est, ita tamen, vt non nimis celeriter illa cohibeamus, sed pedetentim.

§. 25.

In acutis symptomata critica quandoque fiunt, non sine magno impetu et timore. Hoc incidit, quando materia peccans, febre mobilis reddita coëtaque, nouas vias vasaque ingreditur, id quod sine magna mutatione fieri nequit. Haec symptomata sequitur vel mors, vel morbi repentina solutio seu crisis. Dignoscuntur ex praegressis signis coëtionis, et si illa iusto tempore, quo morbus solui consuevit, seu tempore critico fiunt; haec nunquam a Medico turbanda sunt.

§. 26.

Inter symptomata est anxietas, quae oritur ab impedito humorum transitu, maxime, si aliquid est, quod obstat, quo minus sanguis possit ex corde in arterias libere pelli. Frequentius id haeret in pulmonibus, si illud in aortae finibus est, sub finem etiam fit redundantia ad pulmones. Obstacle illud oritur vel vitio humorum minus mobilium, vel vasorum minus permeabilium. Frequentius hoc fit propter spasmus, aliquando ex aliis causis. Igitur in febribus inflammatoriis ab obstructione summa anxietas, quae augetur, si lentor ille inflammatorius increfcit, vel maxime,

maxime, si gangraena aliquam partem, tanto magis a corde propiorem, occupat. Sunt vero aliae anxietatis causae; si polypus in corde haeret, si excitatur paulo velocior sanguis per exercitationem motus, oritur summa anxietas. Alia oritur, si ventriculus, duodenum, colon, ab assumptis, a flatibus, foecibus, distenduntur; vel si ventriculus, et eius cardia, spasmo contrahitur, quare in omni vomitu anxietas. Spasmo etiam aliae partes, praecipue viscera abdominis, afficiuntur, et his omnibus sanguinis liber circuitus prohibetur, id quod hypochondriacis et hystericeis frequens est. His ultimis summa anxietas, si pharyngis musculi spasmo constrikti sunt et simul glottis arctata. Interceptus sic aer in oesophago, si per ructum exploditur, soluitur momento temporis anxietas. Si a ventriculo et colo, distentis, diaphragmatis motus impeditur, noua anxietatum causa est. In omni aestu febrili, quoniam sanguis in pulmone coaceruatur, est anxietas; id multo magis in peripneumonia.

§. 27.

Ab hac anxietate *dyspnoea*, quae se manifestat suffiriis, corporis iactatione, frequentiori, quam aegri anxie exoptant, loci leclique mutatione, quae pessima in acutis signa sunt.

§. 28.

Sitis fluidorum, praecipue frigidorum, appetitus vehemens, oritur ab anhelosa respiratione, quae in faucibus omne fluidum abstergit, et ab ipso humore, qui aestu febrili glutinosus, acris et alcalescens fit.

§. 29.

Nausea et vomitus interdum eandem habent causam, quam anxietas. Si sanguis difficiliter per neruolum ventriculum mouetur, vel, si hic, id quod in exanthematibus fit, et partes huic vicinae inflammantur. Vomitus enim et nausea etiam fiunt, si musculorum abdominis aponeurosis grauiter laesa fuit; etiam a male affecto cerebro, et meningibus,

gibus vomitus, id quod testantur vulnera capitis. Ob id nausea iis, quibus infuetum est naui vel curru vehi. A spasmis a quacunque causa in abdomine, id quod docet nephritis. Frequentissima tamen causa est, quae inhaeret ventriculo, vel ab assumtis, vel si vitiiati humores ex vasculis excretoriis, praecipue ex duodeno, in eum infunduntur. Etiam propterea ex diuturna inedia, nausea ac vomitus. Nauseam et vomitum etiam efficiunt ea, quibus gula irritatur, id quod saepe ab alcalescente glutinosa pituita fit.

§. 30.

Debilis, seu impotentia exercendi motus musculares sine dolore, oritur, si fluidum nerueum et sanguis arteriosus non libere mouentur ad musculos. Hoc ex variis et contrariis causis accidit, a defectu boni succi, post graues euacuationes, vigilias, inediam magnam, diuturnumque morbum. Etiam accidit ab abundante humore in plethoricis, a sanguine turgesciente et rariori facto; quare debilitas a potu spirituofo et narcoticis. Nam distenta corticis cerebri vasa premunt medullam cerebri. Notum est, debilitatem summam et paralyfin a compresso cerebro, medulla spinali, neruisque oriri. In febribus debilitas, si fluida in coagulum versa impediunt liberum sanguinis transitum ad cerebrum. Summa debilitas, si materia peccans ad cerebrum delata est, quae vel parit delirium, vel somnum et summam debilitatem.

§. 31.

Periculosa et saepe funesta debilitas in malignis est, ex qua etiam praecipua diagnosis peti solet. Huius causa non ita manifesta est. Sanguis in his rarior, valde rubicundus, et ita solutus, vt nec post mortem cogatur. Multum augetur debilitas sanguinis missione et aliis euacuationibus, quae plerumque in malignis periculosae. Pulsus esse solet velox, ast, pro ratione febris et periculi, debilis. Verisimile videtur, in his febribus praecipue affici teneriores humores, et imprimis debilitari neruos. Forte blandum illud, quod in humoribus naturaliter esse solet, et instaurando succo nerueo

neruo inferuit, in hoc sanguine deficit. Forte etiam a sanguine rariore nimium distenduntur corticis cerebri vasa, et his premuntur fibrae medullares. Debilitas etiam summa ab assumtis, et adhuc in ventriculo haerentibus venenis.

§. 32.

Aestus saepe nimium augetur, imprimis in ardentibus. Hunc indicant aegrorum querela, lingua arida, nigricans et aspera, respiratio celerior et difficilis, halitus ex ore calidus, vrina rubra pauca. Medicus illum sentit tactu. Admoueri etiam aegro potest thermometron, idque etiam in eius os immitti. Intenditur aestus ab assumtis calidis, aëre calido, et quibuscunque extrinsecus admotis, quae solida irritare possunt, maxime stragulis ponderosioribus. Aestum etiam auget, si maior renixus est in vasis, qui cordis robore superari debet. Quare id incidit, si humores propter crassitudinem difficiliter mouentur, et praecipue in lentore inflammatorio.

§. 33.

Delirium oritur a male affecto cerebro, et si sanguis per illud celerius mouetur. Etiam si materia quaedam acris facta *metastasei* ad cerebrum fertur. Hinc ab exanthematibus, podagra, repressis, et a retentione vrinae delirium.

§. 34.

Somnolentia in acutis, et Carus, seu profundissimus somnus, a quo aegri difficiliter excitantur, cum febre et sui obliuione, oritur a compressa medulla cerebri. Carus igitur post magnum delirium vix non semper lethalis, quia significat corticis gangraenam. Idem symptoma oritur, si a sanguine euasato, vel ab alio humore, vel a caluaria fracta et depressa, premitur cerebrum. Somnolentia etiam a defectu laudabilis humoris post quamlibet grauem euacuationem, ab humoribus lentis, mucidis, qui difficiliter per cerebrum mouentur, in catarrhis, et a frigore externo.

§. 35.

Coma ἀρεπνώδες, seu Veternus, Coma vigil, dicitur, quando aeger magno dormiendi desiderio laborat, dormire autem nequit, et mox iterum expergiscitur. Causa est, si in febre vna pars cerebri valde obstructa est, et per alteram sanguis nimia celeritate mouetur. Igitur est symptoma etiam Hemiplegiae. Plerumque desinit in Carum funestum.

§. 36.

Somnus etiam est quasi criticus, post criticam euacuationem, vel etiam sine hac; si cum aliis bonis signis, aegri post somnum longiorem profundiorque conualescunt. Frequens hoc est in infantibus. Causa huius somni est defectus boni humoris, ad secretionem in cerebro necessariam, qui hoc somno, post superatam materiam peccantem, instauratur.

§. 37.

Conuulsio est inuita et violenta musculi contractio, cum alterna relaxatione. Fit ab omni causa, qua vel cerebrum et eius medulla, aut nerui afficiuntur. Prior idiopathica, altera symptomatrica, dicitur. Posterior, minori neruo grauiter irritato, quandoque oritur, et conuellitur totum corpus. Probant id vulnera venenata. Celerius et frequentius conuelluntur pueri et infirmi.

§. 38.

In febribus itaque, si conuulsio incidit, distinguere oportet tempora. Ab initio nerui distenduntur a quauis causa, qua illi irritantur, maxime a materia peccante in exanthematicis. Saepe enim exanthematum eruptione finitur, et post febres plerumque. Sine malis symptomatibus sunt. Si orta fuit ab humore quodam, qua parte euasato, non cessat, nisi illo emisso.

§. 39.

Pessima conuulsio in acutis, quae oritur a lentore inflammatorio, et, si sanguis non libere per cerebrum mo-
verit

veri potest, tanto magis, si conuulsio post delirium accidit, et cum nouo horrore, et sudore frigido.

§. 40.

Nonnunquam aeger conuellitur, quod materia peccans in acutis per *μετάσταν* ad cerebrum fertur, praecipue si repressa fuerunt exanthemata. Plerumque hoc incidit cum mutatione vrinae in peius, quae, ex aurantia et cocta, repente fit pallida et aquosa. Aliquando tamen conuulsio critica est, et soluitur magna narium haemorrhagia, erumpentibus parotidibus, iisque inflammatis, diarrhoea, vrinae mutatione, catameniorum et haemorrhoidum fluxu. Tempora coctionis sedulo notari debent. Funesta conuulsio est, quae oritur post magnam haemorrhagiam, vel aliam vehementem euacuationem.

§. 41.

Sudor in febribus vel symptomaticus est, vel criticus. Sudor criticus cum aliis bonis, et coctionis, signis esse solet, incidit iusto tempore, et leuamen adfert. Hoc sudore cocta, vel mitificata materia peccans expellitur, et in febribus inflammatoriis humores illi coacti, tandem resoluti. Haec resolutio fit motu spontaneo illius materiae, coadiuuante arte, datisque diluentibus, saponaceis, et si febris se ab aestu remisit. Sudorem hunc salutarem futurum esse, significat pulsus, a duro in vndosum mutatus, seu in quo arteria non admodum renititur, sed succedaneo motu attollitur.

§. 42.

Raro a primis initiis febris multus sudor bonus est. Aliquando tamen, si causa manifesta est, veluti a represso per refrigerium sudore, vel, si morbi contagiosi virus per cutim in corpus illatum fuit, sudor vel sponte ortus, vel medicamentis motus, bonus esse potest. Ceteroquin, in acutis febribus, si mox ab initio, vel sponte, oritur, vel medicamentis et regimine mouetur, ea re augetur lentor inflammatorius, qui saepe facilius auertitur, quam iterum resoluitur.

§. 43.

Sunt febres malignae, quas *ἐχώδεις* vel *ὀδυνώδεις* vocant, quae mox ab initio cum vehementissimo sudore esse solent, qui sudor plerumque funestus est. Oritur a resolutio omni corporis succo et labefactato etiam fibrarum omnium, maxime arteriarum, robore. Talis febris fuit illa Ephemera Britannica, quae seculo XVI. Britanniam et totam etiam Germaniam depopulata est, de qua scripserunt *Ioh. Caius* BACÒ de VERVLAMIO in *Histor. Henrici VII.* ab initio, et FREINDIVS in *Opp. Edit. Lond. pag. 567.*

§. 44.

Pessimus etiam sudor est colliquatiuus, qui oritur, si humores ab imbecillis visceribus, maxime pulmonibus, nec recte subacti, nec satis densati, mox iterum soluuntur, quare imbecillis ex leui corporis motu sudor est. Accidit atonia et paralyfis arteriarum. Sudor hic colliquatiuus accidit hecticis et tabidis. Etiam fieri solet in magnis suppurationibus. Augetur in his, si noua materia ex chylo crudo et non satis subacto sanguini confunditur.

§. 45.

Deiectiones in febribus variam causam habent. Excernuntur enim non solum ea, quae in ventriculum et intestina delata fuerunt; sed etiam varii humores ex Hepate, Pancreate, vasis mesaraicis &c. Mirae metastases quandoque fiunt, dum humores ex aliis corporis sedibus ad alium conuertuntur. Deiectiones interdum bonae sunt, interdum tolerabiles, quandoque malae, imo funestae.

§. 46.

In catarrhis et febribus catarrhalibus per intestinum glandulas excretio fit, similis illi, quae in iisdem morbis fieri solet in asperae arteriae et narium membrana. In febribus catarrhalibus malignis, seu petechizantibus, diarrhoea symptoma est, quod, nisi nimium inualescat, tolerari debet. Melior enim in his est, quam alius adstricta.

§. 47.

§. 47.

In febribus ardentibus raro incidit, vt lentor ille inflammatorius resolutus per aluum et diarrhoeas efferatur, quibus tunc morbus soluitur. Fere rarius incidit, vt in febribus inflammatoriis pus cum leuamine excernatur.

§. 48.

Si lacteorum oscula erosa sunt et obstructa, vel inflammata, oritur diarrhoea, cum vehementioribus torminibus et deiectionibus cruentis, vel Dysenteria. Sanguis enim ex vasis mesaraicis in intestina effertur. In Cholera omnia, quae in ventriculo intestinisque continentur, concitato vehementer motu peristaltico, *ἀνω καὶ κάτω* reiciuntur.

§. 49.

Tandem in inflammatoriis et malignis sub finem, et breui ante mortem, deiectiones fiunt, praeter aegri sensum et voluntatem, materiae nigrae et foetidissimae, germ. *Brandstühle*, cum quibus sunt alia mala signa, praecipue nouum frigus, sudor frigidus et aucta debilitas. Nihil aliud est, quam sanguis per sphacelum corruptus, quare mors in propinquo est.

§. 50.

Diarrhoeae colliquatiuae eadem causa et ratio est, ac sudoris. De fluxu hepatico hic non dicendum est. Hic esse solet cum febre lenta, et plerumque etiam Gangraena finitur.

§. 51.

Vetustissima obseruatio est, deiectiones pessimas esse meracas, maxime in febribus, seu si *τα ἀκριτά*, seu sincera efferuntur. Sunt vero, quando vel sola assumpta non mutata, vel solus chylus, sincerus sanguis, sincera pituita, vel bilis reicitur. Significat enim hoc, alimenta non concoqui, pituitae maiorem vim esse, bilem esse multam et corruptam, et sanguinem ex maiori aliquo vase in intestina crumpere, id quod pessimum est, nisi tempore critico fiat.

22 DE FEBRIBVS IN GENERE.

De haemorrhoidibus, quae cum his confundi non debent, Lienteria et Coeliaca, suo loco. Sanguis sincerus effertur in illo endemio morbo Indiae occidentalis, cuius si magna copia est, mors instat.

§. 52.

Exanthemata fiunt, si materia peccans et humor potissimum putrescens a natura ad corporis peripheriam propellitur. Hic humor, in vâsculis excretoriis haerens, inflammationem mouet, quare omnis febris exanthematica certa ratione inflammatoria est. Varia harum pustularum nomina sunt et genera. Quodlibet genus habet aliquid, quod ei proprium videtur. Tolluntur, dum veluti minores abscessus pus alunt, vel, dum epidermis a cute attollitur, siccatur et secedit. Ex nimio aestu, quacunque causa, etiam per medendi rationem, aucto, increfcit inflammatio et periculum. Si illae pustulae ex purpureo colore in colorem atrum mutantur, praecipue in morbi ἀκμῇ, inflammatio mutata fuit in sphacelum.

§. 53.

Varia methodus est curandi febres, reuocari tamen potest ad quaedam genera.

1. Aliquando in curanda febre Medicus naturam solam sequitur, et, si illa ipsa ad salutem tendit, saltem Moderator est motuum, quibus illa vtitur.
2. Nonnulli plurimum laborant in mutanda auertendaque materia peccante.
3. Alii materiam peccantem arte et quandoque vi adhibita eliminare student.
4. Alii ad minimum nonnullas febres, veluti intermittentes, solis Specificis propulsare conantur.

Illi prudentiores videntur, qui varia hac medendi ratione vtuntur, et illam varii generis febribus, aegris, symptomatibus aliisque accommodare student.

§. 54.

§. 54.

Qui priorem methodum sequuntur, ferui Naturae sunt, itaque moderantur febrem, ne nimis incendatur, neque nimis tenuetur, et vt se – et excretiones, quibus febris solvitur, recte fiant. Ex febre enim auēta impeditur materiae coctio, et in acutis facile nascitur inflammatio. Ex febre nimis tenuata plerumque alius nascitur morbus, lenta, cacochymia, hectica, &c. In hac methodo potissimum obseruanda est humorum cruditas et coctio, nec non crisis et solutio, hisque accommodanda sunt auxilia. Febris iusto vehementior, quam pulsus, aestus, vrina rutilans et spumida, omniaque alia symptomata indicant, mitigari potest praecipue sanguinis missione, quae tamen in hac methodo non nisi primis diebus fieri debet, praeterea diluentibus, temperantibus, acidis, nitro, blandis anodynis. Aluus duccenda lotionibus, quibus etiam nitrum adiici potest. Aër etiam frigidiusculus multum facit ad leuandam febrem.

§. 55.

Aliquando vero confert, febrem accendere et augere, id quod in intermittentibus necessarium est, si illae citius per Specifica fuerunt suppressae. In his potissimum proficiunt Cathartica per *ἐπιχειρᾶσιν*, siue cum aliqua resolutione, aluum mouentia, datis etiam alexipharmacis. Vbi exanthemata repressa fuerunt, id etiam necessarium est, datis bezoardicis. Vbi vero vires deficiunt, danda sunt analeptica et cardiaca, cuius rei manifestum indicium habemus in sphacelo, a causis internis et ab imbecillitate orto. Lenta febris etiam interdum hoc augmentum desiderat.

§. 56.

Excretiones etiam sedulo considerandae sunt, maxime illa, quae fit per sudores, quibus etiam regimen accommodari debet. Nocet et nimium frigus, et nimius calor, stragulorum pondus, et alia, alibi dicta.

§. 57.

Haec methodus potissimum locum habet in febribus non ita vehementibus, catarrhalibus benignis, acutis continuis, benignis exanthematicis, variolis, morbillis, etiam in intermittentibus non valde diuturnis, et si spes est, fore, vt febris maiori morbo, e. g. Maniac, Melancholiae, mederi possit.

§. 58.

Quomodo materia peccans mutari possit, expositum fuit in doctrina de mutandis humorum vitiis, et praecipue tollenda eorum obstructione, et obtundenda acrimonia. In acutis et inflammatoriis plurimum facit potus diluens. In redundantia bilis opem ferunt acida, saponacea, vegetabilia.

§. 59.

Materia peccans arte expellitur, per euacuantia, emetica, cathartica, sudorifera, sanguinis missiones.

§. 60.

Vomitu euacuantur non solum ea, quae in ventriculo haerent, sed etiam quae in aliis visceribus, ex quibus viae ad intestina apertae sunt. Ex hisce quandoque materia peccans, quae febrem excitatura est, excutitur, et ipsa febris auertitur. Hoc etiam fit in malignis, si contagium per saliuam in ventriculum descendit, vel quoque, si occulta illarum causa praecipue agit in bilem, illamque turgescens et acrem reddit.

§. 61.

Vomitus indicatur, si ventriculus impletus est; si breui ante alimentum cum nausea assumptum fuit; si aeger crebrius vomitu, vel irritato vomendi conatu, vexatur, nulla tamen signa adsunt inflammati ventriculi; si is de praecordiorum anxietate, oppletione, vertigine, tussi stomachica conqueritur. In intermittentibus vomitus moueri debet tempore *ἀνυγξίας*. In malignis vomitus a primo initio bonus est, et si suspicio est morbi contagionem saliuam infecisse.

fecisse. Vbi morbus iam adoleuit, et in ἀκμῇ, raro bonus est.

§. 62.

Vomitus intempestive excitatus, qui vires multum conuellit, in febribus valde alienus est; lethiferus vero, qui acrioribus concitatur, inflammato ventriculo.

§. 63.

Raro proficiunt purgantia, nisi in intermittentibus. Si valentiora, et in his crebrius et tempore cruditatis, adhibentur, corpus imbecillum redditur, et morbus facile in cacochymiam degenerat, fiunt viscerum infarctus et scirrhi, relinquuntur oedemata. In intermittentibus igitur prius praeparanda est materia. Vbi vero intermittentes vel sponte quieuerunt, vel Specificis curatae fuerunt, purgantium vsu reuertuntur. Dari debent in intermittentibus post praeparatam materiam, tempore ἀνυγξίας. In pertinacioribus, veluti quartana, iteratis vicibus, et cum resoluentibus et digestiuis remixta, dari debent. Fere aliena esse reor resinosa et acria; plurimi vsus est Rhabarbarum. In acutis raro profunt, nisi in inflammatoriis, a causa externa ortis, et vbi auertendus est humorum aditus ad aliquam partem. Hic tamen non alia, quam antiphlogistica, et quidem primis saltem diebus, proficiunt. Purgantia turbant in acutis materiae coctionem, et febrem pertinaciorum reddunt, vel in alium morbum mutant. Lentae febres saepe alui ductione tolluntur.

§. 64.

Omni modo euitanda est alui obstructio, etiam in exanthematicis. Tempore, quo exanthemata erumpunt, caute agendum. Alius soluenda est in his, et aliis, vbi purgatio locum non habet, clysteribus; oportet vero hos, nec acres, nec calidos esse. Intermittentes suppressae etiam clysteribus reuocantur.

§. 65.

Sudorifera calidiora aliena et pessima sunt tempore cruditatis. Nec alexipharmaca in intermittentibus post pri-

mos paroxysmos conueniunt. Vbi tamen se sponte remittit febris, et corpus insudat, lenior stimulus, vna cum diluentibus, sufficit ad sudorem mouendum. In malignis sudorem mouent sic dicta bezoardica, quo etiam pertinet aqua prophylactica Syluii. Raro incidit, vt febris, dato sudorifero, mox ab initio possit expugnari, et vix, nisi in catarrhalibus.

§. 66.

De sanguinis missione multa controuersia. Loquitur experientia, febres acutas ea multum leuari. Abundantior enim sanguis, isque, in febribus, propter vehementiorem motum vasa multum distendens, materiae peccantis coctionem impedit, quia eo tollitur ille vitalis renixus, qui inter cor et arterias est. Sanguinis missione etiam auertitur inflammatio. Igitur in febribus acutis et inflammatoriis, exceptis exanthematicis, si corpus hominis iuuenis et robusti rubet, ac maior in eo aëthus est; si aeger pleno victu et meraciori potione usus est; si is ebrius fuit; si medicamenta data fuerunt calida; si in aëre calidiore versatur; si ei magna anxietas, et acutus mouensque dolor aliqua parte est, qui futuram significat inflammationem, sanguis mittendus est. In Pleuritide, si magnus dolor est et anxietas, alia est necessitas. Nam si sanguis non detrahatur, is in pulmonibus coaceruatur, aegrum suffocat, quia propter acutum pleurae inflammatae dolorem satis dilatari nequit thorax, nec adeo, vt decet, expandi potest pulmo. Imo, si cum his aliisque symptomatibus sanguis, ex vena missus, repente cogitur, et tenax albidum coagulum sanguini inhaeret, oportet eius missionem iterari.

§. 67.

Non vero facile in acutis et continuis sanguis mittendus durante exacerbatione, et si aeger ex febre multum insanit, sed semper expectandum est, donec febris se aliquantum remiserit. Si enim durante exacerbatione multum sanguinis detrahatur, nimis repentina mutatio in vniuerso corpore, praecipue in cerebro, fit. Optima est sangui-

sanguinis missio, quae protinus ab initio, et vbi febris nondum inualuit, suscipitur.

§. 68.

Optime mittitur sanguis in acutis mox primis diebus, non facile, et nisi magnum inflammationis, eiusque incrementis, periculum id iubeat, post tertium. Si sanguis mittitur, eius plurimum detrahendum est. Praestat etiam, vt hoc fiat ex vulnere maiori venae incisae.

§. 69.

Res magis controuersa est in febribus exanthematicis. Nam sanguinis missione fieri potest, vt exanthemata protinus euanescent, et funesta oriantur symptomata; sed tamen, si aegrum ab initio, et vbi suspicio est, talem febrem futuram esse, protinus febris tenet magna, si is, crescente ad sensum calore, de summa anxietate conqueritur, et si corporis habitus respondet, sanguinis missio saepe leuamen adfert, et exanthematum eruptionem iuuat. Non raro auertit lethalem inflammationem, vel huius in gangraenam transitum. Si sanguis missus fuit, huic methodo accomodanda est reliqua curatio, et vtendum paulo efficacioribus, quibus exanthematum eruptio iuari potest.

§. 70.

Intermittentes raro venaesectionem postulant, quandoque tamen ab initio, si naturam febris continuae habere videntur, multum urgente aestu, cum aliis symptomatibus. Rarissime quartana sanguinis missione tollitur.

§. 71.

Pestifera est sanguinis missio in febribus malignis, quarum certissimum indicium magna infirmitas est. Si in his sanguis mittitur, in eo nulla diathesis inflammatoria, sed sanguis fluidus manet, rarus et rutilans. Hi, qui talem sanguinem habent, si venaesectio repetitur, raro sanescunt. Nocet etiam, si intermittens febris mutata fuit in continuam, si corpus Venere, inedia, diuturno grauiorque morbo confectum et exhaustum est. Nec plerumque recte mittitur

titur in Erysipelate, nisi febris magna fuerit. Hecticum sanguinis missio iugulat.

§. 72.

Supereſt tandem curatio per Specifica, quae nunquam in acutis, ſed ſolis intermittentibus locum habet. Varia laudantur: Radix Gentianae, cortex Caſcarillae, ſal Ammoniacus, Alumen, ipſum Arſenicum, et alia. Optimus tamen eſt *cortex Peruvianus*, de quo magna controuerſia. Ne ad hanc descendamus, agit ſine dubio roborando, cum nullam euacuationem ad ſenſum faciat, vel augeat, niſi forte inſenſibilem perſpirationem. Certum eſt, eo quandoque febrem ſine praeparatione et excretionem materiae peccantis tolli; non minus tamen certum eſt, eius intempeſtiuo uſu febres cohiberi; aſt vero ſequi, vel recidiuam, vel alium morbum.

§. 73.

Videtur illum adhiberi poſſe, ſine praecua corporis praeparatione, et materiae peccantis euacuatione, in febribus epidemicis intermittentibus, et quae non ex vitio corporis habitu, nec ex tenaci materia, primis viis inhaerente, ortae fuerunt, ſed ex epidemica aëris diatheſi in corpore caeteroquin valente, non impuro, ſeu corruptis humoribus abundante. Eius etiam uſus neceſſarius, niſi mox ab initio, propius tamen ab illo, eſſe videtur, ſi febribus eiſmodi laborant corpora valde imbecilla, et ſenes, quae febrem diu tolerare non poſſunt.

§. 74.

Nocet cortex in omnibus continuis et inflammatoriis; auct enim obſtructionem et lentorem inflammatorium. Nec admitti poteſt in febribus malignis, peſtentialibus, exanthematicis, nec in eryſipelate. Locum habere poteſt, ſi febres continuae ex intermittentibus ortae fuerunt, etiam in lentis, praemiſſa venaeſectione ex intermittentibus reſiſtis. De eius uſu in Gangraena, a cauſa interna, videnda eſt Chirurgia.

§. 75.

§. 75.

In aliis intermittentibus, quarum plures sine cortice curantur, is dari debet cocta prius, praeparata et euacuata materia peccante, de qua re infra plura. Tempus vero est, vbi febris se paullulum remisit, iam per aliquod tempus crassa multaque ex vrina desiderunt, et aeger non solum perfectam ἀπυρεξίαν, sed et meliuscule sese habet.

§. 76.

Solus sine aliis remediis, quae eius vim imminuunt, maxime sine purgantibus, exhibeatur. Dari debet post finitum paroxysmum, et tempore integritatis, vel, vt vocant, ἀπυρεξίας. Maior ei vis est, si datur in puluere, vel electuario, quam si in infuso. Aeger vero sumet, quater per diem drachmam dimidiam, vel integram. Gal-
lis in more est, decoctum meracius cum aqua in aluum immittere, quod quandoque prodesse potest infantibus. Raro cortice in infantibus opus est.

§. 77.

Quod ad victum attinet, febres acutae magnum praesidium habent ex abstinentia. In intermittentibus vero cibus magis necessarius est. Debet vero semper talis esse, vt corpus non tam alat, quam sustineat. Accommodari vero cibus et potus debent non solum morbo, sed etiam homini, eius vitae rationi, consuetudini, aetati, &c. In omni febre inflammatoria, ardente, biliosa, maligna, conuenit victus vegetabilis, acido succo abundans, cum farinosis. In intermittentibus concedi potest cibus ex animalibus, imo, si temperamentum phlegmaticum est, et tenacior pituita in primis viis, adici possunt aromata, ex quibus Zingiber fere aliis praeferrī debet. Dari debet cibus repetitis vicibus, ita vt aeger se eo minime impleat, et quidem tempore ἀπυρεξίας, nunquam vero ante imminentem paroxysmum. In febribus acutis dari debet cibus tempore remissionis. Nunquam is inuito aegro obtrudi debet.

§. 78.

Potus non facile denegari debet, quo humores lenti diluuntur, tenaces mobiles redduntur. Nocere vero potest et nimis calidus, et nimis frigidus. Prior, inprimis in acutis, aestum et lentorem inflammatorium auget; alter spasmos excitat, factaque contractione solidorum, fieri possunt obstructions atque inflammationes, praecipue, si calente corpore sumitur.

§. 79.

Potus accommodatus sit feбри. Optimus est Ptisana, decoctum hordei, tum simplicis, tum excorticati, Scorzonerae, Sassa-parillae, quibus Roob, alique succi acidi, admisceri debent. In febribus acutis et inflammatoriis decoctum C. C. non ita opportunum est, quod in aliis locum habere potest.

§. 80.

In acutis malignis, cum magna imbecillitate, periculosum est, si aeger situm mutat. Nam, si corpus erectum est, facile Lipothymiae et alia symptomata incidunt.

§. 81.

Supra dixi (§. 24.), ad symptomatum curationem non ita properandum esse; si tamen his vrgentibus quandoque medendum est, inter prima est anxietas. Hanc, si ab impedito humorum transitu orta fuit, tollit venaesectio, quandoque etiam in febrium inflammatarum initio, et, si nullus exanthematum metus est. Magis tutum est, et adversus anxietatem etiam praesidium, lotio in aluum immissa, vel purgatio antiphlogistica. Cum his necessarius est potus diluens. In intermittentibus anxietas saepe a ventriculi cruditatibus oritur, et ei medetur emeticum. Si vero orta est a retentis fecibus et flatibus in intestino colo, proficiunt clysteres. Si ab inflammatione ventriculi, multum iuuat decoctum auenae excorticatae. Si ab exanthematibus repressis, prosunt frictiones cum diaphoreticis internis. In purpura extrinsecus admoueri possunt Cantharides.

§. 82.

§. 82.

Sitim fallit, inprimis in ardentibus, potus diluens, frigidus, haud tamen nimis. Leuamen adfert, si aquae pauciores guttulae spiritus acidi, vel etiam nitrum, adiicitur, illaque os crebrius eluitur. Vel orbiculi citrei mali, succo turgidi, saccharo aspersi, imponi possunt linguae. Potus inprimis acidiusculus esse debet, et fere optimus est, si aquae fontanae simplici, et huius quidem mensurae, adiicitur vini Rhenani yncia vna vel duae. Etiam vinum adiici potest, hac ratione et quantitate, decocto panis domestici. Profunt multum Clysteres, ex aqua pura, cui nitrum ad drachmam vnam vel duas addi potest. Vel immitti possunt in aluum aquae Selteranae, quae lotiones etiam non calidae, nec tamen nimis frigidae esse debent.

§. 83.

Nausea et vomitus in febribus acutis et ardentibus saepe oriuntur a putrescente in ventriculo humore et bile. Adversus hunc plurimum valet potus diluens et acidus, et vel in potu, vel loco medicamenti exhiberi potest Oxymel ad vnciam dimid. vel integram per diem. Videndum tamen, ne hoc aluus et nimium et intempestiue moueatur. Dari etiam possunt illae purgationes antiphlogisticae, ex Tamarindis, Passulis, aliisque acidulis, nisi alia id prohibeant. In intermittentibus nauseam tollunt sales digestiui cum nitro, et si ea vehementior est, emeticum. Nausea etiam est in fluxu hepatico, et febribus lentis. In his omnia euacuantia mortem maurant, de quibus suo loco.

§. 84.

Si vero nausea oritur, inprimis in intermittentibus, a viscido, ventriculo inhaerente, id quod cognoscimus, si homo non de corrupto sapore, et magna tamen dyspnoea et anxietate conqueritur; et si glutinosa assumit; si ructus crebriores sunt, sine sapore, dari potest sal neutrius generis, Arcanum duplicatum, Tartarus vitriolatus, terra sol. Tartari, eius Liquor, Sal thermarum Carolinarum, Sal catharticus,

tharticus, etc. maiori in quantitate. Vel etiam dari potest Oxymel squilliticum; repetitis vicibus, et quidem per diem ad vnciam vnam vel duas. His praemissis, si nausea non sublata est, dari debet Ipecacuanha.

§. 85.

Si vomitus et vomendi conatus oritur a male affecta parte nervosa, et ipsa cerebri membrana, causa tollenda est. Quandoque acré et irritans ex vulnere eximendum, quandoque vulnus ampliandum, et aliud, quod Chirurgia docet, adiiciendum est. Si ventriculus inflammatus est a causis internis, proficit decoctum hordei excorticati, auenae excorticatae, emulsiões dilutiores, quibus pauciores guttulae Liquoris anodynii Hoffm. vel pauciora grana Nitri addi possunt. Et in hoc casu non negligi debent Clysteres, ex aqua fontana, melle, nitro, imo etiam aceto. Frigidiusculi clysteres in aluum immittendi.

§. 86.

Debilitati in febribus, si ab impedito humorum transitu orta fuerit, medentur ea quae febre: Sanguinis missio, diluentia, saponacea. In febribus ardentibus et inflammatoriis, nec non malignis, conducunt Iulapia, ex syrupis et succis acidis. Conveniunt etiam omnia, quae supra occasione sitis (§. 82.) proposita sunt. Cardiaca calidiora hic aliena sunt.

§. 87.

Aestum minuunt ea, quae febrem tenuant. Plurimum etiam conferunt Clysteres cum nitro. Obseruanda est corporis et animi quies. In conclaui conferri possunt arbuta frigida, conspersa; pavimentum respergi potest aqua frigida, vel aceto vini; arcendus est omnis strepitus. Aliquando in febribus aestum multum auget humor biliosus in ventriculo, et primis viis, qui, nisi aliud hoc prohibeat, congruo cathartico educi debet. Aestum in febre inflammatoria vulneris leuat huius suppuratio, et omnia quae hanc iuuant.

§. 88.

§. 88.

Delirio medentur omnia, quae febrem tenuant, praecipue iuuandae sunt excretiones. Sanguis, durante vehementius delirio, non facile mittendus est, sed, si febris natura id permittit, melius postquam illud se paululum remissit. Alienae sunt Cantharides; rubefacientia vero, Sinapi, Allium, Ranunculus, aliaque pedibus, cum vehementi frictione, adhiberi possunt. Illud tamen videndum, ne nouo hoc stimulo sanguis magis moueatur. Nocent opiata, dari tamen potest Emulsio cum Papauere.

§. 89.

Affectus soporosi post graue delirium plerumque funesti, nisi facta fuerit crisis. Si post magnam euacuationem, veluti haemorrhagiam, vel hypercatharsin, ortus fuerit sopor, proficiunt iuscula gelatinosa, saepe et iteratis vicibus, minima tamen quantitate, offerenda. Si vero serum in capite accumulatum est, proficiunt Cantharides. Sopor apoplecticorum alia auxilia desiderat, de quibus infra. Etiam admoueri possunt naribus errhina et ptarmica.

§. 90.

Conuulsionis Therapia causis suis accommodari debet. In exanthematicis ante eruptionem dari debent diapnoica cum temperantibus, addi potest Specificum cephalicum, vel cinnabaris sola, quibus tamen non adeo magna fides habenda est. Admiseri etiam possunt eiusmodi potiunculis spiritus bezoardicus Buffi, cum Liquore anod. Hoffmanni, quae etiam melius seorsim dantur. Si exanthemata repressa fuerunt, adiici potest, exigua tamen dosi, Essentia Myrrhae. Conuulsio critica in febribus ardentibus et phrenitide, quae iusto tempore et cum signis coctionis est, non facile turbari debet.

§. 91.

Sudor, qui in malignis tempore cruditatis et mox ab initio oritur, postulat acida, Corallia rubra, cum acido Citri, species de Hyacyntho, Nitrum.

C

§. 92.

§. 92.

Diarrhoea critica non turbanda. In febre catarrhali maligna, seu petechizante, illa toleranda est. In hac vero, si modum excedit, vel etiam si febribus exanthematicis superuenit, moderanda est, non tam adstringentibus, quam compositionibus aliis opiatīs, ex quorum numero praestare videtur *Diascordium Fracastorii*. Etiam locum habere potest *Theriaca Andromachi*, quae aliquoties repeti debet.

§. 93.

In exanthematum curatione, regimen et febris moderamen prima sunt. Febris enim, si nimium accenditur, oritur inflammatio, et exanthemata numero et malignitate augentur. Si nimis tenuatur febris, oriuntur conuulsiones, diarrhoeae, et saepe febris in alium morbum, hecticum quandoque, mutatur. Raro locum habent euacuantia. Vide quae de sanguinis missione (§. 66. et 69.) et clysteribus (§. 64.) supra relata fuerunt. Si iterum euauerunt, adhibenda sunt, quae supra (§. 90.) occasione conuulsionis in febre praecepimus. Plurimum conferunt extremorum frictiones cum linteis asperioribus calidis, infusa aquosa calida radicum et herbarum. Pro ditioribus *Lapis Bezoar*, ad gr. XV. vel scrup. j. pro dosi, vel etiam infusum illius coaguli, quod *Pedra del Porco* dicitur. In purpura proficiunt vesicatoria, extremis artubus admouenda.





DE FEBRIBVS IN SPECIE.

FEBRES INTERMITTENTES.

T E R T I A N A.

§. 94.

Febbris est, vel *πυρετός σύντοχος*, seu continens, vel *συνεχής*, seu continua, vel *διαλείπων*, seu intermittens. Continens est, quae nullam habet remissionem. Continua, quae aliquam remissionem habet, sed non perfectam. Intermittens, in qua vera est *ἀπυρεξία*, seu, ut CELSO dicitur, integritas.

§. 95.

Intermittens rursus diuiditur, ratione temporis et paroxysmorum, in quotidianam, tertianam et quartanam, quae febres quandoque, si duos paroxysmos habent, duplicatae dicuntur, e. g. tertiana duplex, quae facile confundi potest cum quotidiana. Distinguitur vero tempore, vehementia, natura paroxysmorum. Nam quoad haec, paroxysmi quotidianae sibi aequales sunt, qui in altera differunt. Raro tertianae duplicis paroxysmi eadem die incoidunt. Frequentissima omnium est tertiana, non ita frequens quartana, rarior quotidiana. Dantur etiam febres quintanae, aliaeque, quae sexto vel septimo quoque die reuertuntur, quae vero rarius occurrunt.

§. 96.

Tertiana genuina plerumque aegrum corripit circa meridiem. Sentit aeger ab initio insuetum languorem et lassitudinem, lumborum dolorem, et aliquam quasi abdominis strictionem. Accedit oscitatio, iactatio, pandiculatio. Propterea is refrigerium sentit, et, cum hoc, horrorem tremoremque. De pulsu sub horrore dictum fuit supra. Horrore se remittente, ingrauescit praecordiorum anxietas,

non raro cum nausea, vomendi conatu, et pituita atque bilis vomitu. Pulsus iam durior fortiorque attollit arterias, manet vero semper velox, cutis tamen adhuc rigida est et sicca. Cum aestu sunt alia symptomata, sitis, vigilia, imo quandoque delirium. Tandem pulsus se remittit, corpus insudat, et vrina, quae sub horrore, propter vasorum constrictionem, aquosa et tenuis erat, iam magis saturata mingitur. Alia tamen est primis paroxysmis. Vltimis enim illa crassa, cum sedimento lateritio, saponacea mingitur. Sequitur sudor, et soluto per hunc paroxysmo, aeger lassitudinem sentit et debilitatem sine *δυσφορία*.

§. 97.

Duratio horum temporum omnium multum variat. Illud sciendum est, tertianas, maxime autumnales, primis diebus saepe continuis similes esse, et veram integritatem haud habere. Cognoscitur hoc discrimen ex natura morbi epidemici, iam cogniti, si maius fuit ab initio frigus, et si vrina subito mutatur. Haec notitia ideo necessaria est, quia, si in his intermittentibus, sub continuæ larva latentibus, curatio per sanguinis missionem, et alia vires immiuentia auxilia suscipitur, febris turbatur, et pertinax redditur. Cum ab initio diagnosi, etiam febrium intermittentium, et, num tertianae, num quartanae futurae sint, difficilior esse soleat, per priora tempora diligentior observatio, non protinus efficacior medicina adhibenda est.

§. 98.

Quae vero causa *προνυσμένη*, seu praedisponens sit huius et aliarum intermittentium, et cur statis temporibus febris reuertat, haud certo constat. Multis probat illustr. *van swieten* ad §. 757. huius causae sedem esse in nervis, horumque subtilissimo fluido. Causae vero pro-catharticae sedes in tertiana est potissimum in primis viis, in quibus, praecipue in ventriculo et duodeno, haerent cruditates, tum ab assumtis, tum etiam a corruptis succis, quae alias chylicationi inserviunt. Ei igitur obnoxii sunt, qui
ventri-

ventriculum copiosis dyspeptis, sibi que contrariis, onerant cibis, praecipue, si is alioquin infirmus est, ex abusu emeticorum, purgantium, post usum aquarum mineralium, ex sanguinis missione, Venere, litterarum studio, vigilia aliisque. Quandoque oritur tertiana ex sola nausea. Interdum tamen etiam ex animi pathemate, aëris mutatione, oritur haec febris, vel iam sopita iterum reuertit.

§. 99.

Quandoque sunt tertianae epidemicae. Oriri videntur raro ex victu, frequentius ex aëre paludoso frigido, eius repentinis mutationibus, quibus valde mutatur insensibilis transpiratio. Illae febres plerumque typum exacte non seruant, et magis ad continuarum typum accedunt. Alia saepe cum his sunt symptomata, animi deliquia, deliria, virium maior prostratio, &c. Difficilius etiam expugnatur.

§. 100.

Tertiana benigna simplex, a manifestis causis orta, in corpore nondum infirmato, tollitur abstinentia, et obseruato regimine, fere sine medicatione. Febrem breuem fore significat vomitus, diarrhoea, sudor post paroxysmum facilis et criticus, sedimentum copiosum in vrina, et, si pusulae in labris nascuntur cum virium integritate; qualis febris corpori magnam salubritatem promittit, et illud non raro ab aliis morbis, ab inhaerente in visceribus, maxime hepate, saburra liberat, cum nulla efficacior resolutio sit, quam quae motu febrili praestatur. Non vero omnes intermittentes, nec omnes tertianae salubres sunt. Febris enim diuturnior debilitat tandem partes solidas, quae laxiores factae, humidis subigendis et praeparandis haud sufficiunt. Humida propter id, et propter nimis eorum celerem resolutionem corrumpuntur, ita vt, quum humorum etiam partes meliores et corpori alendo idoneae citius per sudores expellantur, relinquatur saepe humor terrestris spissior cum multa acrimonia. Exhaustum igitur corpus et

debile ac infirmum per diuturnas febres saepe aliis morbis, Leucophlegmatiae, Cachexiae, Hydropi, obnoxium redditur. Tertianae nonnunquam in acutas continuas mutantur, id quod maxime fit assumtis calidioribus, tum remediis, tum cibis potionibusque, sudore vehementius moto per stragula, aërem calidum et similia. Est magna differentia inter tertianas vernaes et autumnales. Priores breues sunt et plerumque salutares, vltimae chronicae, quae non raro in alios morbos degenerant, nonnunquam in quartanas, cum quibus illae saepe conueniunt. Igitur nonnunquam senibus imbecillis, alio morbo, Venere, animi pathemate, confectis, periculum imminet, qui vel sub horrore apoplectici moriuntur, vel cachectici fiunt.

§. 101.

In curatione quandoque Emetica locum habent, etiam ab initio, quae a causa manifesta, ab aegri victu, praeterea a nausea, sapore aduerso, ructu, indicantur, de quibus supra retuli (§. 60. 61.). Epidemicae intermittentes raro illa ferunt. Ceteroquin vero materia peccans praeparanda mobilisque reddenda, euacuanda, et visceribus nouum robur reddendum est.

§. 102.

A primis initiis et vbi febris nondum plenam integritatem habet, sed aestus adhuc continuus est, imperanda est abstinentia, et dari possunt temperantia, pulueres salini, nitrosi, minus efficaces, tenerioribus potiunculae.

§. 103.

Si vero paroxysmi bene distincti sunt, et inter hos vera integritas est, eo ipso tempore dari possunt quae ad materiam peccantem mobilem reddendam efficaciora sunt. Ex certis vero signis, ex vomitu, ex ructu, ex ardore faucium, ex sapore, de quo aeger conqueritur, imo ex causis cognoscere possumus, num in ventriculo et duodeno haereant biliosa, acida, pituitosa, quibus accommodari debent medicamenta. Si enim bilis abundat, alieni sunt acriores sales,

sales, et dari potest Nitrum cum absorbentibus, Cremor Tartari cum absorbentibus. Si vero acidum abundat, Sal. Card. bened. Sal Therm. Carolin. Sal cathart. cum Magnesia alba. Si vero pituita exsuperat, aliena sunt terrea, et conducunt sales neutrius generis, veluti Sal Therm. Carolinarum. Si aegri pulueres auersantur, sales solui possunt in aqua et eadem quantitate dari.

§. 104.

Haec danda sunt tempore integritatis et versus paroxysmum. Hoc vero durante, aeger se debet continere. Si vomitus inter frigus et aestum vrget, assumat aeger aquam tepidam, vt minori cum molestia vomat. Vbi cutis madescere incipit, calidam oportet forbere, et quando febris magis genuina est; post aliquot superatos paroxysmos dari potest infusum aquosum ex rad. Vincetox. Scorzoneræ, Salsaparill. Cichorii, Taraxaci, Gramin. herb. Beton. Meliss. Cort. aurant. Sem. Foeniculi, et adici potest Ess. alexipharmaca, refracta tamen dosi. Perniciosum est, multum sudorem mouere, tum intus datis, tum conclauî percalefacto, atque impositis stragulis. Debilioribus dari potest hoc tempore iuscum. Nec vini haustus alienus est.

§. 105.

Post aliquot paroxysmos vero dari debent cathartica, quae aegri temperamento accommodanda sunt. Fere optimum est, et vix non omnibus conueniens, Rhabarbarum c. Cremore Tartari, vel Sale cathartico. Debilioribus hoc valde opportunum est. Nec alienum, praecipue si bilis abundat, apozema ex Tamarindis, Rhabarb. fol. Sennae, &c. Aliis, et praecipue vbi viscidum exsuperat, dari possunt Pilulae ex Extr. amaris ad methodum Beccheri, nec non Sal catharticum. Si autem febris continuat et pertinacior est, etiam parari possunt infusa per epicrasin laxantia. Omnia emetica et purgantia ita dari oportet, vt eorum actio finita sit ante nouum paroxysmum. Tamen interdum in robustioribus, et si viscidum haeret in ventriculo, proficit,

ficat, si Sal neutrius generis, aqua solutus, maiori quantitate, mox ante imminens paroxysmum datur. e. g. Tartar. vitriolat. ad drachmam j. vel ij. Superbibat tamen aeger aquam, ne Sal nimium offendant ventriculum. Nec hoc mox ab initio, nec in tenerioribus aegris fiat. Tandem vero, ubi febris paululum se remisit, et alia signa sunt, de quibus supra dixi (§. 75.), dari potest Cortex Peruvianus. Cauendum est, ne salibus abutantur, quibus ventriculus laeditur. Febres, in quibus copiosissimo sudore aegri diffuunt, saepe periculosius tolluntur, et tandem ex diuturniori usu salinorum et absorbentium augetur solidorum infirmitas. In his citius fugiendum est ad corticis usum. De cibo potuque tenendum, nocere omnem cibum valentior, pinguem maxime, omnemque repletionem. Haec tanto magis vitanda est, cum aegri saepe voraciores sunt, et de canina fame conquerantur, quorum febres plerumque pertinaciores esse solent. Nocet tamen etiam haud minus nimia abstinentia et fames, qua vires ad febrem necessariae exhauriuntur. Alendus igitur est aeger cibus, in quibus seligendis consuetudinis ratio habenda. Semper cibus dandus post paroxysmum febrilem, nunquam ante hunc, tempore *αἰνυγῆς*. Tunc enim vini meracioris moderatus haustus salubris esse potest. Ceterarum rerum non-naturalium, praecipue exercitationis et somni, ratio habenda est. Nocet Venus.

§. 106.


Postquam febris desit, imperari debet regimen. Ut febris reuertat, efficere possunt aër paludosus, frigus nocturnum, Venus, vehementes animi et corporis motus, praecipue repletio, victus plenus, durus, potus inebrians, omne purgans, nec non sanguinem in motum ciens medicamentum. Alius, si adstricta est, non aliter, quam cibus idoneis et lotionibus mollienda est. Prae ceteris monendus est aeger, ne se cibus, etiam bonis, impleat. Vitanda sunt omnia dura, pingua, acria, potiones etiam meracio-

res

res et inebriantes. Vbi etiam febris conquieuerit prorsus, tamen per aliquod tempus debet dari cortex. Bonum signum est, si hic datur, et tenuata, vel prorsus quiescente febre, deiectiones frequentiores fiunt.

§. 107.

Vbi tamen viscera infirmata esse videntur, his optimum robur adfert cortex Peruvianus. Dari possunt etiam Martialia, Tinct. Vitrioli Martis Ludouici adgt. xx. cum aqua simplici. Essentiae carminatiuae non ita bonae sunt, praestant Trageae et ex his Puluis stomach. Birckmanni.



FEBRIS QVOTIDIANA.

§. 108.

Rarius et plerumque tempore verno, atque vix alios, quam imbecillos, haec febris corripit. Incursat hominis matutinis, nec frigus, nec aestus valde vrgent, et febris fere lentae similis est, in quam non raro mutatur. Aeger de torpore et stupore, atque de imbecillitate conqueritur. Haec genuina est. Si vero paroxysmi vagi sunt, et nec quotidianae, nec tertianae duplicis rationem seruant, dicitur notha seu erratica, qualis plerumque est epidemica. Quomodo a tertiana duplici differat, ex supra dictis (§. 95.) intelligitur. A catarrhali vero differt in eo, quod haec plerumque tempore vespertino aegrum corripit, et nouo horrore commouet, quae etiam tertio quoque die reuertitur vel exacerbat, ceteroquin vero continua est, nulla-que perfecta integritate distinguitur. In febre hectica exacerbatio plerumque post pastum est. Quotidiana facile mutatur in continuam vel lentam.


§. 109.

Huius febris causa esse videtur imbecillitas viscerum, prae caeteris ventriculi. Solet oriri ex vehementi diuturnoque moerore, post male curatas intermittentes, post alia, quibus viscera et praecipue ventriculus offenduntur. Quandoque in imbecillis illa non sine metu est, et saepe pertinacior, quam quartana. Febrem breuem futuram esse significant excretiones autocraticae per diarrhoeam, sudorem, vomitum.

§. 110.

Curatio huius febris eadem fere requirit, quae tertiana (§. 102.), medicamenta, tamen mitiora et pauciores Sales. Omnia accommodari debent paroxysmo. Ab initio, si vel non perfecta, vel tantum brevis integritas est, dari possunt pulveres ex Nitro, Arcano duplicato, lapidibus Cancrorum cum acido Citri, Antimon. diaphoretico cum pulvere bezoardico et similibus. Vel etiam potiones cum liquore terrae fol. Tartari, vel hunc ex aqua destillata. Vbi magis perfecta est integritas, protinus post paroxysmum dari potest pulvis ex Cremore Tartari, vel Rhabbarbaro; vel Pilulae Beccherianae, quae, ut celerius agant, solui possunt in aqua destillata. Si post paroxysmum corpus insudat, dari debet infusum calidum aquosum. Emetica, praesertim ab initio, morbum exasperare possunt, imprimis si is non tam a malo victu, quam ab imbecillitate ventriculi, vel etiam ab animi pathemate, veluti moerore, ortus fuit. Si vero febris pertinacior est, et si alia signa cruditates in ventriculo esse ostendunt, dari potest Ipecacuanha. Cathartica efficaciora et stimulantia et sanguinis missio plerumque nocent. Illa vero leniora laxantia et resoluentia saepius reiterata profunt. Aeger monendus est ante omnia, ut ab omnibus, quae ventriculum onerare possunt eumque imbecilliores reddere, abstineat. Omittat etiam curas et litterarum studium. Corpus vero, quantum res permittit, exerceat. Si febris per tempus sic tolerata fuit, ea vero non

non conquiescit, dari potest Cortex Peruvianus, ad cuius
vsum non nimium properandum est. Post superatam fe-
brem, cura habenda, vt ventriculo restituatur robur.
Perficiunt id stomachica, Trageae, praecipue infusum Cort.
Peruv. cum Limat. Martis. Nec prorsus contemnenda sunt
externa.



Q V A R T A N A.

§. III.

Haec quarto quolibet die reuertit. Frequentior est Au-
tumno, quam Vere et caeteris anni temporibus. Ea
plerumque adulti, senes, interdum tamen, quamuis rarius,
etiam infantes laborant. Incursat vtplurimum, si genuina
est, post meridiem. Primis diebus horror paucus est, qui
vero, reuertente febre, increfcit, et quandoque per ali-
quot horas durat. Sequitur lento gradu non ita magnus ac-
tus. Nam rarius cum delirio vel aliis symptomatibus, cepha-
lalgia, anxietate, vomendi conatu, esse solet. Plerumque
deficiunt solitae excretiones, per vomitum, aluum, sudo-
rem, et in genere haec febris magis contumax, quam ve-
hemens est. Pulsus plerumque rarior tardiorque, quam in
ceteris febribus, alius saepe adstricta. Paroxysmus febris
interdum breuior, in nonnullis vero vltra xv-xx horas
protrahitur. Est quidem huic feбри integritas, quae tamen
vix vnquam sine lassitudine, torpore et imbecillitate esse
solet. Mutatur color cutis externus, qui ab impuritatibus,
quae humoribus admiscantur, liuidus fit ac flauescens.
Saepe aegri sunt moesti et morosi, queruntur interdum de
dolore artuum. Non raro voraces fiunt, et magno deside-
rio fameque canina in cibos duos dyspeptos feruntur. Haec
genuina dicitur; notha vero est, cuius accessiones vagae
sunt,

sunt, ut mox ante, mox post meridiem paroxysmus aegrum corripiat. Debet tamen distingui febris quartana duplex ab aliis febribus vagis. Prioris signa a tertianae duplici notis depromenda sunt.

§. 112.

Haec febris interdum epidemica est, praesertim autumno, si hic post feruidam aestatem pluuiosus est. Endemia esse solet populis septentrionalibus, in locis paludosis degentibus, victu dario, pane atro, carnibus fumo induratis vespertibus, inter quos tamen ei magis obnoxii sunt imbecilli, et corpus non satis exercentes.

§. 113.

Sedes morbi esse videtur non tam in primis viis, quam in ipsis visceribus abdominalis, chylicationi inferuentibus. Veteres dixerunt, quartanam oriri ab atra bile, et ad eam plurimum facere corruptum sanguinem, omnemque succum, in quo blandum lymphaticum deficit, terrestre vero et oleum rancidum exsuperat. Si igitur mali eiusmodi succi, cruditatesque haerent in visceribus, hepate, splene, mesenterio, pancreate, et si in his organis vitiatorum, crudorumque humorum circuitus lentus est turbatusque, nascitur haec febris. Haec ob id facile in horum viscerum scirrhus degenerat, atque non raro in Cachexiam, Isterum, Oedema, Hydropem, Tertianam, mutatur. Occasionem dat victus plenior, crudus atque durior, praecipue vegetabilis, acescens, cum potu pariori, vita sedentaria, litterarum nimium studium, cura ac moeror, suppressae excretionis, catameniorum, haemorrhoidum, sudoris matutini, repressa scabies, male curatae aliae febres et alia symptomata. Quare frequens esse solet senibus, hypochondriacis, hysteriis, Scorbutis vel purpura scorbutica laborantibus, nec non iis, quibus vires per moerorem, medullis insidentem, amorem, vigilias exhaustae sunt. Multum confert frigus insuetum autumnale, praesertim refrigerium abdominalis post pastum, nimium otium, deficiens exercitatio, vita seden-

dentaria, abusus spirituosorum aeque ac acidorum; maxime cereuisiae acefcantis et vini oligophori.

§. 114.

Febris haec plerumque sine periculo est, fed interdum esse solet cum lae visceris, et tunc mortem infert. Est vero omnibus aliis pertinacior, praesertim autumnalis, quae nonnunquam per aliquot menses ad vernum vsque tempus durat. Leguntur exempla, vbi per plures annos aegri quartana laborarunt. Hyeme raro veram medicationem admittit febris. Febrem vero breuiorem longioremque reddunt, aetas, temperamentum, victus, aer, animi pathemata, corporis habitus. Plerumque plurimum prodest, si aer et potionis genus mutantur. Si recte curatur, sine noxa est, imo quartanam saepe fere desperatis morbis mederi, supra retulimus (§. 113.). In corpore vero infirmo, et si aliae causae adsunt, facile in hydropem degenerat. Pertinacior interdum soluitur haemorrhoidum fluxu, purpura scorbutica, scabie, diarrhoea, in quarum omnium excretionum curatione caute agendum, et in tota febris Therapia non nimis properandum est. In genere peruersa medendi methodo haec febris facile in alios peiores morbos mutatur; opiatibus in affectus soporosos, conuulsiones; cortice Peruiano in hydropem atque icterum, malum hypochondriacum, viscerum scirrhus; abusu euacuantium, purgantium, interdum in continuam, crebrius in lentam atque hecticam; voracitate autem aegri in Cachexiam et tumores oedematosos. Haec febris prae caeteris etiam omnibus, si curata fuit, reuertitur. Pertinacior peiorque est quartana duplex, quae facile in continuam, vel lentam mutatur.

§. 115.

In curatione naturam sequi oportet, quae lentis motibus materiam pertinacius inhaerentem, non vehementioribus emoliri solet. Quare enitendum est, vt materia illa praeparetur, post euacuetur, et vt robur partibus restitua-
tur. Igitur ab initio et per aliquod tempus dari solent Sales
digestui,

digestiui, praecipue alcaliscentes, Card. bened. Absynth. Thermar. Carolinar. nec non alii Sales neutrius generis, Tart. vitriolat. Arcan. dupl. Tart. tartarifatus, Sal mirabile Glauberi, &c. quibus parum Nitri et absorbentis addi possunt, qui pulveres ante accessionem dari debent. Sudor non facile mouendus est; tempore vero integritatis, et quidem secundo tertioque die, maxime si iam aliquot paroxysmi deserbuerunt, commode parari potest infusum per epicrasin laxans. Loco huius etiam proficiunt Pilulae Beccheri, pulueres ex Rhabarbaro et Sale digestiuo, nec non Sal Thermar. Carolin. versus paroxysmum ad drachmas ij. vel iij. datum.

§. 116.

Plurimum ad hanc febrem expugnandam facit corporis exercitatio et victus. In plurimis aliena est cerevisia, nisi fuerit valentior et lupulo bene condita. Vinum generosum tempore integritatis pauca in quantitate dari potest. Decoctum ex Cort. Chinae cum Cassia lignea, vel aliud ex rad. Scorzonerae, Sarsaparillae, Cichorii, C. C. sem. Foeniculi, quam maxime conducit. Cibi sint eupepti, et vitetur omnis cruditas a voracitate et ingluvie. Si vero etiam unquam nimia abstinentia nocere potest, nocebit in hac febre.

§. 117.

His tandem per tempus adhibitis, et si signa adsunt, de quibus supra retuli (§. 75.), dari potest Cort. Peruvianus, observatis omnibus, quae supra praecepimus.


§. 118.

Quartana pertinacior interdum expugnatur usu Thermarum et Acidularum, praecipue Pyrmontanarum et Egranarum, quas vero non, nisi tempore integritatis, potari expedit. Addi his possunt Sales cathartici, praecipue Thermarum Carolinar. ad drachmas ij. vel vnciam dimidiam, vel, quod fere praestat, horis vespertinis, ante potandas aquas, dari possunt Pilulae supra descriptae (§. 105.), vel Pilulae de Ammoniaco Quercetani, et similes.

§. 119.

§. 119.

Vt ventriculus robur retineat, tempore integritatis ante pastum aeger sumat Ess. carminat. vel Elixir. stomach. ad methodum HOFFMANNI ex vino paratum. Non contemnendi vsus sunt, in quartana pertinaci curanda, inunctiones spinæ dorsī, cum fricatione, adhibitis linimentis nervinis. Iis, qui tempore paroxysmi se multa potione ingurgitant, plerumque pedes intumescunt. Vinum generosum, quod acidulae requirunt, etiam his non alienum est.



FEBRES EPIDEMICAE, VAGAE, AST MALIGNAE.

§. 120.

De his vide *Frider. HOFFMANNI Medicinam rationalem systematicam*. Id potissimum observari oportet, caute agere debere medentem, quum saepe eiusmodi febres nec euacuantia ferant, nec acriores copiosioresque sales. Dari possunt ab initio pulveres et potiones absorbentes et bezoardicae cum paucō Nitro; tempore vero remissionis, lenioribus ducenda aluus, Pilulis balsamicis, Rheo, Manna Calabrina, Cremore Tartari et similibus. Tandem vero, si febris magis ad intermittētis naturam adpropinquat, et si post aestum multus sudor insequitur, is iuvare potest infusio calida et Essentia alexipharmaca, quae tamen non nisi exigua dosi exhibenda est. In his febribus nimius calor, tum, qui aëre, tum, qui medicamentis excitatur, plurimum nocet.

SEMI-

* * * * *

SEMITERTIANA.

§. 121.

Ethæc febris noscenda est, quam descripsit HIPPOCRATES, *Epidem. Lib. III. p. 869. Tom. I. Edit. Linden.* et CELSVS *Lib. III. Cap. III.* Quasi composita est febris ex genuina intermittente et tertiana continua. Singulis diebus eius accessio vel exacerbatio reuertitur. Primum incurSAT tempore matutino horripilatione, calore non ita magno, et corpus paullulum madescit; eodem die versus vesperam nouus et valentior horror maiorque aestus. Altero die maior, sed non perfecta integritas est, vespere autem noua fit exacerbatio, nouusque horror. Tertius dies iterum, vt prior, duas habet accessiones. Haec semitertiana contagiosa non est. In tertiana duplici vero est integritas, in hac nulla. Cum hac febre magna anxietas esse solet, praesertim horis vespertinis.

§. 122.


Sub nostro coelo rarior est, frequentior in Italia, vbi, post diuturnos aestus, noctes valde frigidae sunt, et vbi etiam homines aquam niuatam vel glaciale potant, et fructibus dulcibus vescuntur. Ea laborare dicuntur homines laute viuentes, corpus non exercentes, et quibus suppressa sunt catamenia, haemorrhoides. Facile inflammatione interna, et mesenterii inprimis, finitur et funesta est. Soluitur siue diarrhoea, mutatur quandoque in tertianam, vel lentam.

§. 123.

Auertendum est in hac febre inflammationis periculum, quare etiam sales et purgantia euitanda sunt, maxime si aestus accedit et agrypnia. Si aestus non magnus est, repurgari debent primæ viæ leni cathartico, Rheo et similibus, Apozemate ex Tamarindis, Manna, fol. Sennae.

Ante

Ante omnia vero, et mox ab initio morbi, in aluum immitti debent lotiones ex decocto emollientium, addito oleo leniore, id quod etiam iterandum est. Necessarium vero est, ut aeger bibat Ptisanam. Proficit etiam decoctum Auenae excorticatae, nullo addito butyro, sed passulis. Hoc decoctum etiam, addito oleo, commode in aluum immittitur. Si aluus mouenda est, id fieri haud debet illo die, quo duplex accessio est.



FEBRIS CATARRHALIS BENIGNA.

§. 124.

Frequentissima omnium est Veteribus quotidiana continua dicta. Aeger sentit languorem, torporem, sensuum obnubilationem, cephalalgiam, horis vespertinis horrorem. Hunc excipit aestus molestus in faucibus, pectore et capite, sensus atque dolor quasi grauatiuus. Micturiens est, et ab initio pallida vrina, aluus sicca. Quotidie versus vesperam fit exacerbatio, et primis diebus cum horrore. Tandem post aliquot dies febris soluitur, vel sudore multo, eoque foetido, vel diarrhoea, vel catarrho et destillationibus ex membrana pituitaria et pulmonibus. Non raro omnes hae excretiones fiunt. Finitur septimo, quandoque etiam quarto die.

§. 125.

Causa huius febris est serum acre, per cutim excerni solitum, quod, a quacumque causa repressum, conuertitur in intestinorum, membranae pituitariae, pectoris et pulmonum glandulas excretorias, vel etiam per cutim et sudorem excernitur. Eius frequentior occasio est subitanea tempestatum vicissitudo, et si tum sudor, tum exspiratio reprimantur. Euenire etiam iis solet, qui corpus ex potu spississimo

rituoso calens noctu stragulis non satis operiunt; qui post sanguinis missionem aliamue vehementem euacuationem, acicularum et thermarum potum, corpus aëri frigidiori committunt; qui noctu sub dio, vel apertis fenestris dormiunt; qui in aëre paludoso viuunt.

§. 126.

Febris differt a febre quotidiana intermittente, quippe quae habet integritatis tempus, quod catarrhalis non habet, saepe epidemica est. A maligna differt symptomatibus, de quibus protinus dicendum erit. Benigna raro periculum adfert, nisi senibus et valde infirmis, in quibus coctio materiae peccantis aegre perficitur. Grauior esse solet illis, quibus lymphæ iam corrupta est, veluti cacoehymia, scabie, scorbuto, morbo venereo laborantibus. Vel si vitium aliquod in viscere est, praecipue in pulmonibus. Quandoque illa, praecipue regimine calido et datis medicamentis calidis, conuerti potest in exanthematicam, purpuratam, vel petechialem, vel etiam inflammatoriam. Si vero corpus praeter necessitatem sanguinis missione, purgantibus aliisque debilitatum fuit, mutatur in lentam, vel ex ea relinquitur pertinacior catarrhus.

§. 127.

In curatione primum est regimen, et hoc, et aliis auxiliis adhibitis, enitendum est, vt serum illud acre bene coctum et praeparatum per congrua loca excernatur. Quare oportet nec hanc febrem nimis tenuare, nec iusto magis accendere, sed moderari. Ob id etiam, si actus non magnus est, Nitrum fere alienum esse solet, cuius tamen pauciora grana pulueribus ex Antimonio diaphoretico, Lapidibus cancrorum, cum acido Citri, Conchis et Cinnabari adici possunt. Melior fere est Liquor terrae foliatae Tartari pro opulentioribus, cum diaphoretico fixo datus.

§. 128.

Si nimia acrimonia pectus vexat, dari possunt lenientia et lubricantia, quae alio nomine dicuntur bécchica. Nocet
tamen

FEBRIS CATARRHALIS BENIGNA. 51

tamen horum abusus, quum nimium laxari soleant pulmones. Dari itaque possunt talia, v. g. Syrupus capillorum Veneris Montispel. cum infuso calido, etiam ipsius Théë, vel succus Glycyrrhizae, sperma Ceti, Syrupus de Althaea; Emulsio ex Amygdalis, Pineis et semine Papaveris, decoctum Auenae excorticatae; decoctum Caricarum pinguium, Passularum et fructuum Sebesten; Eleosaccharum ex oleo Amygdalarum dulcium cum Saccharo et paucis Croco.

§. 129.

Vbi aestus se paullulum remisit et corpus madescere incipit, addi possunt pulueribus vel potiunculis pulueres bezoardici. Conuenit infusum calidum ex rad. Scorzonerae, Salsaparillae, Vincetoxici, herba Capillorum Veneris, Veronicae, fl. Sambuci, Chamomillae. Etiam adici possunt pauciores guttulae Essentiae alexipharmacae, cuius dosis pedetentim augenda est, quo humorum depuratio fiat.

§. 130.

Si vero febris in tussim degenerat, conducunt illa supra dicta lubricantia (§. 128.). Si tenacior mucus est, cum iis proficit Mixtura ex Essentia Pimpinellae et Glycyrrhizae. Si tussis diutius durat, cum multa excretionem, tandem et sub finem dari possunt cortex Cascarillae in puluere ad scrup. dimid. vel gr. XV. vel in Essentia ad gutt. 40.



FEBRIS CATARRHALIS MALIGNA, VVLGO DICTA PETECHIZANS.

§. 131.

Epidemica est, plerumque contagiosa. Aegri sentiunt torporem et eadem fere symptomata, quae in febre catarrhali benigna (§. 124.), maiorem tamen imbecillitatem.

tem. Accedit fastidium et cardialgia. Horis vespertinis horror incurſat, quem excipit aëſtus, agrypnia, inquietudo, exquisitus artuum et lumborum dolor. Haec ſe horis matutinis paullulum remittunt, vesp̄eri vero noua ſit exacerbatio, quae ſaepe etiam alternis diebus vehementior eſſe ſolet. Pulſus celer, paruus et debilis eſt. Si febris maiorem malignitatem habet, accedit lipothymia, delirium, vomendi conatus, et inter quartum ſeptimumque diem petechiae conſpiciuntur, modo maiores, modo minores, coloris etiam magis vel minus rubicundi. Aliis vero, id quod etiam fere melius eſt, nullae petechiae erumpunt, ſed crebriores ſunt deiectiones. Soluitur febris vix ante decimum quartum diem, aliquando poſt hunc, plerumque mutatione facta in vrina atque ſudore.

§. 132.

Haec febris, et ſymptomatum exacerbatione, et maiori periculo, a catarrhali benigna differt; vera tamen petechialis, cui haec exanthemata neceſſaria eſſe ſolent, hac periculoſior eſt. Graſſari ſolet haec febris praecipue autumn̄o et hyeme. Ei ex epidemica conſtitutione maior vel minor malignitas eſt. Sedes eſſe videtur in glandulis excretoriis variis, maxime inteſtinorum, ad quas humor ille, per inſenſibilem exhalationem excerni ſolitus, conuertitur. Eſt vero aliquid in aëre atque victu, quod epidemicam malignitatem vel auget, vel minuit. Corpora infirma et quae lautiori et opiparo victu aluntur, praecipue ſenum, ex hac febre plurimum periclitantur. Saepe haec febris funeſta eſt, nunquam ſine periculo. Periculum ſignificant maior imbecillitas, vehementior aëſtus, crebriores deiectiones, vel alius penitus adſtriſta, et maior inquietudo. Si ſudores erumpunt foetidi, cum coſtione ſignis, illi boni ſunt.

§. 133.

Si petechiae conſpiciuntur, optimae ſunt rubellae, peſſimae obſcurae et liuidae, nec non quae protinus iterum euaneſcunt. Quo pauciores, eo meliores ſunt. Si petechiis

chijs iam praesentibus aeger de magna anxietate conqueritur, metus est, ne inflammatio oriatur, vel ne superueniat purpura, praecipue si aestus se non remittit. Purpura haec maligna est, quae etiam quandoque sub finem morbi, nonnumquam post decimum quartum et vigesimum diem oritur, ubi tamen, si cetera paria sunt, tolerabilior esse solet, quam quae citius adparet. Si faucium inflammatio et angina accedit, morbus plerumque lethalis est. Mala sunt tormina, et cum his vehementiores et crebriores deiectiones. Bona est surditas, quae cum coctionis signis in declinatione oritur. Considerari cum his omnibus debet pulsus, qui semper melior est, si paullo fortior et aequalis. Inter pessima etiam et futurae inflammationis signa est vomitus, et si ventriculus omnium rerum impatiens est.

§. 134.

In hac febre curanda oportet naturam sequi, eamque non turbare, omniaque eo dirigere, ut materia halitiosa, putrescens, noua atque contraria materia addita corrigatur subigaturque, et per loca opportuna excernatur. Quandoque tamen viribus prospiciendum et symptomatibus medendum est.

§. 135.

Quae supra de sanguinis missione (§. 66. 71.) et vomitu (§. 60. sqq.) dicta sunt, hic considerari debent. Raro his opus est ab initio febris; perniciosissimae sunt euacuationes, si febris iam adoleuit. Materiam vero putrem optime corrigunt acida, spiritus minerales acidus, spiritus Vitrioli, Nitri, Salis communis, Clystus Antimonii, spiritus Sulphuris, qui adici possunt Iulapiis, ex aquis diaphoreticis et syrupis vegetabilium acidorum paratis. Possunt etiam absorbentia proficere, si cum acidis dantur.

§. 136.

Minorem fere efficaciam habent diluentia cum acidis. Pauperibus proficit cereuisia secundaria iam aliquantulum aescens, vel decoctum panis domestici cum aceto; opulentioribus

54 FEBRIS CATARRHALIS MALIGNA.

tioribus vero decoctum hordei cum succo Citri, decoctum panis cum duodecima circiter parte vini Rhenani, vel decoctum Cerasorum acidorum siccatorum vna cum nucleis contusorum. Decocto hordei adijci potest gelatina Ribesiorum, Syrupus acetositis Citri, Rob Cerasorum. Semper quoque paucae guttulae spiritus acidi his adijci debent. Videndum, ne, si dulcia admiscantur, nimium increbescat diarrhoea. Etiam multi vsus est, praesertim horis matutinis, decoctum pullorum cohortalium valde tenue, cum multa herba Acetosae, nec non decoctum Auenae excorticatae cum Passulis, vel decoctum Hordei excorticati cum succo Citri. Ex his vltimis etiam victus parandus est. Nocent omnia iurulenta carnesque.

§. 137.

Vbi febris se paullulum remittit et corpus madescere incipit, sudor quidem non vi mouendus, sed lenioribus iuuandus. Dari possunt ex Ptisana, vel etiam in infuso Thée, pauciores guttulae Mixturae simplicis, vel Mixtura ex liquore anodyno, vel spiritus Salis dulcis cum Spiritu bezoardico. Summopere enim cauendum est, ne calidioribus et maiori eorum dosi noua febris incendatur.

§. 138.

Inter symptomata huius febris est praecipue diarrhoea, quae toleranda est. Si aluus adstricta est, quae febrem longe peiorem reddit, oportet illam soluere clysteribus ex decocto furfuris, vel herbarum emollientium, additis Oxymelle, Oleo recenti et Nitro. Si vero diarrhoea vrget, etiam immitti possunt eiusmodi lotiones sine melle et Nitro, addito vitello oui. Diarrhoeam etiam plurimum cohibet decoctum modo laudatum pullorum cohortalium cum succo Citri vel herba Acetosae. Si diarrhoea crebrior vires conuellit, illam moderari oportet Diafcordio Fracastorii.

§. 139.

Vires tueri possumus aquis fragrantibus, aqua Cinnamonii cydoniata, aqua Melissae &c. quae varijs Mixturis adijci

adiici possunt. Etiam decocto panis adiicitur Vinum Rhenanum, vt supra retuli (§. 136.), et pani tosto pauxillum Sacchari et Cinnamomi. Ditiorebus etiam dari potest Liquor perlarum ad drachmam vnam pro dosi.

§. 140.

Si magna anxietas praecordiorum est, proficiunt lubricantia, emollientia, decoctum radicis Altheae, emulsiones et alia. Si caput valde dolet, epithemata imponi possunt ex crusta panis domestici, cum Sale et baccis Iuniperi contritis et aceto respersis. Euanescentibus petechiis reuocari debent maiori calore et datis bezoardicis siccis. Vesicatoria profunt, si aeger non tam delirat, quam sopore oppressus est.

§. 141.

Regimen sedulo imperandum. Nam et minimus error nocet; veluti aëris frigidioris adflatus, stragulorum et lintheorum mutatio, situs erectus, animi pathemata et alia, quae quandoque celerius mortem adferunt.



FEBRIS PETECHIALIS VERA.

§. 142.

Parum a priori differt, nisi, quod in hac petechiae semper erumpant, et quod in ea maior malignitas maiusque periculum sit. Aegri summam sentiunt imbecillitatem, meticulosi sunt, animo abiecto, et frequens illis est lipothymia. Petechiae quarto quintoque die conspiciuntur, et post aliquot dies iterum euanescent, quo tempore vrina mutatur, crassa fit et turbatur. Morbus soluitur quandoque diarrhoea, crebrius sudore multo, male olente.

§. 143.

Et haec febris plerumque epidemica est et contagiosa, ac non raro oritur ex impuro castrorum vel paludoso aëre,

aquis minus puris et salubribus, malo victu, et qui noctu corpus non fatis operiunt, ea frequentius laborant.

§. 144.

Praeter ea, quae huic feбри cum aliis communia sunt, in illa compertum est, eos prae aliis periclitari aegros, quibus petechiae sine ullo febris sensu oriuntur, et si post eruptionem febris insequitur. Mala ceteroquin signa sunt, pulsus valde debilis et inaequalis, sitis multa vel serina, sopor, et conspicuis iam exanthematibus novus horror, rigor et conuulsio.

§. 145.

Curatio huius febris a priori differt (§. 143.). A primis initiis solui debet alius clysteribus vel decocto Tamarindorum cum Manna. Sedulo tamen notandum, haec primo alteroue die dari posse, et minime, si iam petechiae conspicuae sunt. In morbi declinatione quandoque laxantia necessaria sunt, ubi tamen optime prosunt pulueres ex Rhabbarbaro, addito Cremore Tartari. Si magna virium debilitas est, dari possunt Lulapia, quae reliquo morbo quoque accommodanda sunt. Aquae analepticae cum Confectione Alkermes, puluere bezoardico, et ipso Bezoar ad gr. XV. vel scrupulum vnum pro dosi, proficiunt, si exanthemata iterum euauerunt. Pauperibus in hoc casu et in magna imbecillitate optimum est panis tostus, cui adfunditur paululum vini meracioris, vel solius, vel cum aqua, addito Saccharo et Cinnamomo. Qui, grassante hoc morbo, ab eo tuti esse volunt, eos oportet vitare cubicula humida, et aërem paludosum, corpus debent operire, crebrius lintea vestesque mutare, et aëri exponere, maxime si inter aegros versandum est; abstinere a Venere, ingluvie aliisque, quibus corpus debilitatur. Inter cetera auxilia sic dicta prophylactica optimum est cyathus Vini Rhenani modicus, animusque compositus.

PESTIS.

P E S T I S.

§. 146.

Vera Pests semper ex Oriente affertur, vbi, vt videtur, ex aëre impuro, maxime post graues inundationes, nascitur. Sub coelo enim feruidiori effluuia putrescentium attenuantur et ad nocendum efficaciora sunt. Materia morbi, cuiuscumque indolis illa sit, inhaerescit vestibibus laneis, pellibusque animalium, quare etiam illa conclusa ad dissitas longinquasque regiones perfertur, et morbus aequè in his, ac in locis, vbi coepit, contagione quam celerrime propagatur. Vehementius saeuit tempore aestiuo; minuitur autem frigore, vel penitus exstinguitur. Pests etiam ab initio, si in aliquam prouinciam illata est, longe periculosior esse solet, et post sub alieno coelo quasi mitescere videtur. Cuius tamen indolis eius materia sit, num verminosa, num subtilis, alcalina et putrescens, nondum adeo certum videtur.

§. 147.

Medici Massilienses ante aliquot annos Peste demortuorum corpora incisa scrutati sunt. Repertum fuit cor praeter naturam tumidum, illud, atque omnia, praecipue cerebri vasa, arteriae atque sinus venosi, multo et atro sanguine plena atque turgida. Viscera sphacelo corrupta, hepar tumidum, maculis nigris distinctum, bilis copiosior, ex viridi nigricans atque acerrima, non solum in folliculo selleo, sed etiam in ventriculum atque intestina effusa. Huius tanta acrimonia fuit, vt morbum etiam intulerit canibus aliisque animalibus, si illa aqua remixta, mediante siphone in venam immissa, vel in vulnus demissa, vel ab animali denotata fuit. Immo bilis canem interimit, qui per multum tempus purulentam bubonum saniem aliaque noxia deuorauerat. Horum etiam canum bilis aliis canibus longe magis pestifera fuit, et hos celeriori adhuc morte exstinxit. Peste

D 5

demor-

demortuorum cadauera longe celerius et teterrima putredine corrumpuntur.

§. 148.

Qui peste pereunt, vel subito extinguuntur, sine omni fere morbi sensu, vel moriuntur ex gangraena partium internarum, aliquando etiam externarum. Qui ad sanitatem perueniunt, vix umquam crisi, per sudorem, diarrhoeam, urinam, haemorrhagiam, leuantur, sed per exanthemata et tumores criticos, anthraces et bubones. Omnis vero pestilentia symptomatibus variare videtur.

§. 149.

Ex symptomatibus pessima sunt, subita imbecillitas, quae veluti malignum sidus aegrum ferit et afficit, vagus horror, pulsus velox, parvus, mollis, inaequalis, sensuum torpor, oculorum squalor et toruitas, facies cadauerosa, plumbea, vox tremula, lingua tenacioribus fordibus obducta, scabra, nigra, fissa, sanguinolenta, anima male et cadauer olens, animus abiectus, crebrior vomendi conatus; tales omnes breui obeunt. Sunt alii, qui de extremorum refrigerio, interno aestu, siti intensa, cephalalgia conqueruntur, qui etiam certo, sed non tam celeriter obeunt.

§. 150.

Vnica salus speranda a virtute ipsius naturae. Si absque vehementioribus symptomatibus, vel iis mitescantibus, exsurgunt bubones, et si illi pus alunt, spes est, seruatum iri hominem. Ex bubonibus meliores sunt, qui in inguine, quam qui sub alis aut in parotide oriuntur. De his et carbonibus dictum fuit in Chirurgia. Sunt carbunculi peiores bubonibus, his vero periculosiores petechiae. Omnia haec si, postquam adparuerunt, iterum euanescent, vel liuidum colorem nanciscuntur, mortem instare significant. Haemorrhagia, vel sudor, si tempore cruditatis eueniunt, mortem praefagiunt. Sudor tamen cum coctionis signis quandoque bonus esse solet.

§. 151.

Parum differt curatio ab illa, quam febris petechialis requirit (§. 145.). Nocentissima sunt euacuantia, vel emetica, quae etiam ab initiis primis non sine periculo dantur. Omne praesidium petendum est ab acidis. Pauperibus dandum est acetum vini, aqua diluendum, vel acetum cum Ruta, Scordio, Absinthio coctum vel destillatum. In officinis prostat aqua prophylactica Sylui et acetum bezoardicum, cuius tertia quaque hora vncia dimidia ad vnam cum aqua vel simpliciori, vel destillata exhiberi potest. Commode etiam datur Oxymel cum aqua diapnoica. Proficiunt supra laudati Syrupi (§. 145.) cum spiritibus mineralibus acidis. Viribus opitulatur vinum generosum, praecipue Rhenanum, cum decuplo aquae remixtum, victus etiam ad haec omnia componendus est.

§. 152.

Nulla prophylactica cura melior est, quam fuga contagii, et, si omnia, quibus illud inhaerere potest, animalia quoque domestica per aliorum aedes vagantia, studiosius amouentur. Meticulosi in rure viuant. Quibus inter aegros versandum est, illi crebrius os aceto bezoardico eluant, lintea vestimentaue frequentius mutant, aërique exponant. Nocet imprimis Sapo ex obseruatione DIEMERBROECKII, quare eo lintea non facile imbuenda sunt. De vino generoso acidiusculo alibi dixi (§. 145.). Nocentissima vero est ebrietas. Sunt, qui plurimum tribuunt fonticulis. Animus erectus plus confert, quam omnia remedia prophylactica; salutaris tamen esse potest firma de iis et eorum efficacia persuasio.

PVRPVA SEV FEBRIS MILIARIS.

§. 153.

Est febris exanthematica, hic Lipsiae praeterito Seculo primum obseruata. Pustulae numerosissimae totum corpus occupant, excepta facie, quae figura et liquore, quem continent, ab aliis exanthematibus, colore vero, et, quae comitantur, symptomatibus, plurimum inter se differunt. Febris aliquantum accedere videtur ad naturam catarrhalis malignae, nam semper horis vespertinis esse solet quaedam exacerbatio, matutinis aliqualis remissio. Haec mutatio etiam frequentius alternis diebus incidere solet. Diuiditur in rubram et albam. Rubra raro maligna, frequentius sine febre est. Chronica, quae scorbutica dicitur, corpora tenet, quae lauto victu aluntur, raro, vel nunquam exercentur, praecipue si in visceribus abdominis infarctus est. Aestiuo tempore per plures menses, nonnunquam per totam vitam durat. Alba semper maligna est, melior tamen illa, ubi pustulae maiores oram quasi rubellam habent et ex rubellis albicantes fiunt. Pessima est, ubi pustulae minimae, copiosiores, prorsus pellucidae, cuti inhaerent. Vtrumque genus purpurae, vel idiopathicum est, vel symptomaticum. Saepe enim aliis morbis, etiam exanthematicis, purpura superuenire solet.

§. 154.

Si idiopathica est febris, aeger sentit vagos horrores, unde nomen traxisse videtur, qui etiam horrores, praesente aestu, ex leui commotione et mutatione aegrotantis reuertuntur. Illae horripilationes vagae, et nullo certo tempore incurfantes, hunc morbum praesentem et futuram purpurae excretionem significant. Accedit insolitus languor, dolor capitis grauatiuus, anxietas praecordiorum, horumque quasi strictura, pulsus celer, breuis, modo durus, mo-

do

do debilis, et summa inquietudo. Quarto circiter die pustulae, plerumque primum in pectore, post in toto corpore, excepta, ut dixi, facie, proueniunt. Facta hac excretionem, si res bene cedit, illa symptomata se paululum remittunt, pulsus melior fit, multum minuitur anxietas et inquietudo. Urina, quae primis diebus tenuis erat, nunc in melius mutatur, et magis saturata est. Sequitur mador, et se remittente multum febre, sudor, qui singularem foctorem habet. Nonnunquam vero purpura non simul erumpit, sed per plures dies semper noua prodit, imo quandoque, siccata iam priori, iterum noua reuertitur, ad quam rem tamen plurimum conferre potest, medendi, victus et regiminis ratio. Squamulae in modum decidunt pustulae. Rarum est, purpuram, si totam cutim occupat, et confluentem est, per ptyalissimum criticum solui. Nam et in hac febre, quo copiosiora sunt exanthemata, eo maius imminet periculum.

§. 155.

In hoc morbo, humores lymphaticos corruptos esse, sine dubio est; cuiusnam vero naturae hoc vitium sit, non adeo compertum habemus. Id certum est, morbum esse frequentiore in aëre impuro, paludoso, et iis, qui aquas impuras bibunt, qui, otio et gulae dediti, se variis, maxime glutinosis, implent, qui alui segnitie, et haemorrhoidum obstructione, foeminis vero, quae catameniorum vitiiis, et fluore albo laborant. Ad minimum is in similibus corporibus ortus videtur. Aliquando morbus epidemicus est. Nec rarum est, febrem catarrhalem, quae ab initio, si non benigna, certe non adeo maligna, videtur, purpurae excretionem finire. Hunc morbum ab animi vehementi commotione ortum aliquoties vidi.

§. 156.

Puerperis est frequentior purpura, quae ex ea etiam plurimum periclitantur. In grauidis enim humorum circuitum multum turbari, et magnam vim humidorum, in dilatatis

tatis vteri vasis coaceruatam, tardius moveri, certum est, quare etiam hi humores, vix non prorsus quiescentes, facile vitium contrahunt. Plurimum confert vitae genus, otium et ingluvies, praecipue si his foeminis grauidis sanguis non mittitur, et alius congruis ducitur. Huic morbo etiam magis obnoxiae solent esse foeminae, quibus lac reprimatur, maxime si illae, post editum partum, alui segnitie et obstructione laborant, et si illa non congruis medicamentis ducitur. Frequentissima causa est obstructio lochiorum, maxime si haec orta fuit a laesione et inflammatione vteri, vel si medicamenta calida et pellentia data fuerunt. Plurimum confert, si foeminis, quae ipsae foetum non lactant, iuscula gelatinosa propinantur, et illae in aëre calidiori, inter multum turbam strepitumque, continentur, vel stragulis ponderosioribus opperiantur, nec non si in conclavi, in quo decumbunt, aëri effoeto haud noua impertitur elasticitas.

§. 157.

Purpura malignitate multum differt pro febre, quae eam comitatur, pro corporis habitu, et si epidemica est, pro aëris natura et mutatione. Periculosissima est puerperis, quibus lochia non fluunt, maxime si vna cum lochiis etiam lacteus humor in mammis cohibetur, et si oritur ex inflammatione vteri. Haec tamen quandoque in bono corporis habitu, et si non valde profunda est, soluitur suppuratione. Haec si incidit, remittente se febre multa foetida ex genitalibus seruntur.

§. 158.

Pessima sunt signa, si aegri, praecipue puerperae, de refrigerii sensu in abdomine conqueruntur; si sudore copiosiore, mox ab initio, et magna cum imbecillitate, sine leuamine, diffiunt; si alius crebrius funditur, cum cruditatis signis; si post eruptionem purpurae, pulsus et respiratio anhelosa non in melius mutantur, sed si tunc anxietas illa se non remittit; si vrina pallida est, et aegro crebrior mingendi necessitas; si cum purpura petechiae erumpunt, vel

vel si purpura aliis morbis, defecta iam omni vitali virtute, accedit. Melior vero spes est, si vrina cum coctionis signis, sudor foetidus, lochiorum fluxus naturalis non cohibitus, lac in mammis est, et si per aluum flatus et feces duriores, retentae, excernuntur.

§. 159.

In hac febre vel minimus error funestus esse potest. Regimen sedulo observandum. Aequalis sit et lectuli et aëris calor, minimus nocet perflatus, nec concedenda est indusiorum vel stragulorum mutatio. Nocet potus frigidus, nec tamen proficit nimis calidus. De sanguinis missione saepe magna lis est. Raro illa salubris deprehenditur, nisi in valde plethoricis, in quibus tamen haud admitti potest, nisi a primis initiis. Nocet etiam, si vires ex haemorrhagia in partu, vel aliis causis defectae sunt. Nam purpura laborant etiam foeminae, quae magnam sanguinis profusionem passae sunt, atque si propter defectum sanguinis excretio lochiorum turbatur, hic morbus etiam nasci potest. Si lochia deficiunt in puerperis a primis initiis, illa revocantur temperantibus, non vero calidis medicamentis. Si corpus tale est, quale vulgo vocant phlegmaticum, praecipue si, cum lochiorum defectu, alius adstricta est, id tolerare potest pilulas Beccheri, additis aliquot granis Nitri depurati. His interdum reuocantur lochia. Alius semper considerari debet, nocet enim et fusa et adstricta. Illa non aliis solui potest, quam lotionibus emollientibus, sine stimulo immixtis, nec tamen semper tutum est, eo ipso tempore, quo purpura erumpit, illam his quoque sollicitare. Etiam omnis cereuisia euitanda est, et dari debent decocta ex Hordeo, Scorzonera, Cichoreo, Sassaparilla, cum pauxillo seminis foeniculi, quarum radicum vncia vna coqui potest ex duabus vel tribus mensuris aquae. Nec hic morbus acida fert, nec etiam Nitrum, nisi in exigua valde quantitate. Dari debent medicamenta, quibus lenis diaphoresis excitatur. Etiam opportuna sunt emulsionem ex semine Cardui Mariae,

ex

ex Amygdalis excorticatis, si agrypnia est, semine Papau. additis matr. Perlar. mandibulis Luc. piscis, C. C. sine igne, paucioribus etiam granis Nitri, et ipsis etiam margaritis. Vbi aestus se remittere et corpus insudare incipit, Emulsionibus admisceri potest Antimon. diaphoret. recens paratum, et supra dictis pulueribus seu potionibus, pulvis bezoardicus. Si purpura euanescit, danda sunt in maiori copia diaphoretica, pulueres bezoardici, et opulentioribus lapis bezoar. Admoueri possunt artubus vesicatoria, quae praesertim in eo casu vtilia sunt, vbi ager sopore oppressus est. Commode parantur e fermento panis, cuius vncia vna malaxari potest cum drachma vna Cantharid. vel etiam ex emplastro de Meliloto, cuius vnciae j. adiicitur Cantharidum drachma j. cum dimidia.

§. 160.

Sales omnes et valentiora acida, etiam aliis morbis malignis opportuna, hic aliena esse vsu compertum est. Nitrum, si aestus vrget, paucum admodum, ad grana circiter II, III, IV, pro dosi, locum habet. Si in confluyente Purpura ptyalismus criticus oritur, ille nullo modo cohibendus, sed data Cinnabari ad scrupulum dimidium vel gr. XV. iuuandus est. Gargarismi parari debent ex emollientibus, rad. Altheae, flor. Sambuci, Verbasci et similibus. Interdum vna vel altera guttula Ess. Pimpin. alb. frustulo Sacchari excipi, et in ore liquari potest. Perniciosa sunt omnia adstringentia. Superato tandem morbo, et quam primum illud vires permittunt, alius ducenda est Rheo, et leuissimis medicamentis, et si omnis febris deferbuit, dari per aliquod tempus debent alexipharmaca.

§. 161.

Purpura scorbutica sine febre est, quae oriri videtur, si lymphae serum salsum atque corruptum admixtum est. Illa frequentius laborant corpora rara, succo plena, quae victu falso, multisque aromatibus condito, aluntur, praecipue, si cereuisia bibitur valentior, vel nimis tenuis ac
fermen-

fermentescens. Multum confert abusus potus Coffee, et fumus Tabaci, cum his etiam nimius calor et quies. Non raro purpurae pertinacioris causa est infarctus in visceribus abdominis. Saepe cum catameniorum et haemorrhoidum obstructione esse solet. His causis accommodanda est curatio. Valentiora anacuantia, purgantia et sanguinis missio, quandoque periculum adferre possunt, citamque mortem. Aluus tamen lenioribus ducenda est, pilulis Beccheri vel aliis. Saepe plurimum confert, si, pro potu ordinario, vel aqua pura fontana, vel decoctum hordei, C. C. Scorzonerae, Saffaparillae, cum paucis Foeniculo datur. Nonnunquam praesidium petendum est ab aquis mineralibus, quae vero potari debent tempore verno, et ubi purpura nondum inualuit. Aquae vero minerales seligendae sunt aegro convenientiores. Foeminis corporibusque imbecillis plurimum proficiunt Selteranae, cum lacte, praemissis tamen aliis valentioribus. Sub finem huius curationis usum habent Balnea, ex aqua dulci, fluuiatili, cur etiam, si ita videtur, lac vel decoctum Fursurum admiscere potest. Calidioribus medicamentis, sanguinem purgantibus, si aduersus hoc purpurae genus dantur, accendi potest febricula mali moris.

§. 162.

Purpura puerperarum, tanto magis succo plenarum et plethoricarum, ex quibus alio tempore multum est Catameniorum profluuium, auerti potest, si sanguis, et medio gestationis tempore, et iterum proxime ante partum mittitur. Priori tempore detrahatur ex brachio, sub finem gestationis ex talo. Nunquam in grauida tolerari debet aluus obstructa, quae, vel lotionibus, vel Manna, vel pulu. ex Rhabbarbo, Nitro, et terreis solui debet; foemina corpus moderate exerceat, et euitet refrigeria, potissimum pedum et genitalium. Victus etiam ex fructibus horaeis, ex glutinosis, et arte pistoria paratis, nimius potus Coffee, vini, cereuisiaeque valentioris, nec non potus iusto parcior,

pluri.

plurimum conferre possunt. Post partum euitanda sunt in victu et medicamentis omnia calida, aëris nimius calor, ~~hor~~ effoetus, et frequentia hominum omni elatere priuatus, nec non stragulorum pondus, quae omnia plurimum ad purpuram euocandam et febrem accendendam faciunt. Nocent etiam, nisi foemina magnam haemorrhagiam passa fuerit, iuscula valentiora. Amouendus est, si fieri potest, omnis strepitus, et foeminarum potissimum turba. Alio post partum prospiciendum est, et maxime, si foemina ipsa foetum lactare nolit, alius ducatur, tertio circiter die, apozemate antiphlogistico. Foeminis, quae pacatiores sunt, et quae haemorrhoidibus non vexantur, dari etiam possunt pilulae Becheri. Ad purpuram auertendam plurimum facit, si cruor post partum in vtero collectus, vel manu obstetricia, vel etiam per dolores atque spasmos expellitur. Ad id proficere potest decoctum auenae excorticatae, cum oleo Amygdalar. dulc. vel infusum rad. Althaeae, flor. Chamomillae, Sambuci. Apud nos in usu est decoct. flor. Chamomillae cum cereuisia. Plurimum et ad hoc confert, si iusto tempore et congruis medicamentis, praecipue laudato apozemate, alius ducitur. Nihil perniciosius est, quam, si contra illos spasmos atque dolores post partum dantur sopientia.



VARIOLAE.

§. 163.

Nomen traxerunt a Varis, faciei tuberculis, quorum mentionem facit CELSVS. Num Variolae Veteribus cognitae fuerint, disputatur. Qui recte illas descripserunt, fuerunt Arabes. Nec disputandum est de causa proxima, et materia, quae talis est, ut vix non omnes homines semel per totam vitam et raro saepius hoc morbo aegrotent.

tent. Sunt frequentius epidemicae, raro sporadicae, et vix non semper contagiosae. Epidemicae plerumque tempore verno incipiunt, et per aestatem atque autumnum grassantur, quae tamen ut plurimum benigniores sunt illis, quae hyemae media incipiunt. Sunt plures differentiae: Benignae, quae etiam praeter regimen et abstinentiam nullam curationem postulant. Malignae, quarum pro diversa epidemica constitutione magna varietas est, et praeterea discretae, contiguae, confluentes, parvae, magnae, molliores, dariores, verae et nothae, in quibus etiam differentia est, et germ. appellantur *Wind- Wasser- und Spitz-Pocken*. Est genus valde malignarum, quod descripsit etiam SYDENHAM, in quo epidermis in maiores bullas attollitur, sub qua vera gangraena est.

§. 164.

In Variolis omnibus considerata sunt quatuor tempora. Primum tempus, quod contagii dicitur, et quod a primo ad tertium quartumque diem durat, convenit cum omnibus aliis morbis exanthematicis. Variolas vero imminere intelligitur ex epidemica constitutione, et si aeger nondum variolis laboravit. Is conqueritur de horrore, vel rigore, nausea, vomitu, tussicula, praecordiorum lumborumque dolore, vomitu, quo saepe bilis reiicitur. Febris cum omnibus symptomatibus persistit, incrementum, aegris singularis splendor oculis obversatur. In multis hoc ipso tempore sequitur nervorum distentio, quae, quam primum exanthematum etiam pauciora proveniunt, cum vomitu conquiescit. Altera periodus est tempus inflammationis, a quarto ad octavum circiter diem. Proueniunt ab initio maculae rubicundae, depressiores, quae pedetentim attolluntur, et cum omnibus inflammationis signis in veras pustulas, humore turgidas, mutantur. Tertium tempus est tempus suppurationis, qua in cute insensibilis exspiratio multum cohibetur. Intumescit cutis, maxime etiam in palpebris, quae frequentius inter se conglutinantur. In Variolis confluen-

tibus hoc ipso tempore, tum propter cohibitam expirationem, tum propterea, quod pus resorbetur, et humoribus admiscetur, noua incenditur febris summe perniciofa. Fini-
tur haec periodus decimo tertio vel decimo quarto die. Quarta periodus declinationem febris continet, pustulae sic-
cantur, et squamarum in modum defluunt. Hoc tempore, si variolae malignae fuerunt, vel haud recta methodo cura-
tae, ex resorpto pure abscessus variis in sedibus, vitiato etiam quandoque Perioestio, nascuntur, ex quibus interdum nouum periculum oritur. Abscessus sunt saepe sine magna, aliquando sine vlla inflammatione, vt cutis sine hac attollatur, et vt digito sentiamus intus fluctuans pus.

§. 165.

Omnis quidem aetatis et sexus homines Variolis labo-
rant, praecipue infantes. Si aegris primis diebus sanguis mittitur, in eo nihil alieni est, post vero, si febris vehe-
mentior est, in eo reperiri solet illa diathesis inflammatoria. Durante suppuratione magnus pruritus est, qui etiam esse solet in declinatione, quando pustulae siccantur. Sectio cadauerum docuit interdum, non vero semper, visceribus etiam, praecipue pulmonibus, inhaerescere Variolas. Saepe etiam tempore declinationis variolarum siccatarum squamulae per aluum descendunt. Variolae pauciores et benignae quandoque sine omni febre sunt, et videtur quandoque eadem febris esse sine Variolis erumpentibus.

§. 166.

Euentum scire possumus ex communibus, ex aegri habitu et natura morbi epidemici. Quo pauciores sunt pustulae, eo sunt meliores. Confluentes futuras esse, significat imprimis magnus praecordiorum lumborumque dolor, atque aestus, faciei tumor, variolae multae et depressae, coloris obscuri. Bonae sunt, quae lento quasi motu incurfant, tardius quartoque die erumpunt, citius vero pus alunt, et siccantur. Nam nisi in regimine et in medendi ratione per-
catum

catum fuerit, plures moriuntur ex nimis celeri, quam ex tarda eruptione. Meliores etiam sunt distinctae, ab initio rubrae, post quasi crystallinae et pellucidae, sub finem flavescentes, et quae dum albae fiunt, rubicundo quasi circulo circumscriptae videntur. Considerari etiam debet cutis inter pustulas media, quae turgidula esse debet et rubella, non vero depressa flaccida, vel ex obscuro rubicunda, qualis conspicitur, si magna et in Gangraenam tendente inflammatione humorum circuitus in ea cohibitus est. Pessimae variolae sunt depressae, et quibus medijs quasi fouea impressa est, ex atro rubentes, nigricantes, et si vel nulla, vel nimia inflammatio accedit. De gangraenosis supra dixi. Malum etiam signum est, si variolae valde copiosae in pectore et capite sunt, nullae vero in reliquis partibus. Ex iis periclitantur senes et grauidae, nec non foeminae superuenientibus Catameniis, omnes etiam, quibus, si variolis decumbunt, accedunt petechiae, purpura, aliaque exanthemata. Corporibus adstrictis semper maius periculum imminet, quam raris.

§. 167.

Nervorum distentio atque delirium ante eruptionem non adeo timeri debent, praecipue in infantibus. Post eruptionem convulsio plerumque lethalis, et delirium non sine periculo est. Sub eruptione, et praecipue post delirium, narium haemorrhagia multa et critica lenamen adfert. Hanc imminere, significat aeger, qui de maculis rubicundis vel de splendoribus, qui oculis obuersantur, conqueritur. Vomitus primis diebus non ita malus est; post eruptionem valde suspectus. Diarrhoea ab initio morbi, et sub eruptione mala, ad minimum semper peior, quum alui segnities. In confluentibus vero et post absolutam suppurationem bona atque non raro critica. Pessima signa sunt deiectio cruenta, mictus cruentus, haemoptoe, vel haemorrhagia narium pauca. Ptyalismus in confluentibus criticus et bonus est. Vox facilis et respiratio bona inter bona signa sunt.

Angina cum delirio pessima, quae vero oritur se remittente delirio, bona est. Post variolas, imprimis malignas, relinquuntur non solum supra dicti (§. 164.) abscessus, sed saepe etiam oculorum vitia, lippitudo chronica, exulceratio glandularum Meibomii, vel ipsius tunicae corneae, nonnunquam surditas. Hoc etiam accidere solet, si corpus mali habitus est, et si Nitro, aliisque temperantibus, neglectis necessariis euacuantibus, abusus est Medicus. Oculorum vitia plerumque debentur sinistrae curationi.

§. 168.

Curatio morbi genuini vix non omnis a sola natura proficiscitur, et praeter regimen vix quidquam desiderat. Nondum vsu probata est methodus, quam BOERHAAVIUS proposuit, qua, veluti aliae febres inflammatoriae, etiam Variolae auerti posse dicuntur, sanguinis nimirum missione, alui ductione, vel etiam datis Specificis, quae vltima nondum cognita sunt.

§. 169.

Nulla generalis methodus est, sed in omnibus diligentior observatio requiritur. Omne tamen momentum in febris moderamine positum videtur. Si febris mox primo alterone die vehementior est, et corporis habitus sanguine turgidus, sanguis mitti potest, id quod tamen praeter necessitatem fieri haud debet. Non negligi debent clysteres mollientes. Dari possunt eiusmodi potiones ex aquis, addito pauco nitro et antimoni diaphoretico. Etiam acidulata, Oxymel, Serum lactis, Rob cerasorum, ribesiorum, succus Citri, aliaque, moderata tamen dosi, dari possunt, praecipue cum ptisana. Haec ptisana parari potest ex decocto hordei, Scorzonerae, Cichorei, vel ex decocto panis, nec alienum est, si his poma dulcia et matura, veluti Borsdorfiana, adiiciuntur. Semper vero curandum, ne his fructibus, vel etiam aliis, alius moueatur. In victu carnes, oua, omniaque iurulenta aliena sunt. Dari debent puliculae ex auena et hordeo excorticatis, ex frumento

Sa-

Saracenico, quæ ex tenui admodum et pullorum iusculo coquantur, addito aceto vel succo Citri. Nec aliena sunt cerasa acida, pruna pomaque sole siccata, et alia ex vegetabilibus.

§. 170.

Si vero febris deficere videtur, dari possunt mitiora alexipharmaca, quæ vero pauca admodum dosi offerri debent. Si Variolæ iterum euanescent, Essentia alexipharmacæ adiici potest Essentia myrrhæ et croci. Ditiorebus dari potest lapis bezoar ad scrupulum dimidium pro dosi.

§. 171.

Vbi metus est, ne Variolarum nimia vis in caput convertatur, id quod oculi illacrymantes, faciei tumor, delirium, significant, fomenta calida ex emollientibus, cum aqua vel lacte decoctis, admoueri possunt poplitibus et plantis pedum; videndum vero, ne hæc super corpore refrigerant. Non pauci concidere solent cutim in plantis pedum, furisque, quo mala materia in inferiores artus conuertatur; sed hoc auxilium apud nos parentes vix admittunt.

§. 172.

Vbi pus alere incipiunt Variolæ et febris imminuitur, omittenda sunt acida ipsamque nitrum, et dari debent pro potu ordinario decoctum Saffaparillæ, Scorzonerae, Cichorei, cum semine Foeniculi. Si adhuc æstus vrget et *αγγριπνία*, dari possunt emulsionæ ex seminibus frigidis, vel ex amygdalis, semine Cardui Mariæ, sem. Papaueris. Adiici potest nitrum, si æstus illud requirit. Vbi vires deficiunt, admisceri potest analeptica aqua, velut aqua de Cinnamomo, flor. Naphæ &c. Vbi omnia tolerabilia sunt, mox danda sunt insusa aquosa, calida, ex iisdem radicibus, et herba Bëtonicæ, Saluiae, Chæcrephylli, Capillorum Veneris, Scordii, Cardui benedicti, Aniso. stellato; nec cum his aliena est, maxime adultis, Essentia alexipharmacæ. Hæc continuantur eo tempore, quo Variolæ siccantur et squamæ decidunt.

§. 173.

Vbi vero Variolae, quae pus alere incipiunt, copiosiores et malignae nouam febrem excitant, id quod fit nono, vndecimo, quandoque etiam duodecimo die, magnum periculum est. Haec febris oritur 1) tum a cohibita exspiratione insensibili per Variolas confluentes, 2) tum a pure a venis resorpto et sanguini remixto. Experientia docuit, febrem hanc, quae tardius aegrum corripit, et quae a pure resorpto oriri videtur, periculosiorem esse ea, quae protinus post eruptionem et tempore inflammationis oritur. In hoc casu protinus confugiendum est ad epispastica, quae pedibus, suris et poplitibus applicari possunt, veluti Sinapi, Allium, fermentum panis. Sectione in longum ducta plantae pedum concidi possunt hoc etiam tempore, vt magis concitata suppuratione exitus detur malae materiae. Cantharides, quas plures laudant, cum virus habeant et sanguini impertiantur, hic alienas esse puto. Ex medicamentis **SYDENHAM** extollit potissimum Spiritum Vitrioli, qui vel ptisanæ, vel maiori copia aquae admisceri et dari debet ad guttas circiter xv-xx. Vel loco huius dari possunt illa lulpia, ex succis, syrupis et spiritibus acidis parata.

Saepe natura in Variolis confluentibus excretionem ferri, pure etiam infecti, molitur per alias vias, et quidem frequentius in infantibus per aluum, in adultis autem per excitatum ptyalismum. Tunc ergo Medicum naturam sequi debere existimo, et si iam saliuales glandulae intumuerunt, et homo sputat, regimen atque medendi methodum, data etiam Cinnabari, huic excretioni accommodandam esse. In infantibus vero, qui saliuam non exspuunt, sed deglutiunt, mouenda est aluus leniori cathartico, Manna potissimum eaque recenti, Rhabbarbaro et similibus. Laudatur ab aliis Mercurius dulcis, quem infantum corporibus, per morbum debilitatis, non adeo aptum esse reor, cum tutiora prostant. In aluum etiam immitti debent crebrius lotiones, ex decocto auenae excorticatae, vitello oui, terebinthina, cum vitello oui subacta, oleo leniente quouis, non tamen rancido

rancido. Vid. de his FREINDII *Comment. in Hippocr. Epid. Lib. I. et II. Comment. VII. Laur. HEISTERI Dissert. de Manna, et speciatim eius usu in Variolis confluentibus.*

§. 174.

Si hoc suppurationis tempore, vel ex pustulis nigricantibus, vel ex ore et pulmonibus, vel ex naribus, renibus atque aluo, paucus sanguis effluit, summum imminet periculum. Conueniunt acida, et cum his decoctum auenae excocticatae. In his enim propter acrimoniam alcalescentem tenuitatemque sanguinis, non bona speranda est suppuration, sed gangraena. In hoc casu nonnulli etiam extolunt decoctum corticis Peruuiani, quod in aluum immittunt. Vid. *Tentam. Med. Edinburg. Vol. I. Obfer. X.* Nec minus periculum est, si, variolis erumpentibus, foeminis catamenia fluunt. Omne tunc praesidium petendum est a moderato regimine, et datis lenioribus temperantibus, cum diaphoreticis fixis, puluere bezoardico Sennerti, Antimonio diaphor. Grauidis saepe haemorrhagia fit eruptionis tempore, quo vehementioribus spasmodicis auellitur placenta, et sequitur abortus. Res hic plerumque desperata est, nec alia methodus, quam, qualem mox proposui. Si mulier partui proxima est, et haemorrhagia vrget, foetus, quam primum fieri potest, dilatato etiam orificio interno vteri, manu obstetricia eximendus est. Si vero metus est, ne eo tempore, quo Variolae epidemicae sunt, praegnans iis corripiatur, dari debent illa, supra occasione purpurae laudata cathartica (§. 162.), et non negligenda est, si corporis habitus eam postulat, sanguinis missio. Omnia vero haec auxilia opportuna sunt, quando recte adhuc valet grauida; aliena, vbi iam aliquam febriculam, aliaque imminentis morbi indicia sentit; cautus ergo sit Medicus, ne aliquid tunc moliatur. Protinus etiam et quamprimum foemina de languore vel febre conqueritur, in aluum immitti debent clysteres emollientes, (§. 167.). Si

diarrhoea erumpentibus Variolis periculum adfert, dari debet Diascordium, vel Theriaca Andromachi ad scrup. j. circiter pro dosi. In angina conducunt elaeosachara, et in adultis gargarismi ex emollientibus, nec non ex decocto raparum cum sero lactis.

§. 175.

Saepe ex Variolis oculorum vitia relinquuntur. Oculi si Variolis infestantur, lucis impatientissimi sunt, plurimum lacrymantur, palpebrae intumescunt, et tandem medio pure inter se cohaerescunt et oritur ancyloblepharum. Palpebrae si oculos contra aëra tuentur, tunc omnia, quae imponuntur, fere aliena sunt. Nocentissimum vero est, si palpebrae, aqua vel lacte emollitae, inter se diducuntur. Igitur praestat omnem amouere lucem, palpebrarum vero cohaesionem non impedire, easque minime diducere, vtpote quae postea, siccata pituita, sponte aperiuntur. Si vero urget dolor in oculo, nocentissima est frictio. Extrinsecus imponi potest pomum coctum, eiusque medulla, cui granum circiter Camphorae, cum Saccharo tritae, vel, id quod fere melius est, grana aliquot Croci orientalis admisceri possunt. Tumores pure pleni oriuntur a pure resorpto, quod natura expellit. Celerius aperiendi sunt tumores, et, cum plerumque nulla, vel non magna accedat inflammatio, haud expectanda est maturitas. Metus enim est, ne ex his iterum pus resorbeatur, et, humoribus admixtum, in viscera conuertatur.

§. 176.

Foveae et cicatrices relinquuntur a vehemēti inflammatione et suppuratione, nec non a Variolis malignis, et iis, quarum humor rodens est, vt et ab aliis, in quibus suppuratio tardior est, et quae depressiores fuerunt. Igitur si febris et inflammationis ratio habetur, non raro a medente haec deformitas auerti potest. Qui tempore suppurationis varia his pustulis illinunt, rem peiorem reddunt. Vbi
eschara

eschara est, valde dura, conducit oleum quoduis emolliens, praecipue oleum Lini.

§. 177.

Qui evitare volunt Variolas, debent vitare contagium. Eo tempore, quo illae epidemicae sunt, male faciunt, qui infantum corpora, propter prophylaxin, vehementioribus purgantibus sollicitant. Lenioribus tamen alius recte valentium, et nulla adhuc febricula commotorum, ducenda est, et victus sollicite ordinandus, ne primarum viarum eruditates morbum asperiores reddant. De Variolarum insitione, seu inoculatione illarum, legendi sunt Britannici Auctores.

§. 178.

Sunt quaedam genera Variolarum spuriarum, seu notarum, quarum nonnullae angustae et acuminatae sunt, et dicuntur nostratibus *Spitzpocken*, quae vero sero albicante, non autem pure tament, dicuntur *Wasser- und Windpocken*. His generibus Variolarum etiam ii corripuntur, quibus genuinae iam contigerunt. Etiam febris accedit, quae vero, nisi error committatur, longe mitior est, et omnia celerius, ac sine magno periculo, finiuntur. Ceteroquin ~~post~~ superatum omnium Variolarum morbum, et quidem quando squamae iam deciderunt, alius ducenda est, id quod fieri debet in adultioribus apozemate ex Rheo, foliis Sennae, Cremore Tartari, Manna, in iunioribus et infantibus Rhabarbaro, cui vnum alterumque granum Mercurii dulcis vel diagrydii admisceri potest. Elapsis aliquot, sex circiter, diebus, iterum alius ducenda est, id quod tanto magis necessarium est, ubi Variolae malignae fuerunt.

MORBILLI.

§. 179.

Maculae sunt rubicundae, elatiores petechiis, et quasi lenticulis similes, quae vero non ut Variolae attoluntur, nec pus alunt, nec cicatrices relinquunt. Morbilli etiam depressiores, ast ampliores sunt, purpura rubra. Esse solent cum febre, illi simili, quae Variolis accedit, plerumque tamen Morbilli mitiora symptomata et minus periculum habent. Nonnunquam tamen, praecipue, si constitutio epidemica est, accedit contagium et peculiaris malignitas. Tertio vel quarto die maculae conspiciuntur, quae sexto vel septimo aridae factae decidunt. Inter symptomata frequentius accedunt tussis, catarrhus.

§. 180.

Pessimum symptoma in malignis est diarrhoea, et hoc ceteraque docent, hunc morbum in nonnullis cum catarrhali febre convenire. Curatio non alia est, quam febrium exanthematicarum, praecipue Variolarum (§. 169. seq.). Tussi medetur decoctum avenae excorticatae, elaeosacharum, sperma ceti et emulsiones. De diarrhoea supra dictum est (§. 174.). Diutius etiam continuari debent infusa aquosa, sanguini purgando idonea, nec minus necessarium est moderamen in victu.

FEBRES

FEBRES CONTINVAE.

FEBRIS EPHEMERA SEV DIARIA.

§. 181.

Haec febris continens est, et vno die, seu circiter XXIV horis finitur, vnde nomen habet. Oritur a sanguinis orgasmo, et frequens est iunioribus et plethoricis. Occasionem dat plerumque manifestus error in rebus non-naturalibus, nimia corporis exercitatio, mentis agitatio, ira, vigilia, ingluvies, crapula, nimia Venus, et si calente corpore frigida bibitur, vel si sudor repente reprimitur. Difficilius mox ab initio cognoscitur, nisi ex causa, quam leuem fuisse nouit Medicus, et ex corporis recte valentis habitu. Aegri conqueruntur de magna cephalalgia, aestu atque siti, et pulsus velocior est. Soluitur morbus cito, vel magna haemorrhagia, vel sudore multo, et copioso sedimento in vrina, etiam, si ab ingluuie ortus fuit, vomitu, deiectione. Mox pulsus omniaque symptomata se remittunt. Et haec febris, si genuina est et curatione haud turbatur, sine periculo est; si vero calidiora sumuntur, vel alii errores committuntur, mutari potest in inflammatoriam, et quandoque in lentam atque hecticam. Vltimum futurum esse cognoscimus, si febris talis, quae vehementior fuerat, se sine vlla vel notabili excretionem remittit, et si febricula cum magna virium imbecillitate manet.

§. 182.

Raro Medici auxilium requiritur ad hanc febrem curandam, quippe quae, vt dictum est, breui finitur. Primum, quod Medicus agere debet, est, vt aluum, si illa adstricta fuerit, immissa lotionem soluat, et, vt tum abstinentiam a cibo, tum potum diluentem atque quietem praecipiat.

piat. Si magnus est et vehemens capitis dolor, dari possunt pulveres nitrosi. Vbi corpus insudat, dari potest infusum calidum, etiam Essent. alexipharmaca. Si hecticæ metus est, ex diutius manente languore, lentaque febricula, alius duci debet aliquoties Rhabarbaro, et post adhiberi potest Liquor terræ fol. Tartari, cuius drachma j. cum dimidia aliquoties per diem dari potest. Huic commode admiscetur extractum herbar. amaricantis, v. g. Centaur. min. Absynth. Fumariæ. Cum his proficit infusum ex rad. Cichorii, Scorzoneræ, Sassa-parillæ, herba Salviæ, Veronice, Cardui benedicti, Scordii, corticibus Aurantium, semine fœniculi, anisi stellati. Si malum his non cedit, maxime tempore verno, potari possunt ab aegro aquæ Selterianæ, cum lacte asinino vel caprillo. Vbi vero ventriculus lac ferre nequit, sæpe conveniunt iuscula carniū iuniorum, cum herba Acetosæ, Chaerephylli, Nasturtii, et similibus, additis caneris fluviatilibus. De febre ephemera maligna, quam etiam Sudorem Anglicum dixerunt, et quæ olim Britanniam et maiorem Europæ partem depopulata est, scripsit præter alios Io. CAIVS.

SYNOCHVS SIMPLEX ET PUTRIDA.

§. 183.

Hæc altera febrium continentium est, et esse solet vel simplex, et citra putredinem, vel cum putredine, in qua vltima, præter sanguinis turgescientiam et orgasmum, vitium in humoribus est. Hanc Synochum veteres distinxerunt potissimum in πυρετον ὁμοτον, seu febrē, quæ a principio ad finem usque æqualis est, in πυρετον ἐναιμασμον seu ἀναβατμον, quæ, ab initio lenior, indies magis exacerbat, et in πυρετον παραναιμασμον, quæ pedo-

tentiam

tentim decrefcit. Ab Ephemera potiffimum differt duratio-
ne, et quali Ephemera plurium dierum effe videtur. Solui-
tur enim plerumque VII. IX. quandoque XImo die. Illam
praecedat lenis horror, fequitur aestus vehementior cum
omnibus fymptomatibus. Praecipue aeger conqueritur de
magna cephalalgia et molefto ponderis fenfu circa tempo-
ra et frontem; accedit vertigo, fomnus profundior feu ve-
ternofus, ex quo aegri parum reficiuntur. Arteriae tem-
porales pulfant, pulfus eft, qualem in Ephemera descripfi-
mus (§. 181.). Saepe accedit delirium, et morbus non-
nunquam in phrenitidem vel aliam inflammatoriam febrem
mutatur, quando ipfo aestu febrili fanguis cogitur, et in
hoc diathefis inflammatoria nafcitur. Refpiratio valde dif-
ficilis eft. Soluitur, fi res bene cedit, crifi, per haemorrha-
giam, fudorem, et mutatione facta in vrina. Causae hu-
ius febris, quae fine putredine eft, funt omnia, quibus
fanguis in motum cietur, de quibus occasione Ephemeræ
dictum eft (§. 181.). Nam in hac Synocho et in Ephe-
mera magis motus, quam materia peccare videtur. Pluri-
mum confert corpus obefum, fucco plenum, quod victu
pleno opiparoque alitur, et praecipue fi menftrua et hae-
morrhoides non proueniunt. Morbus rarior eft, quo viri
alii, quam iuniores laborant.

§. 184.

Synochus vero putrida, vel ex constitutione epidemi-
ca, vel ex habitu corporis, vel ex aliis occafionibus nata,
caufam coniunctam habet, qua fanguis omnesque humores
multum a fua natura degenerant, et plerumque celeriter fol-
uuntur, ac quali putrefiunt. Nam talem folutionem fieri
ex nimio tum motu, tum quiete, tum etiam calore, affunde
conftat, et tunc febris accedit. Si itaque fanguis a quacun-
que caufa coactus eft, is minima vafcula permeare nequit,
oritur obftructio, et ex hac angetur febris cum magno attri-
tu, quae tandem refolutionem et putredinem adfert. San-
guis cogitur ab omni re, quae febrem excitat, a valente, ab
aliis

aliis varii generis stimulis. Idem sequitur, si a mala materia malignarum sanguis iusto fluidior redditur. De qua re supra dictum. Hae etiam causae signa suppeditant. Praeterea esse solet maior aestus, digitum vrens, pulsus inaequalis, frequens et inordinatus. Urina cruda, crassa, pauca, foetida, imo nigricans, sine sedimento, quae facile iterum in albam mutatur. Etiam cognoscitur ex praegressis causis et de aegri habitu. Febris saepe mutatur in exanthematicam; in plurimis conuenit cum Causo, seu ardente, et nonnunquam phrenitide finitur. Inter mala signa est pulsus valde inaequalis, inordinatus, debilis, sed frequens, respiratio frequens, difficilis, brevis, anhelosa, cum motu manifesto, debilitas cum supino decubitu, delirium, urina crassa, rubicunda, turbida, quae aegrum micturientem reddit, vel etiam aquosa, manuum tremor, festucarum collectio, *dysoxia* et frequens locorum mutatio atque summa inquietudo. Somnus vel nullus, vel grauis, et ex quo aegri non possunt excitari, hypochondriorum inflatio, oculi luctuosi, illacrymantes, et si febris symptomata quotidie ingrauescunt. Mors etiam metuenda, ubi exanthemata, quae mali coloris sunt, superueniunt, vel si illa iterum euanescent. Spes maior est in vtraque, si die quarto circiter coctionis signa in urina conspiciuntur. Synochus simplex tamen sine hac mutatione in urina, et sine aliis coctionis signis, finitur haemorrhagia critica. Parca haemorrhagia pessima est.

§. 185.

Synochus simplex requirit protinus ab initio sanguinis missionem; nam tertio vel quarto die illa crisin turbat. Si sanguinis missio locum habere nequit, admoueri possunt varii corporis locis, et, ubi caput vehementer dolet, ipsi nuchae, vel hircines, vel etiam, concisa prius cute, cucurbitulae. Veteres vsi sunt scarificatione narium, de qua vide *ARETAEV M.* Alius ante omnia soluenda est decoctio Tamarindorum, passularum minorum, Manna, cremore Tartari,

Tartari, Syrupo rosarum pallidarum et similibus. Plurimum etiam conferunt lotiones emollientes, vel ex sola aqua cum pauco sale et nitro. Veteres plurimum tribuerunt frigidae aquae, quam aegris citra satietatem bibendam dederunt, de qua vero alibi iudicium tuli (§. 78.). Magis tutum est, si datur aegro ptisana, cum oxymelle, succis et syrupis acidis, vel etiam alibi laudata Iulapia. Omnia tamen feбри accommodanda sunt. Vbi crisis per sudorem imminet, dari possunt bezoardica fixa cum aquis diapnoicis, et regimen imperandum est. Post factam crisin dari potest Ess. alexipharmaca, vel infusum calidum. Nihil magis nocet, quam nimius calor, tum aëris, tum potulentorum.

§. 186.

Si putredo, vel quaedam malignitas ex supra datis signis (§. 184.) accedere videtur, non alia curatio est, quam malignarum. Caute tamen agendum. Maxime moderandae sunt euacuationes, si magna adest virium imbecillitas. Dari possunt succi acidi. Victus dandus est tenuissimus, cremor hordei excorticati cum succo Citri, auena excorticata cum passulis, fructus horaei siccati, potus ex pane atro, cerasis, radice Glycyrrhizae, Acetosae, cum aqua decoctis. Aliena sunt omnia iurulenta, etiam vinum omnisque potio meracior. Plurimum etiam conducit iusculum valde tenue, pulli cohortalis cum multo succo Citri, herba acetosae et acetosellae. Si cephalalgia vehementior est, parari possunt epithemata ex pane secalino, aceto, vel emulsiones spissiores.

CAVSVS ET FEBRIS ARDENS SEV BILIOSA.

§. 187.

Causus est febris valde acuta, cum summo et intolerabili aestu, a quo nomen habet. Si causus a febre ardente distinguitur, gradu potissimum differt. Causus verus sub

F

nostro

nostro coelo minus frequens, ac olim in Germania fuit. In hoc enim vehementior aestus est, cum febre acutissima, ita, vt calor saepe ad eum gradum accedat, quo oua ad duritiem coqui possunt, id quod thermometra in os aegrorum demissa docuerunt. Hi spiritum ex ore emittunt adeo feruidum, vt manum admotam offendat. Calor prae ceteris pectus torret, minus extremos artus, qui siue moderatius calent, siue nonnunquam, id quod pessimum est, frigent. Hoc accidit, quando humores per febrem eiusque calorem coacti in extremis vasculis haerent, haecque obstruunt, quo renixu tum celeriorē, tum valentiorē cordis motum concitant, quare circa viscera vitalia, cor nimirum atque pulmones, et in horum vasis adhuc liberis, vehementissimus motus, attritus, indeque calor, et in extremis obstructis frigus, nascuntur. Os aridum est, lingua aspera, sicca, flaua, nigra, fissa, cum siti clamosa et oris amaritie. Sitis interdum omnis, arida manente lingua, aboletur, id quod accidit, quando aeger sopore oppressus, siue delirio agitato, sui obliuiscitur. Sputum vel nullum, vel paucum, amarum et biliosum. Labra fissa sunt. Cutis ad tactum arida et sicca. Aegrum torquet maxima cardialgia et anxietas, cum inani vomendi aluumque deponendi conatu. Huius anxietatis causa est vel bilis corrupta, in ventriculo et duodeno haerens, vel impeditior sanguinis per arteriam coeliacam et venam portae circuitus. Respiratio densa est, anhelosa, celerior, cum magna tamen pectoris dilatatione. Accedit tussicula, quae de vasorum pulmonalium obstructione testatur. Vrina flammea est et tenuis, vox clangosa, pulsus celer atque durus. Aeger de intolerabili cephalalgia conqueritur, qui nihil magis optat, quam frigida, quae etiam cum voluptate obtrectat. Quarequam de summa lassitudine conqueritur, quae ab humorum, vascula minima obstruentium, coagulo nascitur, is tamen vix non omni momento locum lectumque mutat, nullum somnum capit, vel eo oppressus repente iterum expergiscitur. Delirat, quod delirium vt plurimum sopore, conuul-

sione

sione morteque finitur. Causus quandoque febris continens est, frequentius vero continua, ita, vt alternis diebus habeat aliquam remissionem; quare ab initio non raro tertianam repraesentat, ex qua quandoque, si eius paroxysmi nimium protrahuntur, oritur. In febre vero biliosa frequentes sunt deiectiones vomitusque, quibus bilis vel sincera, vel, id quod melius est, cum pituita remixta, reiiicitur. In vtraque febre insuperabilis nausea carniū omniumque iurulentorum est, aeger vero et frigida et acida, quorum posteriora etiam saluberrima sunt, appetit. Raro curatur Causus, si exquisitus vehemensque est. Febris biliosa, quamuis magnum periculum habeat, curationem recipit.

§. 188.

Causa harum febrium est humoris biliosi redundantia, quo acriori intestina et ventriculus afficiuntur. Ad morbum vero hunc gignendum plurimum etiam facit sanguis, qui in toto corpore, per nimium calorem et attritum, blando sive aquoso et lymphatico orbatus, acriorque factus est et rancidus. Nam et hic copiosiore bilis materiam praestat, et minus mobilis factus, ex arteriis in exiles venas propelli nequit, quare in Causo inflammatio quasi vniuersalis et per totum corpus esse videtur, a qua ille tantus calor oritur. In cadaueribus, post mortem incisis, cruor spissus multus et ater in arteriis, paucus vel nullus in venis reperi- tus fuit. His morbis frequentius obnoxii sunt plethorici et atrabilarii, melancholici et cacochymici. Oritur morbus a vehementiori Solis aestu, longo itinere, nimio corporis motu, mentisque agitatione, curis, vigiliis, prae ceteris in iis, qui his minus adsueta sunt, a potu spirituosio, ebrietate, ebriositate, ab ira, amore, Veneris abusu, furore, et a suppressis catameniis et haemorrhoidibus, nec non ab assumtis drasticis purgantibus atque venenis, quibus blandi humores ex corpore euacuuntur, relicto rancido crassamento. Febris biliosa etiam oriri potest ex bile efferuescente,

maxime si illa tempore pastus, ira commota ex folliculo expressa, assumtis fermentantibus, veluti fructibus horacis, musto, cereuisia iuniori, admisceatur. Incidere etiam potest, ut humor per cutim exire solitus, cohibito sudore, ad intestina feratur et cum bile misceatur.

§. 189.

Causus saepissime tertio vel IVto die finitur morte. Soluitur circa VIIum diem haemorrhagia critica, quandoque etiam vomitu et deiectione biliosa, nonnunquam etiam sudore. Si vero haec febris ultra hos dies durat, fit plerumque metastasis, atque intumescunt inflammanturque parotides. In hac febre rigor, qui tempore critico, cum signis coctionis, nouus oritur, non semper malus est, sed crisin futuram indicat, maxime si eum sequitur euacuatio. Rigore enim materia peccans quasi mobilis redditur. Bonum etiam est, si aeger circa id tempus de artuum et coxarum doloribus conqueritur. Haemorrhagia optima est, quae septimo die contingit. Hanc futuram esse intelligitur, si aeger tempore critico de insueto capitis et ceruicis dolore atque grauitate conqueritur; si oculi eo inuito illacrymantur atque caligant; si venae ingulares totaque facies tument, nares pruriunt, et si aeger surdus factus est. His signis recentiores obseruationes pulsuum dirotum siue bis ferientem addunt, id quod supra iam notatum fuit. Vomitus futurum eodem tempore indicat nausea, ventriculi dolor, aucta oris amaritudo, caligo tenebrosa, et vertigo cum nausea, labrorum tremor. Deiectionem futuram docent lumborum dolores, tormina, abdominis distentio, borborygmi. Sudor futurus est, si post assumpta multa diluentia vrina die IVto coctionis signa habet, cutis vero ex arida mollior et vda sit. Pessimus et plerumque funestus sudor est, qui guttulas cuti inhaerentes format, et qui pinguior haud defluit. Mala signa sunt magna praecordiorum anxietas, et si cum hac facies valde rubet atque insudat, id quod fit, si sanguis, qui per pectus et abdomen haud circuire potest, ad caput redundat.

dat. Funesta etiam sunt, continuum delirium, vigiliae, inquietudo. Febris ardens pessima est, quae post grauiora ventris infami tormina oritur, quia plerumque cum ea intestinorum et mesenterii inflammatio esse solet. Mortem indicat pauci sanguinis per nares, ventriculum, renes, excretio, tempore vel cruditatis, vel criseos, et si sanguis ex fissis labris linguaue effertur. Porro si sputum vel nulum est, vel biliosum, tenue atque valde viscidum; si vrina tenuis est et nigricans, vel aquosa, qualis esse solet, si materia peccans tenaciter humoribus inhaeret, et facta funesta metastasi ad cerebrum aliasque nobiliores partes conuertitur. Mortem etiam praesagunt deglutitio vel laesa et abolita, vel sonora, quae ultima sit, propter oesophagi paralyisin. Idem metus est, si faucium inflammatio accedit, si caput et pedes frigent, ventre costisque calentibus, vel si Lipyria est, seu internus aestus, rigentibus externis. Si pulsus ex duro in mollem mutatur, id quod fit, si magnus sanguinis infarctus in pulmonibus est, et cordis ventriculus sinister eo non impletur; vel si pulsus debilis sit, atque cum aliis signis intermittens, id quod incidit, si inflammatio atque gangraena in sphacelum tendit. Si parotis intumescit, tumor vero iterum subsidet atque euanesceat. Si alius, antea clausa, iam nimium et praeter voluntatem soluitur, et per eam valde foetida excernantur. Si post delirium tremor oritur et convulsio. Ex tremore delirium ut plurimum fustum est. In febre biliosa tolerabiliores sunt biliosae deiectiones, quam frequens vomitus. Melius est, si sit excretio, quam si irriti sunt vomendi atque deieciendi conatus. Semper meliores sunt deiectiones et vomitus, ubi bilioso humori pituita admixta est, quam si *cinerea* seu *kn-cera* reijciuntur. Nimiae tamen deiectiones, quibus omnis humor tenuior ex corpore educitur, etiam lethales esse possunt. Sputum crassum, mobile, lubricum, optimum signum est, quod testatur infarctum pulmonum solutum esse.

§. 190.

In curandis his morbis, Causus sanguinis missionem desiderat, si is valde abundat, et si morbus ex suppressis haemorrhagiis, praecipue catameniis et haemorrhoidibus, ortus est. Necessesse vero est, ut sanguis mox ab initio primo alteroue die ex talo mittatur. Sanguinis missionem etiam requirit dolor vehemens et fixus in aliqua parte, veluti in pectore, qui cum aliis signis praesentem inflammationem indicat; ubi vero iam dies secundus praeteriit, vel ubi iam illa *λευπυγία* adest, ut summus aestus circa pectus et inum ventrem, frigus in extremis artubus sit, venae sectio mortem maturare potest. Vires etiam considerari oportet. Ceteroquin morbus curatur, dum a natura materies peccans coquitur, et per crisin excernitur, vel dum illa, adiecta per artem alia materia, corrigitur. Magnum praesidium a lotionibus in aluum immixtis petendum est, quibus colon eluitur et humectatur. A colo vero humida mesaraicis venis, imo et lacteis, ad illud pertinentibus, absorberi et sic corpus humectari, certum est. Conducunt lotiones seu clysteres ex Tamarindis, ex herbis emollientibus cum sero lactis decoctis, ex aquis Selteranis, siue aqua simplici cum oxymelle et nitro, nec non ex lacte ebutyrato et sale communi. Has lotiones minime calidas esse oportet, non tamen omnino frigidas, id quod etiam de omni tum potio-num, tum medicamentorum genere sedulo notandum est. Nam quamvis frigida a Veteribus, multis etiam recentioribus, multum extollantur, et quanquam illa aliquando proficere possint, dum iis aestus minuitur, et dum solidarum fibrarum robur, ad resolutionem necessarium, augetur, semper tamen metus est, ne ex subita mutatione periculosa et funesta inflammatio nascatur. Praestat igitur non calidis, sed egelidis uti. Ubi diarrhoea adest, clysteres parari possunt ex decocto specierum emollientium, addito etiam oxymelle ad unciam j. circiter. Inter remedia ore sumenda primo loco sunt aquosa diluentia, farinosa, demulcentia, subacida

subacida vel acescentia. Huc pertinent alibi iam laudata decocta ex vegetabilibus, herbis, fructibusque; additis syrups et Rob officinalibus, ex cerasis, moris, rubi idaei bacis, ribesiis, adiaci etiam potest nitrum. Haec decocta, siue medicamenti et lulapii, siue ptisanæ potitionisque nomine aegris offerantur, maiori in copia potari debent. Pauperibus conducit serum lactis, lac ebutyrtum. Vbi vero diarrhoea vehementius vrget, optimum est iusculum tenue pullorum cohortalium, cum multa acetosa vel acetosella decoctum, vel addito succo Citri, pauperibus aceto.

§. 191.

Victus quoque ad haec accommodandus est, qui non alius esse debet quam vegetabilis, et qualem alibi praecepimus (§. 136. 186. 190.). Plures in hac febre extollunt absorbentia, et praecipuam virtutem tribuunt Crytallo montanae, quae vero exigua est. Meliora sunt alia terrea, si cum succo Citri recenti offeruntur.

§. 192.

Sunt aliae quaedam obseruationes necessariae. Si morbus a causa cognita ortus est, illa, si fieri potest, tollatur; v. g. si ira vehementiori sub pastu commotus fuit aeger, a primo initio cieri potest vomitus, data multa aqua tepida cum melle et pauco nitro. Deglutiri potest oleum amygdalarum dulcium recens. Robustioribus dari potest Ipecacuanha. Omnia vero emetica valentiora aliena sunt, quae facile ventriculi inflammationem relinquunt. Emesis etiam quouis auxilio excitata nocet, vbi morbus iam invaluit. Si emetica locum non habent in hoc casu, mox ab initio sumat aeger Rhabarbarum in puluere ad drackmam dimidiam, et superbibat decoctum Cremoris Tartari. Valde necessarium est regimen, et vt conclaue frigidum sit. Aër igitur alibi praecepta ratione refrigerandus est, frigida crebrius ex vno vase in alterum effusa. Aliis etiam auxiliis corpus humectari potest. Os eluatur frigida, naribus attraha-

attrahatur vapor aquae tepidae. Suadent etiam, ut inguinibus, alis, pedibus, admoueantur spongiae tepida madentes, et ut in hanc pedes et manus demittantur. Pavimentum conspergatur frigida, vel aceto, nec non foliis arborum. Arbuta in conclave ferantur, saepiusque omnia mutantur. Nocentissimus est etiam stragulorum calor pondusque. In hoc morbo situm erectum magis seruire debet aeger, qui in aliis malignis perniciosus et funestus esse potest. In his enim morbis inflammatoriis, ubi vis vitae valida est, in aegro, si is saepius iacet, maior vis sanguinis in corticem cerebri et cerebelli propellitur, et symptomata augentur, secus ac fieri solet in febribus malignis et aliis casibus, v. g. post magnam haemorrhagiam, ubi sanguis non tantum, quantum satis est, ad cerebrum pelli potest.



PHRENITIS, PARAPHRENITIS.

§. 193.

Phrenitis est cerebri et meningum inflammatio ex causis illis inhaerentibus, a qua continuum cum febre acuta oritur delirium. Igitur Phrenitis morbus est idiopathicus, et febris symptoma est. Sed aliquando Phrenitis symptomatica est, quando aliorum morborum, veluti exanthematum, anginae, variolarum, pleuritidis, peripneumoniae, podagrae, erysipelatis et phlegmones, externas sedes occupantium, mala materia in cerebrum conuertitur, et in hoc inflammationem mouet. Vera, vel idiopathica, incipit cum magno et intolerabili dolore capitis, cui accedit febris acuta continua, sine villo alio morbo. In symptomatica vero, inflammatio, vel arthritis, vel alius quidam morbus non caput, sed prius aliam partem quamdam infestat, quae post repente liberatur, orto capitis dolore cum delirio. Differt a phre-

phrenitide, delirium, quod symptoma febris est, cum qua *παρεσπονν* vel increfcit, vel iterum remittit. In phrenitide delirium fine intermissione effe folet. Mania, vel infania, est delirium fine febre, quae nonnumquam ex phrenitide relinquitur. Paraphrenitis proprie dicitur inflammatio diaphragmatis, quod quum valde neruofum fit, et in media parte tendineum, etiam per confenfum vehementiffimum delirium mouet. Plures, latius accepto hoc vocabulo, per id intelligunt quamuis vifcerum et membranarum pectoris atque abdominis inflammationem, cum magna febre et delirio.

§. 194.

Quibus phrenitis imminet, ii continua et nocturna vigilia premuntur, et, fi fomnus accedit, is placidus non eft, fed multis infomniis turbatus, accedit infuetus calor dolorque capitis, quo quafi futurae rumpi videntur aegro, qui dolor in verum inflammatorium et pulfantem conuertitur. Oculi rubent et funt fqualidi ac torui. Ab initio respiratio magna eft et rara. Aeger iracundus, perpetuo agitated, omnisque quietis impatiens eft, qui mox rerum etiam praefentium obliuifcitur. Is, quamuis magni laboris, potionem non defiderat, et tandem fequitur vera mentis alienatio. Si vero iam febris acceffit, pulfus fit paruus, velox et valde durus, ita, vt arteria intenta, quafi baculi inftar, digito renitatur. Respiratio eft magna et cum maiori internallo, facies rubra, horrida, oculi inconfantes, prominentes, truces, illacrymantes, quibus quandoque ficcioris pituitae fordes feu *λίμνα* inhaerent. Lingua ficca eft, afpera et nigra; respiratio magna, fed difficilis; fumma inquietudo, agrypnia, et, id quod cum dolore pulfante fignum pathognomonicum eft, perpetuum feque non remittens atque vt plurimum ferox delirium. Delirium decubitu fupino increbefcit, erecto corpore paululum fe remittit. Cutis arida eft, dura. Vrina, aliquando turbida, rubra eft et pauca, aliquando pallida, vel

si rubra fuit, mox iterum in aquosam conuertitur. Haec, si talis, et si alui fex nulla bile tincta excernitur, pessima est. Vbi tandem morbus ingrauescit, delirium mutatur in soporem vel carum, qui est cum summa debilitate. Tandem sudor frigidus, qui superuenit, significat inflammationem mutari in gangraenam et sphacelum. Si gangraena cerebri ad medullam vsque peruenit, oritur conuulsio, et breui sequitur mors. In corporibus phrenitide defunctorum incisis, reperiuntur meninges inflammatae, cortex cerebri rubro sanguine distentus, aliquando suppuratio et sphacelus cerebri.

§. 195.

In paraphrenitide haec symptomata plerumque mitiora sunt, praecipue, si ex alio praegresso morbo, veluti exanthematico, oritur. Si diaphragma inflammatum est, id potissimum ex respiratione et dolore cognoscitur. In phrenitide enim dolor capitis pulsans est, in paraphrenitide similis dolor praecordia infestat. In priori respiratio magna est, et rara, maxime ab initio; in paraphrenitide vero parua et valde inaequalis. In phrenitide praeterea oculi potissimum afficiuntur; in paraphrenitide tensio et tumor est hypochondriorum. De ortu et principio vtriusque supra retuli.

§. 196.

Phrenitidi obnoxii sunt prae aliis iuniores, qui corpore adstricto sunt, atrabilarii. Occasionem dare possunt vehementes et repentinae animi perturbationes, ira atque terror, praeterea moeror, amor, Veneris desiderium, Veneris abusus, multa meditatio et lucubratio, vigiliae et inedia, crapula, menstruorum, haemorrhoidum, lochiorum profluvium prohibitum, podagra externis curata, ardor solis, si eo caput aduritur, capitis vulnera, abusus spirituosorum et omnis valetioris generis potionum, aromaticum et medicamentorum calidorum, omnesque aliae inflammationum causae.

§. 197.

§. 197.

Phrenitis, quae ab externis causis oritur, in nostris terris rarior est, in meridionalibus frequentior. Accidere tamen potest, ut mening, vulnere aliaque ratione laesa, inflammetur. Saepe phrenitis tendit in carum, convulsionem atque mortem, aliquando in maniam. Etiam amaurosis et surditas ex ea relinquitur, id quod fit, quando vasa cerebri dilatata et obstrueta, non ab hac materia, cessante febre, liberantur, sed obstrueta manent, ita, ut illa materia tandem cum vasis concresecat, atque impeditum sanguinis aliorumque succorum motum efficiat. Haec mutatio morbi non raro contingit, quando, sub vehementi exacerbatione huius febris, sanguinis plurimum detrahitur, vel si euacuantiis adhibentur eo tempore, quo febris omniaque iam adoleverunt. Morbus periculosissimus, qui intra IVtum VIIImumque diem aegrum plerumque iugulat. Nec melior est vera paraphrenitis, praecipue, si tendinea diaphragmatis pars laesa est. Si res bene cedit, phrenitis plerumque crisi soluitur, narium haemorrhagia critica, catameniorum et haemorrhoidum profluvio, vel si venae haemorrhoidales intumescunt, si varices in pedibus oriuntur, si per alium multa critica descendunt, et si sudor multus calidus cum leuamine, praecipue in capite, erumpit. Bonum etiam est, si dolores pectoris artuumque vehementiores oriuntur; si multa aqua ex naribus, auribus, ore effertur; si cum aliis bonis et coctionis signis oritur surditas, vel si cum iisdem aeger tussire incipit. Surditatem sine his signis perpetuam futuram esse, ex supra dictis intelligitur. Semper melius delirium est cum risu, quam cum anxietate. Delirium, quod paulatim increseit, magis metuendum est, quam quod repente oritur. Pessime, si illud in adfectum soporosum mutatur. Pessima etiam signa sunt: urina semper alba et cruda, vel quae post coctionis signa iterum aquosa fit, quae *evangelica* nigrum habet. Prius significat materiae acris malam metastasin; ultimum humorum corruptionem et

et putredinem. His etiam adnumerari debent, vomitus aeruginosus, floccorum collectio, dentium stridor, urinae et alui pertinax obstructio. Lingua optima praesagia futuri euentus dare potest. Et hic malum est, si lingua arida positionem requirit, illam vero non desiderat aeger. Ante mortem aegri plerumque conuelluntur.

§. 128.

Phrenitis facilius auertitur, quam curatur. Est morbus inflammatorius, inde auertendus a capite sanguinis aditus est, atque tollenda obstructio. Animus sedulo aduertendus est ad ea, quae supra retulimus, quibus naturae beneficio hic morbus non raro soluitur, ne, si quid horum appareat, id a medente turbetur. Si vero non naturae morbum committere, sed arte illum profligare animus est, oportet, protinus sanguinem mitti, et quidem in primis initiis maiorem eius quantitatem, ex talo, vulnere facto ampliori, vel incisis pluribus venis, ut sanguis, ex aliis sedibus erumpens, a capite auertatur. Sanguinis detractio etiam, si symptomata id postulant, saepius iteranda est. Vbi autem morbus iam inualuit, praestat sanguinem detrahi ex mediana brachii, vel si summum periculum adest, ex iugulari. Post iugularis tamen sectionem semper etiam vena in brachio incidenda est. Si fieri potest, sanguis non mittendus tempore vehementissimi delirii, sed exspectanda est aliqualis, quamuis etiam haec exigua sit, symptomatum et febris remissio. Plurimum etiam proficit, et a Veteribus laudata fuit arteriotome in temporibus. Delirantes vero difficulter tolerant fasciam. Et post venae sectionem cauendum est, ne fascia soluatur, et ne sanguinis profusio hominem interimat. Venae sectio tam diu iterari debet, quamdiu maior renixus in arteriis est, pulsusque valde durus. Veteres peculiaribus instrumentis profluvium sanguinis ex naribus excitant. Sectio raninarum sub lingua, quam plures extolunt, non ita tuta est. Praeterea ceruici adcommadari debent cucurbitulae cum scarificatione, quae etiam admoneri possunt

possunt humeris, femoribus. Vtilissima foret profundior scarificatio malleolorum et surarum, quae olim Aegyptiis in usu fuit. Vid *Prosp. ALPINVS de Medicina Aegyptiorum*. Etiam illis locis et haemorrhoidibus, si per aegri delirium illud licet, admoueri possunt hirudines. Si illae locum non inueniunt, fricanda sunt illa loca, iisque etiam fomenta admoquenda. Cum his adhibenda sunt epispastica supra laudata (§. 173.). Fetus emolliens, vel vesicae madi-dae, oleo emolliente vel decocto simili plenae, plantis pedum admoueri possunt. Fronti vero oxycratum, vel vna ex compositionibus, quas supra dedimus.

§. 199.

Post sanguinis missionem, ad auertendum sanguinis impetum, plurimum proficit, si alius ducitur. Hoc fit lotionibus in eam immisiss, nec non decocto Tamarindorum, Cremoris Tartari et aliorum eccoproticorum atque antiphlogisticorum. Quae reliqua vero sunt medicamenta, conueniunt cum iis, quae supra proposui (§. 190.). Dari debent Iulapia cum succis vegetabilibus et liquoribus mineralibus acidis, quibus aegri corpus ita implendum est, ut fere hydropicum fiat. Si vero aestus ita vehemens est, praecipue ab initio, et si perpetuae sunt vigiliae, sine his acidis parari possunt emulsiones, quibus paullo in maiori quantitate adiicitur semen papaueris. Nocentissima sunt valentiora opiata, praecipue in morbi incremento; ab initio tamen Opii granum dimidium vel j. dari potest cum succo Citri recenti.

§. 200.

Si haemorrhoides et dolores in intestino recto sentiuntur, admoueri possunt vel cataplasmata, vel epithemata ex herbis et radicibus emollientibus, nec non fomenta ex herba stercoraria. Si aegri vires et delirium id permittunt, quoque adhiberi possunt pedilunia, non nimis tamen calida. Os, si fieri potest, crebrius eluendum. Gargarizationes ex aqua, aceto, nitro praesunt. Cum his situs erectus necessa-

cessarius est. Nocet decubitus supinus; lux, strepitus et omnis res ingrata, qua aegri animus commoueri potest. Sollicite mutandus et grato refrigerio corrigendus est aër. Aegro delirante remouenda sunt omnia insolita, praecipue picturae, quibus aegri sensus excitantur, et delirium auge-
tur. Caput radendum plures suadent. Malim id per pe-
ctinem attondi, et hunc etiam crebrius, sed modeste per
residuos capillos deduci. Si autem Paraphrenitis est, vel
Phrenitis symptomatica, seu ex alio morbo orta, non sem-
per tutum est sanguinem detrahi, aluum duci, et aliis eua-
cuantibus vti. Considerandus est princeps morbus, et huic
accommodanda sunt auxilia. Deriuantia saepe optima sunt.



A N G I N A.

§. 201.

Angina plerumque significat inflammationem faucium
cum impedita respiratione et deglutitione. Latius
tamen accepto vocabulo, alii, et inter hos BOERHAA-
VIVS, non solum inflammationem harum et aliarum vici-
narum partium, sed quamuis impeditam respirationem ac
deglutitionem, non tantum ab inflammatione, sed ab aliis
etiam causis profectam, veluti ab abscessu, a polypo, aliove
sarcomate, a scirrho, carcinomate, ad anginam retulerunt.
Angina enim quaedam cum raucedine in fine chronicorum
morborum, praecipue post euacuationes, accidit a paraly-
si musculorum et mortem instantem praesagit. Est etiam an-
ginae species, quae spasmodica absoluitur, id quod hysterica
admodum frequens est. Anginae inflammatoriae, de qua
nunc nobis sermo est, quatuor modos descripserunt Vete-
res. Si interiores laryngis muscoli, et interior membrana
tracheae inflammantur, Cynanche dicitur, in qua summa
respirandi loquendique difficultas est, cum magno metu suf-
focatio-

focationis. Si vero interior pharynx inflammatur, et paullo liberior est respiratio, valde vero impedita deglutitio, adeo ut adsumta potio etiam per nares effluat, Synanche dicitur. In his extrinsecus nullus conspicitur tumor, vel is non ita magnus. Inflammatio musculorum externorum laryngis et partium vicinarum dicitur Paracynanche. Inflammatio vero exterioris pharyngis Parasynanche. Et haec tamen vocabula varium sensum apud Veteres habent; vid. *van swieten Comment.* Cum his vero plures etiam aliae partes inflammantur, veluti tonsillae, et quae in his sedibus copiosae sunt aliae glandulae excretoriae, nec non tum asperae arteriae, tum gulae interioris tunicae, velum palatinum, uvula, muscoli ossis hyoidis, linguae, &c.

§. 202.

Praeter haec omnia discrimen notabile est inter anginam veram atque notham vel pituitosam. Prior enim inflammatione absolvitur, in posteriori vero mucus crassiorque pituita occupat contextum cellulosum, qui sub tunicis est. Primum genus comitem habet febrem magnam inflammatoriam cum symptomatibus, alterum febrem catarrhalem mitiorem. In priori tumor rubicundus, et dolor acutus, pulsans est; in posteriori dolor paucus et tumor pallidus. Raro incidit, ut hydropicis tumor eiusmodi pituitosus ex stagnante in faucibus sero oriatur.

§. 203.

Angina laborant frequentius, quam alii, iuniores, sanguinei, ex observatione SYDENHAMII prae ceteris rufi, et quibus pueris saepius sanguis ex naribus fluit. Oritur etiam a cohibito sanguinis per haemorrhoides et catamenia profusio, a neglecta sanguinis missione, sudore expresso. Praeterea a causis externis, a deglutito ossiculo vel spina piscis, ab adsumto veneno, praecipue mercurio sublimato et calce viva; et recens dealbatis parietibus, a clamore et nimia vociferatione, declamatione, tubarum inflatione, imprimis

primis in aëre gelido, et si post talem exercitationem sudor repente supprimitur, ab equitatione aduerso vento frigido, a multum variantibus tempestatibus, maxime si corpus caloribus relaxatum subito frigore excipitur, a tussi vehementi et vomitu, datis etiam drasticis emeticis, a ptyalismo per mercurium excitato, a facta metastasi in morbis malignis exanthematicis, praecipue in variolis confluentibus. Nonnunquam angina epidemica est, vel alii morbi epidemici hanc naturam habent, vt mala materia, in fauces conuersa, hanc periculosam inflammationem moueat. Nascur etiam a repressa per externa podagra et erysipelate male curato. Quomodo vero ex variarum partium inflammatione varia sequi soleant symptomata, singulari studio exposuit BOERHAAVE, *Aphorismorum* §. 801. *sqq.* Surditas symptoma est inflammationis vuulae ac palatini veli, quum et interior membrana tubae Eustachianae saepe ex inflammatione intumescat. Sub deglutitione percipitur in aure sonus valde molestus, quoniam duo muscoli malleum mouentes, qui ex hac tuba oriuntur, si membrana tubae inflammatae tumidaeque sub deglutitione mouetur, tympani membranam valentius adducunt, et neruo acustico hunc sensum impertiuntur. Pessimum est, si caput eiusque partes omnes ex coaceruato sanguine intumescunt, id quod accidit ab impedita respiratione. Nam si pulmo non satis distenditur, sanguis eum libere permeare nequit; is itaque accumulatur in corde dextro, a quo is redundat ad venas iugulares, et sic ad totum caput, ad quod sanguis per arterias affertur, qui per venas iterum abduci nequit. Ob hanc causam tandem sequitur linguae omniumque partium tumor, omnium sensuum exteriorum et interiorum obnubilatio, ab effusis per dilatas venas humidis, stertor orisque spuma, tandemque suffocatio. Nonnunquam repente ingrauescentibus symptomatibus aeger subita morte rapitur.

§. 204.

Angina vel discutitur, vel inflammatio in pus vertitur, vel raro in scirrhum, vel aeger quarto circiter die suffocatur, vel

vel inflammatio ruit in gangraenam. Periculosissima est Cynanche, et si extrinsecus nullus tumor conspicitur. Longe peius est, si, evanescente tumore externo, inflammatio ad interiora tendit, et spirandi difficultas increbrescit. Quo celerius atque citius febris increscit, eo maius periculum est. Urina sanorum similis mala, pessima, quae ex cocta iterum in crudam vertitur. Funesta signa sunt, orthopnoea cum magna anxietate, vox stridula et acuta vel intercepta, oris spuma, lingua arida, nigra, ex ore propendens, labra livida, omnium sensuum stupor. Interdum morbus critice soluitur sanguinis per nares, catameniorum et haemorrhoidum profluvio, diarrhoea biliosa, raro sudore critico. Si aeger dolorem ad pectus descendantem sentit, remittentibus se in faucibus symptomatibus, ortaue tussicula, morbus mutatur in peripneumoniam et pleuritidem, qua aeger plerumque septimo die perit, vel oritur tabes cum lenta et hectica febricula. Si hypochondria et praecordia tument dolentque, incresciente imbecillitate, mors instat; si vero artuum dolores oriuntur, bona spes est. Interdum fiunt abscessus, quos futuros esse intelligitur, si febris sine discussione et crisi se pedetentim remittit, et dolor ex acuto in grauatium mutatur; si vero nulla facta fuit crisis vel metastasis, inflammatio in gangraenam ruit. Hoc confirmat facies Hippocratica, extremorum frigus, pulsuum debilitas, et si color rubicundus faucium in lividum mutatur, tumor vero desidet. Gangraena, quae ex magna inflammatione orta fuit, est funesta. Nonnumquam alii, in quibus gangraena est ex metastasi orta, feruantur. Angina symptomatica in febribus exanthematicis aliisque malignis saepe funesta est, quandoque tamen, ubi, ea orta, se delirium remittit, illa non ita mala est, praecipue in variolis. Etiam in morbillis, aliisque febribus exanthematicis, angina magis timenda, quam in variolis.

§. 205.

Curatio etiam in hoc morbo a sanguinis missione ordi-
 enda est, qui ad animi defectionem usque ex brachio edu-
 sendus

G

sendus

cendus est. Nullibi enim magis nocet, quam in hoc morbo, si paucus sanguis detrahatur; quare etiam sectio ranarum, quam plures extollunt, non ita tuta videtur. Si symptomata valde vrgent, confugiendum est ad sectionem iugularis, vel ad arteriotomen in temporibus. Semper tamen venaesectio in brachio, etiam in pede, vel praemitenda, vel post iugularis sectionem praecipienda est. Detracto maiori modo sanguinis, ducenda est aluus clysteribus acrioribus. Iterari debent hae lotiones acriores in aluum immittendae, ita tamen, vt alternis vicibus aliae leniores, ex decocto emollientium cum lacte atque oleo, vel etiam ex decocto intestinorum pinguium, adhibeantur. Vbi aeger deglutire potest, conducunt etiam apozemata laxantia. Ceterum, vbi sic aluus ducta fuit, danda sunt decocta rad. Petroselini, Cichorei, Scorzonerae, herbae Lactucae, Endiuiae, florum Maluae, Papaueris rhoeados, addito Syrupo acetositis Citri, violarum, granatorum et funili, vel etiam proficit decoctum acetosae recentis cum eiusmodi Syrupo. Nec alienae sunt emulsiones supra laudatae (§. 199.), vel serum lactis acidulum, lac ebutyratum, &c. Admoueri possunt cum his supra laudata epispastica, pediluua, cucurbitulae, praemissa scarificatione, et omnia, quae ad auertendum sanguinis aditum proficere possunt.

§. 206.

Nec omittenda sunt topica, quae duplicis generis sunt. Alia, quae faucibus admouentur: alia, quae collo extrinsecus superdantur. In faucibus sedulo distinguenda sunt tempora. In morbo idiopathico inflammatorio et ab initio, increfcente adhuc inflammatione, proficit vapor ex acceti parte vna et aquae partibus duabus vel tribus, qui vapor per infundibulum traiectus, ore excipiendus est, videndum tamen, ne tussis moueatur. In hoc casu etiam proficiunt Gargarismi ex reprimentibus, additis tamen et emollientibus. Non ita bona, nec tamen aliena sunt supra laudata Elacosacchara. Pauperibus proficit aqua simplex cum aceto et pauco

pauco nitro. Oxycrato etiam adici potest Roob mororum, ribesiorum, vel ex his parati Syrupi. Sedulo vero obseruandum est, vt talia ita admoueantur, ne maior fiat in faucibus irritatio, et ne vel tussis, vel vomitus cieatur. Nec facile decocta per siphonem immittenda, nec illi linctus penicillo illiniendi sunt, sed saltem in ore continendi. Vbi iam putredo imminet, id quod ex halitu oris foetido, et ex mutato colore partium inflammatarum intelligitur, adhiberi oportet Spiritus salis cum melle rosato remiscendus.

§. 207.

Extrinfecus collo admoueri debent olea calida, liliorum alborum, flor. Chamomillae, aliaque emollientia; vel parari possunt cataplasmata ex emollientibus, nec non epithemata, et videndum est, ne haec refrigescant. Nec aliena sunt emplastra, malaeticum, diachylon, de meliloto, quae cum oleo liliorum alborum malaxari possunt. Vbi vero, his omnibus nihil proficientibus, metus est, ne aeger suffocetur, confugiendum est ad anceps auxilium, Bronchotomiam. In victu euitanda sunt omnia calida. Aeger alendus est Cremore hordei, et si febris non valde magna est, gelatinis, succo acido multo imbutis, nec non iusculis.

§. 208.


Si vero inflammatio in suppurationem tendit, adhibenda sunt emollientia in gargarismis. Abscessus tempestiue aperiendi sunt pharyngotomo. Vbi tendit in gangraenam, id quod cum aliis signis foetor oris intolerabilis significat, fauces scarificari possunt scalpello et adhiberi decocta ex amaris, absynthio, ruta, scordio, centauro minori, addito nitro et sale ammoniaco. Proficit etiam mel rosatum cum spiritu salis. Vbi ob tumorem, aliamue causam, deglutitio abolita est, corpus nutrirı potest per clysteres nutrientes, iuscula in aluum immissa. Sed semper oportet prius intestinum alio decocto eluere, et postea iusculum in illud immittere.

§. 209.

Aliud genus anginae est, quod ortum fuit a veneno alioque acri adsumto, vel ab acriori halitu. In hoc genere, nisi iam inflammatio multum increuerit, nec sanguis mittendus, nec alius ducenda est, sed in ore detinenda, atque faucibus illinienda sunt lubricantia, lac calidum, oleum amygdalarum dulcium recens, butyrum recens sine sale, decoctum auenae excorticatae, decoctum caricarum pinguium, quibus os frequenter eluendum est. De angina ex ptyalismo cum mercurio excitato alibi dicendum erit.

§. 210.

Quod tandem ad notham attinet, in hac alius ducenda est paullo valentioribus, praecipue decocto foliorum Sennae cum Manna. Mouendus etiam est sudor, obseruato regimine et dato infuso calido. Gargarismi fieri possunt ex radice Bistortae, Bryoniae, herba Prunellae, Salviae, Hyssopi, flor. Sambuci, addito Roob Diamoron. Hoc etiam melle rosato excipi et illini potest.



P L E U R I T I S ET PERIPNEVMONIA.

§. 211.

Sunt morbi inflammatorii pectoris, et Pleuritis nomen habet a graeco *πλευρά*, quod et latus in genere, et illam omnibus notam membranam significat. CELSYS vocat dolorem laterum. Dicunt vero propriam sedem Pleuritidis esse pleuram et mediastinum, Peripneumoniae pulmonem. Saepe tamen hi morbi confunduntur, et sectio cadaverum docuit frequentius, utramque partem laborare, praecipue in iis, quorum pulmo pleurae accreuit. Pleuritis vero dif-

fert

fert a spuria seu notha, quae rheumatismi genus est, et sedem habet in musculis potissimum intercostalibus, aliisque humerum mouentibus.

§. 212.

His morbis raro laborant infantes, nec facile ii, qui acidum eructant, frequentius vero exercitati. Prioribus enim sanguis est rarior, et qui non facile cogitur, qualis esse solet exercitatis, quibus etiam maior fibrarum rigor esse solet. Praecipue vero his morbis obnoxii sunt plethorici exercitati, et qui tridum ex valentioribus cibis chylum conficiunt, venatores, cursores, equites, cantores, qui se potu spirituoso, vino mangonifato et spiritu ardente ingurgitant. Cum his alii, qui aduerso vento equitant vel currunt, qui nixu, cantu, clamore pectus exercent, et qui post vehementem exercitationem subito quiescunt, aërem subito mutant, sanguinis missiones, praecipue scarificationes, negligunt, e quibus sudores, catamenia, haemorrhoides, alias fluere solitae, non proueniunt. Saepe morbus, praecipue Peripneumonia, epidemica est. Pleuritis etiam a causa violenta, ictu extrinsecus illato, oritur. Tempestatum varietates et hic plurimum conferunt, maxime vero subito irruens frigus.

§. 213.

Qui utrumque morbum accuratius distinguere volunt, differentias petunt a causis. Dicunt, Pleuritidem veram plerumque a causa violenta nasci, ab ictu, vel fortiori corporis nixu, Peripneumoniam vero fieri ex gelido aëre corpori repente admissa, a potu frigido, a vehementi exercitatione in aëre gelido, praecipue si pulmones multum exercentur. Peripneumoniam vero fieri ex repentinis tempestatum mutationibus, et si austrum exiepit aquilo. A vero autem propius abest, in pleuritide dolorem esse acutum, pungentem, qui tempore inspirationis, quae parua et frequens est, acerbior fit: in Peripneumonia vero praecordiorum

diorum maiorem anxietatem, cum dolore obscuro et maiori suffocationis metu esse. In pleuritide pulsus est durus, sed parvus, quia per non satis dilatatos pulmones paucus sanguis in cor sinistrum influit: est etiam serratus et valde renitens: in peripneumonia pulsus mollis esse solet. Accidere tamen potest, ut ex pleuritide omnia haec symptomata oriantur. Nam si propter dolorem pectus satis dilatari nequit, coarctatur sanguis in pulmone, et eius non nisi paucum in cor sinistrum fertur, unde pulsus sub finem mollis, cum summo praefocationis metu, oriri potest. Praeterea in pleuritide aegri fere sola diaphragmatis et musculorum abdominis actione respirant, quum reliqui muscoli inflammati vix agere queant, et tussis sicca est. In peripneumonia vero saepe a nimio sanguine laborantibus pulmonibus fit obnubilatio sensuum, quia venae iugulares non recte in eam evacuari possunt. Est etiam in hac et celerior et copiosior sputi cruenti reiectio.

§. 214.

Quaeritur potissimum: num etiam vera pleuritis solui possit sputo cruento? id quod plures negant. Alii affirmant, in pleuritide sputum magis tenue, et in peripneumonia magis coctum crassumque esse. Hoc certum est, frequentius et copiosius esse sputum peripneumonia laborantibus. Incidere tamen potest, ut materia mobilis facta, per venas intercostales absorberi, et per venam sine pari et eam ad pulmones ferri possit in cor, et deinceps per arterias excerni. Praeterea nexum esse inter venam sine pari, inter arterias venasque bronchiales, inter has et oesophagum, Anatomie docuit. Vid. LANCISIUS de *Vena sine pari*, in MORGAGNI *Aduersar. anatom.* WINSLOW *Exposit. Anatom. Traité de la poitrine* §. 116. et DOCTISS. GÜNZII *Dissert. de Derivatione puris ex pectore in bronchia.*

§. 215.

In hoc utroque morbo est febris cum laesa respiratione. Sunt vero hae inflammatoriae febres interdum idiopathicae, quae ex causis hactenus dictis oriuntur. Saepe vero praecipue Pleuritis est symptomatrica, et oritur ex aliis morbis, maxime exanthematicis, variolis, morbillis, nec non ex angina, ex repressa podagra, si eiusmodi morbi mala materia in pectus conuertitur. Symptomatici morbi summe periculosi et saepe funesti sunt. Obseruarunt nonnulli, Pleuritidem frequentius experiri eos, quibus vena sine pari mox sub aorta sita est, ita, ut illa ab hac, propter turgescentem sanguinem distenta, possit comprimi.

§. 216.

Solentur hi morbi, et praecipue Peripneumonia, sputo cruento, quod et tertio quartoque die tussicula excernitur. Accedit urina crassa, multoque sedimento turgida, cum sudore. Aliquando, frequentius tamen Pleuritis, raro Peripneumonia, soluitur magna haemorrhagia narium, et haemorrhoidibus, raro, interdum tamen, diarrhoea critica, atque excretionem per aluum mucosa, flava, biliosa, cum striis sanguineis. Nonnumquam sunt metastases, intumescentibus parotidibus, vel ortis abscessibus in partibus externis, ipsisque artubus. Si morte finitur morbus, aegri interdum, praecipue si sanguis detractus non fuit, suffocantur. Frequentius vero inflammatio tendit in gangraenam, id quod cognoscimus ex omnibus, quae in gangraena sunt, signis. Quibus vero gangraena imminet, illis vel sputum nullum est, vel tenue, biliosum, foetidum, et respiratio valde laboriosa fit cum strepitu et sibilo. Saepe etiam inflammatio in suppurationem tendit, et ex peripneumonia fit vomica, et ex hac tandem empyema spurium vtriusque phthisis, ex pleuritide empyema verum. Suppurationem futuram esse cognoscimus, si febris sine crisi, et sine mutatione facta in urina, atque sine sputo se paulatim remittit,

tit, ex acuta lenta fit, et si haec cum frequenti horripilatione est, quae potissimum horis vespertinis aegrum afficit, et si dolor acutus in obscurum, grauem mutatur. In pulmonibus etiam interdum scirrhi relinquuntur, praecipue, si peripneumonia nimium euacuantibus vel calidis etiam medicamentis curata fuit. His omnibus, si tenuata fuit febris, manet impedita respiratio et tussicula, accedit totius corporis tabes. Quae ceteroquin de his morbis sperari aut timeri debent, ostendit febris, respiratio, puris excretio et lingua. Pus copiosum, laeue, striis sanguineis distinctum, flauescens, crassum et coctum, cuius copiosior excretio respirationem leuat, bonum est. Sputum malum est, ab initio valde coeretum, flauum, biliosum, tenue, spumosum, coenosum, obscuri coloris, et quo symptomata non leuantur. Signum ex pulsu in his febribus multum fallit. Si vero pulsus in pleuritide durus repente mollis fit, et ex forti debilis vel inaequalis, intermittens et prorsus euanescens, pessimum est signum, praecipue, si anxietas accedit. Orthopnoea et respiratio cum strepitu et stridore, cordis palpitatio, pessima signa sunt, cum his etiam vrina albicans et aquosa, praecipue, si, quae ab initio cocta fuerat, in talem mutetur. Sanguis ex vena missus, si in eo tenax et crassius coagulatus est, magnam esse inflammationem significat. Si vero sanguis valde rubicundus est, non cogitur, et si praecipue cum hoc est magna imbecillitas, et vrina mox primo alterius die sedimentum demittit, tunc febris maligna est et periculosa. Si per tempus cruditatis frequentius aquosa crudaque, vel biliosa per aluum descendunt, id mali morbi testimonium est. Nonnumquam tamen peripneumonia soluitur defectionibus materiae copiosae, purulentae, flauescens, id quod tempore critico cum aliis bonis signis contingit. Haemorrhagia critica esse debet magna, nam pauca et hic pessima est. Pleuritis si in phrenitidem mutatur, ad vltima ventum esse testatur. Hanc futuram esse significat, si, lenato paululum in pectore dolore, facies mutatur, oculi torui fiunt, instabiles quasi, tumidi. Si vero in pleuritide, praecipue post

post sanguinis missionem, dolor distenditur, et versus scapulas dorsumque procedit, spes est, solum iri morbum. Mala materia in alia viscera, veluti secur, conuertitur, Nilum est. Dolores artuum boni sunt; singultus, praecipue circa septimum, nec non hemiplegia, mortem instare significant.

§. 217.

horum morborum curatione multum disputari solet de sanguinis missione, quam in pleuritide necessariam esse vix non omnes concedunt, in peripneumonia nonnulli negant. Vnum est, aliquando in peripneumonia, si symptomata non urgent, et inflammationem non ita magnam ac profundam se ostendunt, si mox sputum, illudque bonum, adparet, ea non solum non necessariam esse, sed fieri etiam posse, ipsa excretio per sputum turbetur, et lenta febris pulmonumque scirrhus relinquatur. Nec sanguinis missio bona est in pleuritide symptomatice et ex aliis morbis orta, nec non febrem magna imbecillitas, crebriores crudaeque deiectiones, et epidemica constitutio ostendunt. Illa vero necessaria est etiam in peripneumonia, si corpus multo sanguine abundat, si febris vehemens est, respiratio impedita et suffocationis etus, in quo casu et in pleuritide etiam plurimum sanguinis et iteratis etiam missionibus, detrahendum est.

§. 18.

Magna olim controuersia de loco, ex quo sanguis mittendus est. Si inflammatio test, illaque vehementer increuit, mox eius plurimum detrahi debet ex brachio lateris dolentis, et postea iterari potest pede. Sanguis Imo, Illico Illitioque die, si ingrauescentia promota illud desiderant, mitti potest; post quartum autem diem sanguinis missio non ita bona est, urgente tamen necessitate, et si suffocatio imminet, sexto etiam septimoque sanguinem mittere oportet.

§. 219.

Valde necessariae cum his sunt lotiones crebrius in al-
 num immittendae, quae parari possunt ex sero lactis, addi-
 to melle, nitro, et sale prunellae, vel ex decocto em-
 lientium. Numquam calidae sint, sed tepidae. Reli-
 curatio absoluitur diluentibus et saponaceis, et optimus est
 oxymel, cuius vncia j. vel vna cum dimidia admisceri pot-
 est decocto hordei, vel aquis destillatis, Scabiosae, cro-
 nicae, addito syrupo de Althea. Etiam proficit decoctum
 radice Altheae, Glycyrrhizae, Graminis, cui sy-
 pus de Althea Fernellii cum paucis nitro addi debet. Eius-
 modi vero aeger plurimum et omni dimidia huius vnciam
 vnam imo et alteram sumat. Nec alienae sunt emulsi-
 ones ex semine Cardui Mariae, seminibus frigidis papaueris et
 ex amygdalis, addito paucillo nitri et antimoni diaphoretici.
 Decoctum dilutius auenae cum passulis sumi solet. Illud
 tamen cauendum est, ne, dato oxymelle vel quodam sy-
 rupo, periculosior fiat diarrhoea symptomatica. In pleuri-
 tide quae sine sputo est, et in qua adspici potest dis-
 cussio, dari possunt interdum puluerum nitro et antimoni
 diaphoretico; ubi vero excretio per pulmones, ter-
 rea aliena sunt, quippe quae sputum minus mobile reddunt.
 In senibus atque imbecilibus, quoniam pulmones atonia la-
 borare videntur, proficit extractum Cascariillae cum aqua
 paratum. Nonnulli in hoc casu extollunt corticem Pe-
 ruianum.

§. 220.

Vbi autem eosionibus magna apparent, dari possunt infu-
 sa calida, radice Cichorae, Sassa-parillae, herbae Veronicae,
 Chaerephylli, Capillorum Veneris flor. Sambuci, Chamo-
 millae Romanae, serpyllorum Foeniculi, Anisi stellati, cum Sy-
 rupo de Althea vel pillorum Veneris. Etiam proficit et
 expectorationem auat Essent. Glycyrrhizae cum Essent.
 pimpinellae albae Cascariillae. Ad expectorationem iu-
 uandam etiam alba bechica proficiunt, supra laudata ecleg-
 mata,

mata, decoctum Glycyrrhizae, Passularum, Caricarum pinguium. Etiam Syrupus Capillorum Veneris, Syrupus de Althea, infusus calidis loco sacchari admisceri potest. Post resolutionem et cessante sputo per aliquot horas dari potest infusum aquosum, cum Essent. alexipharmaca vel Tinctura antimonii.

§. 221.

Regimen seruandum est, et ante omnia vitandus nimis calor. Extrinsecus, dum dolor virget, loco adfecto admoeri possunt fomenta ex emollientibus, vesicae cum lacte calido et oleo liliorum alborum repletae. Prostant in officinis vnguenta, antipleuritica dicta. Si symptomata vehementiora sunt, parti dolenti et vicinis admoeri possunt cucurbitulae, tum siccac, tum etiam praemissa scarificatione. In corporibus raris proficiunt vesicatoria, si, virgente dolore, suris artubusque inferioribus imponuntur.



HEPATITIS.

§. 222.

Itecur, quod copiosissima vasa habet, raro inflammari solet. Frequentius in eo oriri videtur obstructio, raro in veram profundamque inflammationem tendit. Ex obstructio-
ne crebrius fit scirrhus, immo hepar nonnumquam in im-
mensam molem increfcit. Ex scirrho hepatis hydrops ascites nascitur, quod vasa lymphatica copiosiora, ex hepate educta, a mole huius indurati visceris compressa, a quiescente humore distenta, tandem rumpuntur. Etiam accidere solet, vt hepar, sine magnae inflammationis notis praegres-
sis, purulentum fiat, id quod a corruptis humoribus, par-
tim in ipso hoc viscere natis, partim aliunde ad illud per metastasin delatis, fieri solet.

§. 223.

§. 223.

Duplicem vero notauerunt inflammationem Auctores. Aliquando enim, et forte etiam frequentius, inflammari potest pars exterior, cum ligamenti et peritoneo, quae inflammatio, si non ita magna est, nec profunda, difficiliter dignoscitur. Alterum autem inflammationis genus interiora occupat, quae incipit cum magno horrore, quem excipit aestus, sitis, summa respirandi difficultas, vomitus, singultus. In hac specie hepatitidis color faciei totiusque cutis fit ictericus. Urina crassa est, turbida, pulsus celer, at non ita durus et magnus, hypochondrii dextri accedit dolor. Inflammatio haec subinde a causis externis, vehementiori ictu et vulnere, proficiscitur. Si a causis internis oritur, occasionem ei dare solent malus corporis habitus et cachexia quacvis, praesertim atrabilaria, vitium pancreatici, lienis, rheumatismi per metastasin et post usum externorum huc delati, arthritide et podagra male curatis, haemorrhagarum suppressio, ira vehementior, moeror, potus frigidus calente corpore sumtus, &c. Soluitur quandoque inflammatio non ita profunda multo sudore, urina cum sedimento, interdum etiam deiectionibus biliosis, quae vero esse debent cum coctionis signis. Aliquando enim euenire solet, ut, si deiectiones post se remittentem febrem purulentae fiant, cum summa prostratione virium, mors in propinquo sit. Nam inflammatio vehementior plerumque in gangraenam ruit, raro soluitur magna multaque haemorrhagia.

§. 224.

Abscessum futurum esse intelligitur, si febris dolorque sine mutatione in urina se plurimum remittunt, manente febricula lenta, cum tussi sicca et spirandi difficultate. Color cutis ictericus cum his non in melius mutatur, sed fere in peius. Talis abscessus si rumpitur, pus effluit in abdomen, et aeger tabe perit. Aliquando, prout dictum est, pus per poros bilarios et ductum cholodochum in intestina fertur,

id

id quod raro feliciter cedit, praecipue si illud non sincerum, sed cum eo multa purulenta, sanguinolenta, foetidaque per aluum descendunt. Manet enim verus fluxus hepaticus. Raro etiam tumores abscessusque fiunt in parte gibba hepatis, ut eo loco etiam muscoli abdominis, praecipue si peritoneo hepar inhaerescit, intumescant. Plerumque tamen, ut dictum est (§. 222.), inflammatio in scirrhum mutatur. Urina, si sedimentum habet, bona est; si vero illa turbida, biliosa, obscura, matulam colore albicante inficit, nullum sedimentum demittit, pessima est.

§. 225.

In curatione sanguinis missio non semper necessaria est. Protinus ad hanc confugiendum est, si ictus vehementior hypochondriis fuit illatus, et ex hoc metuenda est inflammatio; item etiam, si in inflammatione ab internis causis orta febris mox vehementior et dolor profundior est. Nocere vero potest, si iam lenta vel vehementior inflammatio ad supurationem spectat. Lenta illa et obscura inflammatio sanguinis missione saepe mutatur in scirrhum. Etiam in hoc casu, siue praemissa fuerit Venaesectio, siue omissa, protinus adhibenda sunt saepe laudata enemata, praecipue decoctum Tamarindorum, Prunorum siccatorum, addito nitro, nec non decoctum herbarum emollientium cum lacte et sero lactis, addito melle. Potioni danda sunt et adfatim haurienda decocta, praecipue herbae acetosae cum sero lactis, vel ptisana cum succis et syrupis acidis. Cum his dari possunt oxymel simplex, succus acidus Citri, cui adiici possunt lapides cancerorum. Prima sunt in curatione diluentia. Potioni praestanda est vel ptisana, vel aqua Selterana. Parari etiam potest decoctum radicis Graminis, Scorzoneræ, Taraxaci, Cichorei, flor. Papaveris rhoeados, Verbasci, Chamomillae, cui decocto adiici potest syrupus Violarum, vel quinque radicum aperientium, aut similis. Si vero coctionis signa in urina conspiciuntur, dari potest decoctum vel infusum calidum, ex radice Cichorei, Apii, herba Chaere-

phylli,

phylli, Salviae, floribus Rosarum, Sambuci, &c. Si resolutio fieri coepit cum aegrotantis euphoria, cum tali infusio dari possunt pauciores guttulae Essentiae alexipharmacae cum Liquore anodyno.

§. 226.

Si dolor vehemens est, extrinsecus imponi possunt emollientia, praecipue flores Sambuci ex lacte cocti, quo decocto repleti potest vesica et imponi. HOFFMANNVS extollit epithemata ex herba Scordii, Cardui benedicti, Absynthii, Rutae, floribus Sambuci, Chamomillae romanae, quae herbae coqui debent ex vino cum aqua, et imponi. Emollientia vero, si inflammatio vehementior profundiorque est, fere praeferri merentur. Si tumor sub cute percipitur, isque attollitur, dolorque pulsans, aliaque symptomata docent, abscessum futurum esse, sine mora imponi debent emollientia, et ex his efficacioribus parata cataplasmata. Tumor maturus factus, sine mora, sectis etiam musculis abdominis et peritoneo, incidendus est, atque abscessus purgandus. Raro tamen res bene cedit, et plerumque aeger tabidus perit. Pus aequale, boni coloris, coctum, nullum odorem spirans, aliquam spem facit. Si vero illud saniosum, flauum, nigricans, foetidum, specillum argenteum peregrino colore inficit, mors imminet lenta. Aegrum conualuisse cum ceteris docent, si tum facies, tum ea, quae per aluum efferuntur, naturalem colorem habent. Vid. quae infra dicentur de Ictero.



INFLAMMATIO VENTRICULI.

§. 227.

Est vel idiopathica, vel symptomatrica. Prior autem oritur quandoque a vulnere, de quo in Chirurgia dicendum. Praeterea a rodentibus acribusque, tum venenis, tum medicamentis, tum etiam alimentis. Inter medica-
mente

menta primo loco sunt drastica emetica et purgantia, praecipue si talia protinus post iram, et bilem in ventriculum effusam, sumuntur. Etiam inflammationem ex abusu vini adusti fieri, experientia cognitum est. Symptomata vero inflammatio, quae frequentior est, oritur in febribus malignis, ex repressis exanthematibus. Ceteroquin etiam inflammatio fieri potest in febribus pestilentibus a deglutita salira, si illa contagio infecta fuit. Non solum in febribus, sed post vehementem etiam exercitationem ea nascitur, si calente corpore frigidus potus ingeritur.

§. 228.

Haec inflammatio cognoscitur interdum ex praegressa causa, et si aeger, cum aliis febris inflammatoriae signis, conqueritur de summo ardore et dolore praecordiorum. Sed ventriculus alium situm habet, ubi is vacuus est et ieiunus, alium vero, ubi plenus est. Pro vario hoc situ variat etiam dolor. Certius signum est, si aeger protinus, postquam aliquid assumpsit, novam exacerbationem doloris sentit, et illud, quod adsumtum fuit, inter vehementiores cruciatus, vomitu iterum reiicit. Spasmos varios, varias etiam corporis partes adficientes, ex huius nervosi visceris inflammatione oriri, experientia docet. Accedit sitis ferina, respiratio brevis, pulsus durus, per dolorem impeditior, creberrimus, vomitus summo cum dolore, anima foetida, cum frequenti singultu atque delirio. Aeger convulsus moritur, et sub finem deglutitio sonora fit. Haec tamen symptomata non ita vehementia sunt, si lentum venenum datum fuit, vel si ex aliis causis, ab acriore etiam bile, morbus ortus fuit. Confundi potest cum aliis inflammationibus, v. g. iecinoris, maxime illius eius partis, quae ventriculo incumbit. Distinguitur symptomatum vehementia, quae in ventriculi inflammatione acerbiora. In cardialgia dolor fere est idem, sed nulla adest febris. Rarum est, ex inflammatione scirrhum oriri. Quibus hoc incidit, si sine febre sunt, omnia autem, quae assumunt, vomitu rei-

rei-

reiciunt, et tabidi moriuntur. In dissectis post mortem cadaueribus notabile discrimen est inter erosionem ventriculi, quae a solis venenis rodentibus, arsenico praeceteris, oritur, et inter inflammationem, cuius variae occasiones esse possunt. Vbi erosio est cum aliis inflammationis signis, deducta et abrasa tunica villosa cum assumtis in ventriculo fluctuat, quamuis mutata; adhuc ceteris tunicis adhaeret in simplici inflammatione. Hoc in Medicina forensi, et si de dato veneno suspicio est, notari oportet.

§. 229.

Summum huius inflammationis periculum est, nec seruari possunt, nisi, quibus minimum distans curatio adhibetur. Peior tamen est inflammatio symptomatrica, et quae oritur ex febribus exanthematicis, vel podagra in ventriculum conuersa. Signa pessima sunt, sonora deglutitio, diarrhoea, sudor frigidus, singultus, conuulsio, delirium.

§. 230.

In curatione sanguinis missio tunc tandem necessaria est, quando in corpore robusto pulsus iam celerior fortisque esse solet. Nocere potest in febribus exanthematicis et inflammatione symptomatrica. Si vero inflammatio a veneno aut drastico emetico vel purgante orta fuit, certissimum auxilium est vomitus, qui, ingestis copiosioribus diluentibus et pinguibus, ita tamen cietur, vt talia crebrius, sed pauca in quantitate deglutiantur. Primum est aqua calida et cum hac lac calidum, cremor lactis, oleum quoduis vegetabile, dulce, non rancidum, quae omnia cum aqua calida remisceri debent. Optimum est lac dilutius tepidum, cum multo butyro non salito. Si inflammatio lenta est, parari possunt decocta ex fursure, ex auena excorticata, ex herba Lactucae, floribus Verbasci, Maluae, Papaueris erratici, addito syrupo de Althea, vel syrupo Violarum, vel etiam emulsio ex amygdalis, pineis, seminibus frigidis, &c. Simul cum his protinus in aluum immitti debent atque iterari lotio-

lotiones, ex decocto emollientium cum lacte, addito oleo et nitro. Extrinsecus emollientia ventriculo imponi possunt, praecipue vesica oleo calido plena. His enim et dictis lotionibus spasmi, qui semper in laborantibus partibus fiunt, mitigantur. Nihil magis nocet, quam si dantur frigida, vel etiam adstringentia specifica, crystallus montana, terrae sigillatae, vel etiam theriaca et similia. Postquam mala materia vomitu exturbata fuit, lene conducit sopiens, Diacodium Montani, quod cum oleo amygdalarum dulcium misceri potest; item Theriaca et Diascordium Fracastorii.

§. 231.

Si inflammatio a bile effusa post vehementiorem iram orta fuit, etiam dari debet multa aqua tepida cum melle, roob ribesiorum, et si dolor iam vehemens est, cum oleo amygdalarum dulcium. Praeter ea bilem obtundunt iuscula tenuiora pullorum, vel carnis vitulinae, cum herba acetosae vel multis passulis minoribus decocta. Profunt etiam decoctum hordei, Tamarindorum, Scorzonerae, Passularum. Aegre ferre solet ventriculus puluerulenta et nitrosa, aliquando tamen, et quidem mox ab initio, antequam inflammationis signa deprehenduntur, proficit Magnesia, addito nitro.

§. 232.

In inflammatione, quae orta fuit ex febre exanthematica, plerumque maximum periculum est. Mutandum est regimen, et dari debent emulsiones ex aquis diapnoicis, semine Cardui Mariae et Amygdalis. Aliquando inflammatio ventriculi in febribus pestilentibus oritur, si contagium salivam infestavit, et si in ventriculum descendit. Prostant observationes, in peste repertos fuisse in supremo ventriculo anthraces. Alibi (§. 60. 61.) consilium datum fuit de vomitorio in similibus casibus exhibendo, id quod fieri potest, ubi pulsus aliaque significant, nullam adesse inflammationem febremque, et ubi sine his aeger intolerabili

H

nausea

nausea vexatur. Non alia emetica locum inueniunt, quam quae nullam habent acrimoniam. Vbi vero nausea est cum febre et inflammationis signis, vomitorium mortem maturare potest.



N E P H R I T I S.

§. 233.

Cuius tria genera sunt, vera, seu inflammatoria, spuria, seu rheumatica et calculosa. Haec quandoque ex inflammatoria oritur, saepe in eam degenerat. Inflammatio interdum non nisi exteriora renis occupat, et quasi erysipelatodes est; aliquando vero profundior, quae totum renem tenet, et quae non raro in suppurationem tendit. Spuria, seu rheumatica sedem habet in musculis externis horumque tendinibus et variis membranis. Calculosa tandem oritur, si tartarus in ipso rene, eius pelui, vel tubulis Bellini concreuit, qui in dies mole augetur. Calculus, si a re quavis commouetur, oriuntur ex eo etiam spasmi et nonnumquam inflammationes, atque ab his vehementes vtriusque generis dolores.

§. 234.

Omnēs hi morbi in eo conueniunt, ut lumbi doleant, eorumque illa praecipue pars, quae a dorso spina propior est. Dolor tamen quaedam discrimina habet. In inflammatione is ab initio profundus est, obscurus, mox ardens, pulsans atque inflammatorius. Per consensum etiam dolor est partium vicinarum, qui acerbior fit, ubi corpus erigitur vel inclinatur. Accedunt alia inflammationis signa, praecipue febris. Plerumque etiam vnum latus magis dolet altero. Febris tamen in hoc genere inflammationis plerumque non ita vehemens est, ac esse solet, si partes nervosae inflammantur. Aegri conqueruntur de dolore ac stupore pedis

pedis atque testiculi illius lateris. Vrina ab initio pauca est, rubicunda, ast vero, si malum increuerit, et maior facta est obstructio, pallida et aquosa. Accedunt frequentes vomitus, vomendique conatus, pertinaces alii obstructiones, quae omnia oriuntur propter consensum, quem renes et vretes habent per nervos cum mesenterio, ventriculo, intestinis, unde spasmi, dolores, stupores atque convulsiones harum partium ex nephritide oriuntur.

§. 235.

In nephritide spuria, quam SYDENHAMIUS *lumbaginem rheumaticam* appellat, dolor satis vehemens est, sed sine febre, qui etiam non nisi alterum latus plerumque infestat, aliquando tamen vtrumque. Dolor si interdum remittit, mox iterum exasperatur. Aeger vero vel nunquam vomit. In nephritide calculosa, quamdiu calculus quiescit, grauitatis cuiusdam in lumbis sensus est, qui cursu omnique motu augetur. Si vero calculus a variis rebus, vietu crudo flatulentoque, potu meraco, exercitatione, animi pathemate, Venere, &c. commouetur, dolor vrget vehementius, accedit colica, nausea frequens, biliosus vomitus, urinae et desidendi crebra cupiditas; sed magna difficultas, vel tenesmus. Interdum nihil per vesicam, et nec per alium spiritus redditur. Si vrina non prorsus suppressa est, illa paullatim redditur et per guttas interdum sine voluntate destillat, estque pallida et aquae similis. Pulsus satis compositus et sine febre, saepe plenus et durus. Inter spasmos et vehementes cruciatus calculus per vreterem descendit, quem aeger in inguine sentit. Leuamen adfert, et calculi excretionem maturat, vomitus, praecipue biliosus. Irritum vomendi conatum nulla sequitur excretio. Vbi calculus in vesicam deuolutus fuit, aeger protinus leuamen sentit, et nisi calculus interdum vrethram praeccludat, vrina multa crassa, arenosa, interdum etiam aliquid sanguinis trahens, redditur. Quandoque difficile est hanc colicam nephriticam a simplici distinguere. In ea dolor eam-

dem sedem infestat; in hac vero antcrius in abdomine circa vmbilicum intestina quasi conuertuntur, et dolor se per intervalla remittit, vel sedem mutat. A dolore ischiadico discernitur nephritis vrinae potissimum excretionc, quae in dolore ischiadico libera est, in hac vero impedita. Dolor etiam non tam lumbos, quam coxas tenet.

§. 236.

Nephritis inflammatoria raro discutitur. Hoc fit, quando cum aliis bonis et coctionis signis vrina mittitur copiosa, ruffa, crassa, vel aliquando in foeminis menstrua proueniunt, et tunc omnes spasmi aliaque symptomata se remittunt. Si inflammatio profundior est, ea non raro tendit in suppurationem, et relinquit vlcus malignum in rene. Immo ex inflammatione ortoque pure saepe calculi nascuntur, dum pus cum materia tartarea concrefcit. Calculus vero maior, qui vel in rene haeret, vel in vretcre, inflammationem mouere potest. Haec inflammatio, quae in rene interiori incipit, non tam facile in gangraenam ruit, propter falsum, quo lotium abundat, et quo putredo auertitur. Inflammationem ad suppurationem spectare significat febris, se communibus suis symptomatibus, sine facta notabili excretionc, remittens, manente horripilatione et febricula vaga. Suppurationem futuram esse confirmat vrina arenosa, foetida, cum qua purulentum redditur. Vlcus in rene latius serpit, et interdum totum renem exedit, ita, vt nonnumquam non nisi exterius velamentum, et quasi vesica quaedam fuerit relicta et post obitum reperta. Sequitur tabes renalis, tandem funesta. Et nephritis inflammatoria et spuria interdum haemorrhoidum, interdum etiam mensium fluxu soluuntur. Inflammationem in gangraenam mutari discimus, si post vehementiora symptomata, febrem praeceteris, quae ingentem feruorem habuit, dolor se protinus sine leuamine remittit, si vrina crassa, foetida est, atque carunculas trahit, et si alia signa ortae gangraenae accedunt.

§. 237.

§. 237.

Nephritide inflammatoria frequentius laborant plethorici, quibus haemorrhoides et catamenia non recte fluunt; arthritici, qui valentioris generis potu et Venere abutuntur, qui aduersus gonorrhoeam multa diuretica et balsamica sumserunt, qui cantharidibus, aphrodisiacis, aliisque stimulantibus abusi sunt, quibus alius segnior est, qui sub somno supini in lectulis molliter cubant, qui potu parciori utuntur, nimium quiescunt, ut sanguis etiam quiete concresecat et iusto crassior fiat, et qui exercitatione quadam, praesertim curru vel equo vecti, renes succutiunt, et copiosiori sanguini ad eos aditum faciunt. Hoc etiam sub valido nixu fieri potest, dum pondus aliquod leuant, quoniam sub eo, dum pulmo valide distenditur, sanguis maiori impetu in vasa maiora et etiam in arterias propellitur. Inflamman- tur etiam renes ex vulnere ictuque illis illato. Nephritis inter morbos est, qui per haereditatem propagantur. Alia eius occasio est, si renes ab iis comprimuntur, quibus colon multum distenditur. Si quaedam morbi materia per renes educitur, facile in minoribus tubulis oriri potest obstructio et inflammatio. Inflammationem etiam ab arenulis, nec non iam concretis calculis produci, dictum fuit.

§. 238.

Nephritis calculosa saepe ex inflammatoria relinquitur. Materia vero tartarea seu calculosa constare videtur ex terra, sale, praecipue vegetabili acido, accedente oleo rancido, ipsoque aëre, quae inter se concreuerunt. Augetur tartarus potione quavis meraca, fermentescente, vino imprimis, quod copiosum tartarum habet, nec non caseo, in quo multa terra est, cum acido et oleo, quod rancidum fit. Observatio docuit, multum conferre decubitus supinum in lectulis mollioribus, quo maior sanguinis aditus datur ad renes calore nimio adfectos. Etiam sic decumbentibus urina non ita bene in vesica destillatur.

§. 239.

In curatione nephritidis inflammatoriae iam supra dictum fuit, considerandam esse urinam, quae si crassa est, rubra, et sedimento abundans, tolerabilior esse solet. Longe peior alba et aquosa, quae vehementiorem obstructionem et malae materiae infarctum ostendit. Funesta vero est nigra, foetida, cum carunculis praecipue, si alia sphaeceli signa accedunt. Si in hac nephritide vera aeger plethora laborat, et febris protinus vehemens est, sanguis mox ab initio mitti potest ex brachio. Habenda tamen ratio haemorrhoidum et menstruorum, quae si instare videntur, fatius est, sanguinem mitti ex talo. Sanguinis missio nocere potest in corpore infirmo, et si lenta valde est inflammatio. Post sanguinis missionem, eamque largiorem, lumbis et post etiam brachiis cucurbitulae, concisa prius cute, admoueri possunt. Dandum vero cum his est Apozema antiphlogisticum. Plurimum etiam proficiunt clysteres paregorici ex decocto emollientium cum lacte, addito oleo, pauco nitro et melle. Oportet enemata minime calida esse. Cum his dari debet potus diluens, aquosus, addito pauco melle. Optimae sunt aquae Selteranae maiori in quantitate expotandae. Proficit etiam serum lactis, et si aestus valde urget, lac ebutyratum vel decoctum radicis Althaeae, Glycyrrhizae, Scorzonerae, cum Passulis et Caricis pinguibus, quibus vel ex aqua, vel, id quod melius, ex sero lactis decoctis, nitrum adiici potest. Etiam emulsiones proficiunt dilutiores, cum semine papaveris vel diascordio et pauco nitro. Sedulo videndum est, ut alvus aperta sit, et quamvis haec satis fuerit soluta, nihilo minus utendum esse clysteribus paregoricis et humectantibus. Nocent diuretica, balsamica, stimulantia, ex terebinthina et similibus. Necessaria est abstinentia, et victus dari debet, qui aegrum sustinet, non qui alit. Nocentissima sunt dyspepta, flatulenta, aromata, et omnia stimulantia, nec non valida exercitatio corporis, et Venus. Extrinsecus admoueri possunt emol-

emollientia, vesica decocto vel oleo calido plena. Si suspicio est, haemorrhoidum vel catameniorum profluvium futurum esse, quo saepe nephritis soluitur, somenta genitalibus, aut locis haemorrhoidalibus admoueri possunt. Vbi malum in remissione consistit, dari debent leniora diuretica, aqua Petroselini, Fragorum, decocta radice Foeniculi, Petroselini, Graminis, Apii, additis floribus Papaueris rhoeados. Victus tenuis sit, a fame propior, et ex molli blandaque materia, decocto oryzae, hordei, sagopyri, avenae excorticatae.

§. 240.

Si inflammatio suppuratione finitur, idque ex supra dictis signis (§. 237.) cognoscitur, dari debent medicamenta abstergentia, aquae illae diureticae, decoctum ex radice Glycyrrhizae, Foeniculi, Graminis, florum Chamomillae, baccarum Juniperi, addito Syrup. de Althaea Ferne-
lii. Plurimum tribuunt infuso radice Pareirae brauae, quod etiam alienum non est. Ex efficacioribus diureticis sunt millepedae, quarum X-XV. circiter conquassari, vino admisceri, sicque propinari possunt. In pulvere minorem habent efficaciam. In victu cum in finem proficiunt radix et herba Petroselini et Turiones Asparagi. Ex radice Petroselini parari possunt decocta cum iuseulis tenuioribus. Efficacissimum remedium ad repurgandos renes est in aquis mineralibus, quibus, si hectica imminere videtur, lac caprilum vel asininum admisceri potest. Potari debent per vnum alterumque mensem. Si vero harum aquarum copia haberi nequit, saepe dari possunt dilutiores emulsiones ex aquis diureticis, addito syrupo de Althaea vel Capillorum Veneris. In hisce, quibus tabes imminere videtur, plurimum nocent balsama acriora, Thermae et Acidulae valentiores, nimum diuretica vel adstringentia, nec non vehementior corporis exercitatio. Auxilio est victus tenuis, potio aquosa, abstinencia a dyspeptis, aromatis, inebriantibus, Venere &c. Conducit lac cum aquis Selteranis, ferum lactis dulce.

§. 241.

Nephritis calculosa frequens esse solet corporibus raris et aetate prouectioribus. Si iam calculus renem occupat, illa difficillime curatur. Nec adeo fides habenda videtur specificis medicamentis, quibus calculus solui dicitur. Sunt, qui calcis viuae aquam extollunt. Quibus nephritis imminet, illi tempestiue materiam tartaream ex renibus eluant potu aquoso, diuretico, et vsu aquarum mineralium. Vbi vero calculus in renibus commotus est, et aeger intolerabili dolore excrucietur, adhibenda sunt omnia, quae calculi excretionem iuuant. Ante omnia, si homo plethoricus est, sanguis mitti debet ex brachio, et eius non parum detrabi. Protinus etiam, et singulis fere horis in aluum immitti debent lotiones emollientes, addito minori stimulo ex melle et nitro. In balneum se demittat aeger, cui adiciendum decoctum fursuris vel herbarum emollientium. Balneum haud calidum esse oportet, sed tepidum: lumbis admo-ueantur sacculi cum emollientibus ex lacte decoctis, vel vesicae oleo emolliente aut simili decocto plenae. Vix vllum auxilium est in medicamentis, si lubricantia excipias, et primum est oleum amygdalarum recens sine igne expressum, quod crebrius cum iusculo calido aut cereuisia calida sumi debet, quamuis etiam illud vomitu deiciatur. Dari etiam potest decoctum ex radice Althaeae, Maluae, florum Maluae, Verbasci, Papaueris rhoeados, addito syrupo de Althaea Fernelii. Nec minus conueniunt emulsiones dilutiores, quibus parum nitri adijci potest. Temperantia enim et anodyna, si pauca in quantitate adhibentur, spasmis medentur, et excretionem iuuant. Quare si dolores valde vrgent, et his nihil excernitur, praeter emulsiones cum semine papaueris dari potest Laudanum Sydenhamii ad gutt. x. xv. xx. pro dosi.

§. 242.

Vbi tandem calculus excretus est, renes ab inhaerescantibus sordibus et arenis repurgari debent, omnibus iis, quae

quae supra dicta sunt (§. 240.). In victu moderatus usus ceparum concedi potest cum potu diluente. Virtutem specificam tribuunt allio, nec non Saponi, de quibus consulenda est experientia. Certioris efficaciae sunt Thermae et Acidulae, quae tamen alienae sunt, si renes exulcerati relinquantur, id quod ex vrina purulentum trahente intelligitur. Vitanda est calculosis omnis cruditas, omnis tum animi tum corporis motus, quibus sanguis cieri potest.



DE ILEO MORBO, SEV INTESTINORVM INFLAMMATIONE.

§. 243.

Dicitur CELSO Chordapsus. A Graecorum *εἰλεός* ab *εἰλέω*, verto, nomen habere videtur. Alii vocant voluulum. Distinguunt tamen inter ileum et colicam ex natura ipsius intestini, quod adscitur. In intestino enim, non cum adsumtis tantum, sed etiam ex vicinis visceribus varia feruntur, quae inflammationem, vel prius obstructionem, et post hanc inflammationem monere possunt. Ileus igitur est violentus eorum, quae intestinis continentur, siue ingestorum, siue ex vasis huc delatorum, vomitus, cum dolore, alui obstructione, et aliis symptomatibus. Saepissime oritur ab hernia incarcerata, aliquando a spasms fit invaginatio. Hac intestina vaginae quasi in modum ita inuertuntur, ut una pars alteram ingrediatur, id quod incidere videtur, ubi intestina per flatu distenta spasms commouentur, ut sic pars contracta ampliata distentamque subeat. Non raro oritur ileus a fecibus induratis, a rebus deglutitis, v. g. nucleis, aliisque, quibus intestinorum iter praecluditur. Occasio etiam, quamvis rarius, datur, vi abscessus,

scæssus, scirrhus, cancer, aliusue tumor, in intestinis vel visceribus etiam vicinis haerens, intestina premit et sic coarctat. Spasmi etiam, et per hos intestinorum varii morbi, oriuntur a vermibus. Nonnumquam spasmi excitantur a frigore, a repressis exanthematibus, a cohibito mensium et haemorrhoidum profluuiio, ab adsumtis acribus et venenis. Rarum morbi genus est, si intestini coli portio in illum hiatus vrgetur, quem inter musculorum, diaphragmatis appendices esse nouimus, et per quem naturaliter nervi intercostales descendunt, id quod cum magna epiploï et pancreatis parte aliquando factum fuisse legimus in *Transactionibus Anglicanis in Compend. Vol. V. p. 266.* In hoc casu spasmi conuulsiuique, motus diaphragmatis et musculorum abdominis plurimum conferre videntur. Vide singularem in modum coarctatum intestinum in *EVSCHII Obseruat. medico chirurg. fig. 74.* et ibi etiam inuaginationis exemplum. Hoc optime delineatum vid. in *Ephem. Nat. Curios. Cent. VIII. Obs. 79. p. 382.* Controuersia est, num motus peristalticus inuersus et versus superiora adscendens in hoc morbo accusari possit; num vero illi frequentes atque conuulsiui motus a sola diaphragmatis et musculorum abdominalium contractione oriantur; et num etiam ex colo per Bauhini valvulam alui fex ad ventriculum vsque vrgeri, et vomitu reici possit? Sed prius probant variorum observationes, et in animalibus viuīs dissectis facta experimenta. Diaphragma tamen et musculos abdominis plurimum ad omnem vomitum et ad hunc etiam retrogradum rerum in intestinis haerentium motum, conferre, a vero propius est. Valvula illa vero laxari, immo paralytica fieri videtur sub finem. Nam ex vehemēti spasmo relinquitur sub finem paralytis. Etiam hoc accidit, si inflammatio circa valvulam orta desit in sphacelum.

§. 244.

Inflammationem iam intestina tenere praeter signa communia inflammationis, indicat dolor manens, acutus, et quasi

quasi ardens, a dolore colico simplici, vago et spastico diuersus. Aluus, quae ab initio seignior erat et sicior, iam adstricta est, vt nec fex, nec spiritus reddantur. Creberrimus est vomendi conatus, et vomitus sequitur ab initio pituitae, post bilis, tandem materiae gryseae, sub finem stercoris, immo etiam clysterum in aluum immisforum. Accedit tenesmus frequens, sed irrita desidendi cupiditas, abdominis inflatio, ita, vt aluus etiam enemata vix admittat, summa anxietas. Si causa tolli non potest, superueniunt ante mortem delirium, singultus, conuulsio, et si inflammatio in gangraenam ruit, se remittunt subito dolores, descendunt citra aegri sensum et voluntatem feces cadauerosae, foetidissimae. Pulsus fit tremulus, intermittens. Sudor effertur multus, et qui quasi glutinosus corpori inhaeret, sub finem is, vt in omnibus inflammationibus, gelidus fit. Rarius inflammatio intestinorum mutatur in scirrhum et carcinoma, id quod si incidit, aeger tabe perit. Etiam causarum datur quaedam diagnosi. Ab inflammatione si ortus fuit morbus, id nota inflammationis signa manifestant. Si a fecibus induratis, aliisque in intestina delatis rebus, praecedat obstructio dolorem, qui non nisi sub finem accedit. Si vermes adsunt, illos appetitus auctus, narium pruritus, abdominis tumor, significant. Scirrhus et abscessus sine inflammatione praegressa vix oriuntur, quare repetenda est prima morbi vel praegressorum morborum historia. Voluli diagnosi difficilior est; dolor tamen fixus, et in eodem loco manens, cum ceteris signis, cum significant.

§. 245.

Itaque hic morbus, qui ab obstructione oritur, et cui inflammatio accedit, periculosissimus est, nisi protinus intestinorum iter expediatur, et id, quod illud praeccludit, tollatur. Si malum a deuolutis in hernia intestinis ortum est, id curari nequit, nisi his repositis. Non minus tamen periculum est, si ab inflammatione ex materia acri ortus fuit volulus. Quandoque ischuria solet esse cum ilco, quando
intesti-

intestinum, fecibus induratis aliisque repletum, vreteri incumbit, et quo minus lotium in vesicam destillare possit, prohibet. Iam HIPPOCRATES, in *Coacis*, id funestum signum esse, docuit. Omnis salus dependet ab auxilio, quod sine mora, et a primis initiis praestandum est. Singultus, delirium, convulsio si ileo superuenerint, mortem subesse testantur.

§. 246.

Ex causis petenda est curatio. Quomodo intestina deuoluta reponi debeant, docet Chirurgia. Saepe et hanc rem plurimum iuuat sanguinis missio. Si a fecibus induratis et pertinaci obstructione morbus ortum habuit, praeter enemata, crebrius, etiam addito stimulo, iteranda, dari debent laxantia ex Tamarindis, Passulis, Cremore Tartari, Manna et similibus, etiam ex Pilulis Becheri solutis, addito nitro. In inflammatione intestinorum symptomatica, seu ab aliis morbis orta, quae plerumque funesta est, considerari debet morbus princeps. Vbi assumpta fuerunt acria venena, proficiunt, quae de inflammatione ventriculi dicta sunt (§. 231.), et ex his tum ea, quae ore sumuntur, tum alia, quae in aluum immittuntur. Si inflammatio orta est ex voluulo, iterari debent clysteres omni bihorio, quibus sub finem stimulantia, v. g. Petum ad drachm. j. vel jj. adiaci possunt, cuius etiam fumus, singulari machina in aluum immisus, plurimum proficit. Deglutiat aeger iuscula calida cum oleo amygdalarum dulcium, quae crebrius et maiori in copia, quamuis etiam vomitu reiiciantur, sumi debent. Si omnia haec non proficiunt, ad anceps remedium recurrendum est, et dandus Mercurius viuus, per corium pressus et depuratus, ad libram dimidiam vel integram. Huic praeferre solent alii glebam plumbeam. Pondere enim harum rerum quandoque voluulus exsoluitur, quae vero mortem maturare possunt, si intestinum iam gangraena affectum est, quod tunc laceratur. Hoc vero si incidit, ad vltima ventum est. Nec facile imitari debemus eos, qui, praecunte

HIPPO:

HIPPOCRATE, aëra mediante folle in aluum immittunt, et colon vehementius distendunt. Sedes enim morbi frequentius in ileo, non in colo est.

§. 247.

Si intestinorum inflammatio imminet ex materia purulenta et cancrofa, quae ex alio viscere abdominis, veluti hepate et pancreate, ad intestina fertur, aeger bibat multam ptisanam ex decocto hordei, cornu cerui, eboris, radicis Althaeae, Scorzonerae, Glycyrrhizae, auenae excorticatae, furfuris, hordei excorticati. Quo vero materia melius abstergatur, dari potest tertia quaque hora Rheum, minori tamen dosi. Etiam solui potest massa Pilularum Stahlii, in aqua Melissae sine vino, addito paucio nitro. His iusto tempore datis, et adhibitis clysteribus emollientibus, quandoque auerti potest inflammatio. Si vero haec inualuit, periculum fere certum est, et sanguinem, vt in aliis inflammationibus, mitti oportet,

§. 248.

Extrinsècus abdomini illiniri possunt in voluulo olea cocta, anethi, florum chamomillae, verbasci, additis paucioribus guttulis olei carui destillati. Imponi abdomini possunt epithemata vel cataplasmata ex emollientibus cum lacte coctis. Proficit etiam fots animalis viui, vel ad minimum calidi dissecti. Si morbus profligatus fuit, danda sunt, quae nouum robur impertiuntur intestinis. Idonea sunt carminatiua, illae supra laudatae trageae (§. 107.), conserua visceralis, cortex cascarillae, Peruvianus, nec non tincturae martiales, praecipue vero victus a fame propior et abstinentia, cum corporis exercitatione.

FEBRIS

* * * * *

FEBRIS LENTA ET HECTICA.

§. 242.

In his febribus est perpetua imbecillitas, et homini maior in dies accedit macies. Calor vrget, qui prae ceteris sedibus in volis manuum et plantis pedum percipitur, et qui tertia quartaque circiter hora post pastum augetur, quo tempore nouus chylus sanguini adfunditur, tuncque pulsus celerior, frequentior et maior, postea vero lenior est, et his superuenit magnus sudor, qui non leuat, sed imbecillitatem auget. Urina crassa est, ex qua plerumque multa subsidunt. Appetitus fere nullus est, et aegri iracundi sunt; qui etiam nocturna vigilia premuntur. Haec et hecticae et lentae communia sunt. Est tamen magna differentia. Lenta plerumque ex alio morbo relinquitur, frequentius ex quacunque febre, tum intermittente, tum continua, si haec male curata fuit, et succi non recte fuerunt purgati, etiam si aeger malo victu, animi pathemate et haud obseruato regimine, turbatis sordibus aliisque excretionibus febrem pertinaciorē reddidit. Febris etiam diutius tolerata, et nimia copia salium ac terrarum curata, lentam relinquit. Ex aliis fere innumeris causis principes sunt, succus ex quacunque causa corruptus, et exsuperans cruditas, viscerum aliarumque partium solidarum infirmitas. Quare etiam lenta saepe nascitur sine alio praegresso morbo, ex ingluuie nimia tum aquae, tum alius potulenti fermentescens, nec non vini, vinique adusti potu et ebriositate, ex otio inertii et defectu exercitationis. Etiam ex contrariis, ex diu tolerata inedia, vigiliis, nimis contentiosa actione et litterarum nimio studio; ex cura, moerore, zelotypia, amore. Praeterea ex nimia Venere, frequenti et diuturna benigna gonorrhoea, fluore albo copioso et diuturno; ex diarrhoea, magno sanguinis ex genitalibus, haemorrhoidibus, etiam ex vulnere profluuii, si focminae debiles robustiores pueros

mam-

mammis alunt; ex ptyalismo cum mercurio concitato; ex mensium et haemorrhoidum defectu, represso sudore totius corporis, maxime vero pedum vel alarum; ex repressa vel retrocedente podagra; ex abusu medicamentorum calidorum, antiuenericorum, nec non purgantium aliorumque euacuantium; ex scabie tineaque repressa, aliisque morbis cutaneis, nec non ex ulceribus et suppurationibus male curatis. Morbo huic interdum etiam materiam praestat occultum virus venereum, maxime si illud iam ossibus labem intulit. In hectica vera autem iam adfectae sunt partes solidae, si illae vel naturali robore penitus defectae sunt, vel si in aliqua parte, non solum in viscere, sed etiam in aliis externis sedibus, est vomica, abscessus, vlcus, fistula, cancer, caries vel spina ventosa, quibus haec febris ut symptoma accedit. Ex lenta febre aegri saepe conualescunt, vix autem vel numquam ex vera hectica, quae vel citius, vel tardius mortem infert. Lenta vel erratica est, vel illius febris, veluti intermittentis, ex qua orta fuit, typum seruat, et aeger non sudat, perpetuus calor est et siccitas, cutis non tam arida, quam dura et coriacea, sudor vero pinguis, qui talis induritiis inhaeret, cum his aegritudo et magna imbecillitas est, nec sudor vllum leuamen adfert. Urina in lenta varia est, et ubi sedimentum demisit, ac simul, ut mox dicetur, pingue traxit, per vices iterum ad naturalem colorem et habitum reuertitur. In hectica vero illa ab initio tenuis et spumida est, et ubi morbus adoleuit, illa semper crassa trahit, quae subsidunt, et habet cuticulam pinguem, coeruleam, supernatantem, qua etiam vitrum inficitur. Haec pinguis cuticula si conspicitur, in utraque febre aeger multum extenuatur, et in dies magis emaciatur. Nam ipsa pinguedo soluta sic cum lotio effertur. Tandem in hectica summa oritur macies, et facies ea, quae Hippocratica dicitur. Pestifera est hecticis sanguinis missio; si tamen missus fuit sanguis, ille rubicundus est, et qui minime cogitur.

§. 250.

Lenta tamen saepe in hecticam mutatur, id quod metuendum, si tempora caloris longiora sunt, illa semper aequalis est, si nullis medicamentis cedit, si augetur imbecillitas ciborumque fastidium, si accedit tussis sicca, impedita respiratio, pedum tumor. Mortem instare cognoscimus, si, exacerbatis omnibus, pulsus celerior est, valde debilis, et qui vix percipi potest, urina pauca, lixiviola, pinguis et nigricans, si capilli defluunt, si accedit sudor et diarrhoea colliquativa.

§. 251.

Causa harum febrium est succus vitiatum sanguini ac lymphae admixtus, vel crudus, vel putris, qui, dum sanguini novus chylus adfunditur, semper agitur, et quod is a laesis imbecillisque visceribus arteriisque subigi excernique nequit, novam exacerbationem caloris et febris adfert. Quare si fons illius crudi et mali humoris exauriri potest et siccare, tolli potest febris. Humor vero ille oritur in lenta ex supra commemoratis causis. Hectica vero partim a similibus causis, si illae adeo inualuerunt, ut nullam curationem recipere possint, oritur, partim a pure vomicae, ulceris, carcinomatis et his similibus, qua pars laborat.

§. 252.

In curatione lentae sedulo animus ad primam originem causasque advertendus est. Si relicta fuit a febre intermittente et citius suppressa, confert quandoque morbum novare et febrem incendere. Dari itaque debent Pilulae Becheri, vel infusa aquosa calida, et tempore, quo aestus urget, nitrum cum terreis acido citri saturatis et arcano duplicato, tartaro vitriolato. Plurimum proficit in eiusmodi febribus, praecipue in corporibus imbecillis urbanorum hominum, liquor terrae foliatae tartari, qui ad drachmam j. vel unam cum dimidia aliquoties per diem dari potest. Huic liquori etiam adici potest, methodo supra exposita, Extractum herbae Absynthii, Centaurii minoris, Cochleariae, Fumariae,

riae, Cardui benedicti, &c. Cum his aeger frequentius fumat Pilulas Becheri. Virium ratio habenda est, et concedi debet tempore, quo remissio est, haustus vini generosi. Si febris nouata fuit, illam recte curari oportet. Si vero febris intermittens non suppressa, sed diutius tolerata in lentam degenerauit, id quod crebrius ex intemperantia et peruerso regimine incidit, imperanda est abstinentia. Dandum est aliquoties Rheum in puluere, et dein cortex Peruuianus cum Conserua viscerali.

§. 253.

Vbi lenta relicta fuit ex febre acuta, diu perseuerandum est in usu leniorum resoluentium. Dari possunt infusa calida ex radice Cichorei, Caryophyllatae, Scorzonerae, Saffaparillae, Chinae ponderosae, Foeniculi, Graminis, &c. herba Veronicae, Salviae, Cardui benedicti, femine Foeniculi. Potioni praestanda est aqua Selterana, vel Ptisana ex decocto radicis Chinae, Scorzonerae, Cassiae lignae. Horis vespertinis et vbi noui febrilis motus plerumque fit initium, dari potest liquor terrae foliatae tartari, vel puluis ex nitro, antimonio diaphoretico et terreis. Sudor nec cohibendus, nec augendus est. Prae ceteris crebrius, et quantum vires id permittunt, primae viae purgandae sunt, iterato usu Rhabarbari vel Pilularum Stahlii. Tandem si febris diutius hominem tenet, et Medicus certus est, in visceribus esse atoniam, non vero scirrhum, nec aliud vitium, confugiendum est ad Corticem Peruuianum. CELSVS *Cop. IX. Lib. III.* aliud auxilium proponit, et iubet, vt morbus mutetur, atque sic curationi oportunior fiat, corpus aqua frigida, cui oleum adiectum sit, pertrahari, et sic futurum esse, vt horror oriatur, et fiat initium noui motus.

§. 254.

Si vero lenta non ex alio morbo, sed ex erroribus in diæta et cruditatibus primarum viarum oritur, id quod et
I
caussa,

caussa, et praecordiorum anxietas, ardor ventriculi eiusque imbecillitas testantur, ante omnia illae cruditates tollendae sunt. Non nisi robustioribus, et si morbus admodum recens est, conducit emeticum, praemissis tamen prius digestiuis. Aliis infirmioribus dari debet Rhabarbarum, quod et in hoc casu optimum est. In valde imbecillis ei adijci potest nitrum cum absorbentibus, et diu in horum usu perseverandum est. Paulo robustioribus conueniunt infusa vinosa per epicrasia laxantia, maxime si in ventriculo non tam acor, quam iners pituita haeret. Optimum leuamen adferunt Thermae et Acidulae, quae vero aegri viribus accommodari debent. Valde imbecillis minus valentes, addito etiam lacte, proficiunt: nec serum lactis alienum est. Ante omnia euitandus est omnis potus fermentescens seu cereuisia. Cum aqua, vel interdum ptisana, concedi potest, immo salubris est haustus vini generosi. Imperanda est abstinentia ab omnibus dyspeptis, fermentescentibus, acidis, pinguibus et rancidis, flatulentis. Plurimum confert moderata, diuturnior et aequalis corporis exercitatio; sine his ex dieta praesidiis medicamenta parum posse, experientia docuit.

§. 255.

Si febris lenta orta est ex defecta vitali virtute, a nimia Venere, gonorrhoea diuturna, ptyalismo per mercurium concitato, sedulo aegro imperandum est regimen et abstinentia. Propinari debent iuscula carnum iuniorum cum herbis recentibus, Acetosae, Chaerephylli, Millefolii, Cardui benedicti, vel radicibus, recentibus, Apii, Petroselini, Cichorei, additis Cancris fluuiatilibus, qui viui contundi et parum ex iusculo coqui debent, vel etiam additis cochleis. Proficiunt iuscula tenuiora cum viperis decocta, quae praecipue in morbis ex malo venereo ortis aliquam efficaciam habent. Nec alienae sunt gelatinae ex cornu cerui, vel, quae meliores sunt, ex ossibus iuniorum animalium. Proficiunt etiam emulsiones ex amygdalis, pincis et pistaceis.

Si

Si in ventriculo lac non coacescit, cuius rei experimentum paucis saltem deglutitis vnciis fieri potest, saluberrimum est lac asininum cum aquis Selteranis. Aliena est omnis potio fermentescens. Potioni praestandum est decoctum cornu cerui, eboris, Scorzonerae, hordei, vel decoctum Chinae cum paucis cortice Cassiae lignae. Videndum est, ut alius semper aperta sit, quae solui debet clysteribus ex decocto Tamarindorum. Non negligi debent balnea aquae dulcis, quae vero, quantum aeger ea tolerare potest, debent esse frigida. Si primae viae repurgatae sunt, et imbecillitas manet in visceribus, oportet huic mederi idoneo victu, exercitatione et usu corticis Peruvianii. Haec si paululum saltem iuvant, haud remoueri oportet, quia profectus tempore expletur. Eum in modum etiam aliis causis, scabiei, tineae, haemorrhoidum, menstruorumque vitiis accommodanda est curatio.

§. 256.

In hectica, si semel inualuit, leuamen, non vero perfecta curatio sperari potest. Est tamen magnum discrimen inter morbi initia, et si is iam in exitum ruit. Nam etiam hic morbus, curatius obseruato regimine et accommodato victu, per longum tempus, immo plures annos interdum trahi potest. Magis periclitantur corpora rara, succo plena, quam adstricta. Eiusmodi homini interdum dari debet infusum vel decoctum aquosum radices Cichorei, Scorzonerae, Saffaparillae, herbae Chaerephylli, Veronicae, Millesfolii, Capillorum Veneris. Quam primum vero apprehenditur his decoctis vel infusis aestum augeri, ea omitti debent. Potioni praestandum est decoctum ex radice Scorzonerae, Glycyrrhizae, rasura cornu cerui, additis etiam sub finem paucioribus passulis. Talis ptisana non valde meraca esse debet. Si febris aestusque urgent, huic ptisanae adijci possunt succi acidi, roob cerasorum et ribesiorum. Alius interea soluenda est crebrioribus lotionibus emollientibus, et si vires id permittunt, dari simul potest

Rhabarbarum, vel decoctum Rhabarbari cum Tamarindis. Semper melius est ab omni curatione abstinere, quam valentioribus medicamentis aegrum praecipitare.

§. 257.

Nihil vero his salubrius est, quam lac asinum cum aquis Selteranis, vel etiam solum, et, si morbus iam invaluit, lac foeminae iunioris recte valentis. Cum hoc vero ab omni fere alio medicamento abstinere debet aeger, ita, ut praeter lac, paucumque panem candidum et aliquam ptisanam, parum vel nihilumat. Etiam lac cum ptisana vel eiusmodi decocto herbarum et radicum misceri darique potest. Animal, vel etiam foemina, cuius lacte utitur aeger, ali debet exquisitiori pabulo atque victu. Interdum conducit serum lactis, ea ratione, de qua alibi dixi, parandum, vel etiam serum lactis dulce. Vid. *Frid. Hoffmanni Dissert. de Seri lactis virtute longe saluberrima.*

§. 258.

Nonnumquam in his aegris magna partium solidarum atonia est, quare modo dictis infusis atque decoctis adijci possunt tonica, ex herba Veronicac, Millefolii, Scabiosae, floribus Hyperici, Rosarum rubrarum. Proficit hic multum illud decoctum radice Chinac cum Cassia lignea. Nimia adstringentia saepe novum infarctum parere, et malum augere possunt. Cum his aeger versari debet in aëre magis frigido, quam calido, eoque puro et montano. Sedulo etiam in vehementiori aestu aër refrigerandus est. Victus sit, qui sustinet, non alit. Optima sunt iuscula valde tenuia carniū iuniorum, cum lactuca, portulaca, buglossa, chaerephylo, cancris fluviatilibus decocta. Perniciosa sunt nimium virulenta, nec non quaevis, quae difficilius coquantur. In hectica consummata dari debent acidulata, iulapia, succi acidi, serum lactis dulce, quod *Frid. Hoffmannus* describit in *Med. Consult. Tom. VIII. Dec. I. Cas. III.*

§. 259.

§. 259.

Hæcticae quoddam genus est Marasmus senilis, seu tabes torrida, quae oritur in senibus, in quibus etiam, ceteroquin sanis, tandem humores lenti fiunt et partes solidae rigidae. Marasmm hunc significant aucta imbecillitas, appetitus prostratus, febricula, quae horis vespertinis plerumque intenditur. Morbus si inualuit, morte finitur, nec aliam curationem, quam quae hæctica, recipit. Auerti potest in senibus corporis modica exercitatione, aëre salubri, victu laudabili, vino paucō, sed meraco, et si alius crebrius lenioribus soluitur. Si adsueta sunt sanguinis missioni, illa temere negligi non debet.



FEBRIS SCARLATINA ET VRTICATA.

§. 260.

Sunt febres ex genere catarrhalium et exanthematicae. Oriuntur a sero represso, alias per cutim exire solito. Scarlatina frequentissima est infantibus, et proxime cum erysipelate conuenit. Saepe epidemicae et post repentinas aëris mutationes oriuntur. Quandoque in scarlatina non solum rubor est, sed etiam singularis tumor cum magno pruritu. Omnia tamen haec, veluti erysipelas, et locum mutant, et mox iterum euanescent. In febre vrticata maiores vesicae et pustulae repente nascuntur in cute, iis similes, quae oriuntur, si cutis vrticis caesa fuit. Vtrumque genus morbi plerumque sine periculo est, et paucis diebus finitur. Rarius ex epidemica constitutione, et nimio aëris aestu, in corpore impuro, funesta accedit malignitas. Nec harum febrium curatio alia est, quam aliarum exanthematicarum. Si benigna febris est, nullam medicationem postulat. Vitari

oportet repentinas aëris vicissitudines perflatumque. Post superatam febrem aliud duci debet, et dari infusum aquosum, quo sanguis purgatur, et lene catharticum.



DE PLETHORA ET MORBIS, QUI EX PLETHORA ORIRI DICUNTUR.

§. 261.

Plethora dicitur abundantia tum sanguinis, tum aliorum succorum ad corpus alendum idoneorum, qua natura ita grauatur, ut corpus ad debitas functiones peragendas minus sit promptum aptumque. Distinguunt inter Plethoram ad vires et vasa. Prior esse solet in corporibus raris, in quibus a nimio sanguine vasa maiora ampliantur, minora vero et cum his nervi ab aucta tumenteque adipem premuntur arctanturque, quam ob causam vitalis renixus inter fluida et solida impeditur ac quasi suffocatur, ita, ut sequatur languor totius corporis et ad consuetam munia peragenda ineptitudo. Alterum genus dicitur plethora ad vasa, quod esse solet in corporibus adstrictis atque siccioribus, in quibus omnia vasa maiora, praeter ceteris venae, super paucam adipem eminent, et sanguine turgidae in oculos incurrunt. Sedulo vero notandum, venas aliaque vasa saepe etiam tumida et turgida videri in corporibus valde infirmis, immo funesta tabe absumentis, quae res non a plethora proficiscitur, sed ab atonia tunicarum, ex quibus vasa composita sunt, atque ab ipsius cutis laxitate.

§. 262.

Pleni sunt et vera plethora laborant homines, quibus omnia viscera, praesertim chylopoea, integra sunt et naturale suum robur habent, qui in aëre salubri degentes se alimentis

mentis boni succi implent, corporis exercitationem negligunt, somno indulgent, nec animum intendunt, sed otio torpent, atque post cibum conquiescunt. Pleni autem vel Plethorici fiunt prae ceteris iuniores atque foeminae, quibus corpus magis rarum est ac viris. Plurimum confert, si sanguinis missiones consuetae negliguntur, deinde si sanguinis profusio per nares aliasque sedes, quae olim frequentius incidit, iam conquieuit vel suppressa fuit. Etiam post praecisa maiora membra sanguinis copiam in reliquo corpore augeri necesse est.

§. 263.

Plethorici conqueruntur de corporis lassitudine, difficultate spirandi, somno difficili atque per vanas imagines et tumultuosa somnia, turbato, quavis etiam leui exercitatione lassantur atque molestiam sentiunt. Plethoram etiam manifestat color et corporis habitus.

§. 264.

Fœcunda mater est plurimorum morborum. Ex vasis enim dilatatis, tandemque infirmatis eorum fibris, sanguis erumpit. Sanguinis vero profusiones corpus aliis morbis opportunum reddunt. Turbantur omnes se- et excretiones, succi omnes et ipse sanguis in visceribus non recte digeruntur, rubicundus sanguis vrgetur in dilatata nimis oscula arteriarum lymphaticarum, vnde tandem cruditatem, obstructionem, inflammationem oriri necesse est. Praecipue vero plethora nocet, si illa ab aliis causis procatacticis, veluti vehementi et repentina animi perturbatione, corporis exercitatione, potu inebriante, oestro venereo, aliisque agitata fuit. In gravidis ex plethora saepe abortum fieri, compertum est. Diu tamen sincera plethora in corpore esse nequit, sed protinus mutatur in cacoehymiam. Omnes plethorici ex quouis morbo magis atque alii periclitantur.

§. 265.

Plethorae optime mederi possumus tenui parcoque victu, potu diluente, praecipue aqua, somno breui, et tum

corporis, tum ingenii exercitatione. Caueant tamen plethorici, ne se potione minus valente eaque nimia impleant, et corporis exercitationem cum hac negligant, qua re corpus cacoehymiae aliisque grauissimis morbis obnoxium reddunt. Quia plures hanc, quae per abstinentiam fit, medendi rationem contemnunt, ii confugere solent ad sanguinis missiones. His tamen non temere adfuefieri debet iuuenilis aetas, quum, iis in consuetudinem adductis, corpus infirmum fiat, et alijs aduersae valetudinis generibus obii-ciatur. Etiam in corporibus infirmis et valde obesis modus seruandus est. Crebra enim sanguinis detractione corpora non raro obesiora fieri compertum habemus, quod ex tardiori sanguinis motu adeps augetur. Proficiunt tamen, immo non raro necessariae sunt, sanguinis missiones prophylacticae, et eo tempore is detrahendus est, quo aeger recte valere videtur. Post sanguinis missionem semper corpus exercendum est, vt exercitatione nouum robur accipiant solida, digeranturque humida. Antequam vena inciditur, aluum duci commodum est.

§. 266.

Sunt etiam alia, quae sanguinem minuunt, dum eum efficacius resoluunt. Prima sunt: Thermae et Acidulae. Quum vero harum vsu vorandi facultas augeri soleat, corpora aliquantum extenuata protinus iterum ad pristinum habitum reuertuntur, immo raro in hoc subsistunt, sed ultra progressa pleniora sunt. Ceteroquin laudantur ad id expurgantibus Sal catharticus, aqua Seidschützenis, Cremor Tartari, folia Sennae et Aloë, si ci Tartarus vitriolatus aliusue Sal adiicitur. Raro tamen his vtendum est, quum ex eorum nimio vsu maiora mala metuenda sint.

HAEMORRHAGIAE.

§. 267.

Sanguis, si eius copia corpus male habet, saepe cum multo leuamine excernitur. Sed etiam is ex aliis saepe caussis, si corruptus est, et si solida infirmata vitiatque sunt, non sine periculo profunditur. Non enim haemorrhagiae semper a plethora, sed non raro ab his modo dictis aliisque caussis, praecipue a viscerum obstructione et impedito circuitu, oriuntur. Sanguis etiam ex variis occasionibus, ex tabe, inedia, morbis malignis, ex carcinomate, vel interiores, vel exteriores sedes infestante, tum tenuior, tum acrior fit, et qui celerius prorumpit. Accedunt aliae caussae procatarticae: aestus, frigus, aër rarus densusque, humidus, vehemens exercitatio, nixus valentior, potus inebrians, medicamenta calida, Venus, animi pathemata, &c. Etiam ubi aliae sanguinis, per catamenia, haemorrhoidesque, excretiones diu non responderunt, illae nonnumquam cum vi et periculo erumpunt. De vulnorum haemorrhagia videnda est Chirurgia. In haemorrhagiis, quae sponte fiunt, considerandus potissimum est locus. Nam si ex sedibus minus aptis fiunt, v. g. ex pulmone haemoptoe, ex ventriculo vomitus cruentus, etiam ex minori profluuiio magnum periculum imminet. Narium vero haemorrhagia et haemorrhoides, nec non sanguinis profluuium per vterum, raro nocent, nisi hominem prorsus exhauriant. Priores excretiones omni adhibita diligentia auerti debent, vltimae vero, nisi immodicae fuerint, tolerari. Numquam autem sanguinis profluuium, nisi vltima hoc requirit necessitas, vi et reprimentibus subito coercendum est, quum nec hoc in vulnibus tutum esse Chirurgia docuerit. In morbis aetatum obseruatum fuit, pueris et adolescentibus frequentiore esse narium haemorrhagiam, iunioribus haemoptoen, viris haemorrhoides, senibus mistum cruentum. Foeminae, si iis

catamenia non respondent, interdum sanguinem vomunt, raro vomitu hoc cruento laborant yiri. Nimia sanguinis profusio, tum per nares, tum per alia loca, facta, vel nimis frequens, quamvis ab initio a plethora profecta fuerit, et corpori salubritatem attulerit, tandem tamen corpus infirmat, humorum omnium coctionem impedit, fibras solidarum partium relaxat, et ideo cacochymiam, cachexiam, neruorum summam debilitatem, in foeminis hystericum morbum, in omnibus hydropem, immo viscerum scirrhum et tabem relinquit. Mala funestaque signa cum sanguinis profusione sunt: Sudor paucus, frigidus, hebetudo sensuum, surditas, singultus, horror, rigor, sopor, conuulsio, deiectio fecum cruentarum vel nigricantium.

§. 268.

Si sanguis non tam impetuosius, quam crebrius profluit, id auerti quandoque potest accommodato exiguoque victu et aquae potu. Si vero cum impetu sanguis erumpit, videndum est, num hoc a plethora, num ab aliis causis proficiscatur. In plethora adhibenda sunt omnia auxilia, quae aduersus eam possunt (§. 265.). Sanguis etiam interdum mitti potest longissime a parte, ex qua erumpit, vt ei aliud iter detur, quae res tamen prudentiam medentis desiderat, ne aeger omni vi effusa praecipitetur. Dari possunt pulueres ex nitro et coralliis rubris, qui pulueres ex aqua gelida sumi debent, et saepius iterari. Proficit etiam haustus aceti. Nec alienae sunt emulsiones dilutiores cum semine papaueris et nitro, vbi tamen acida omittenda sunt. Ante omnia et hic curandum est, vt alius respondeat, quae vero non aliter, quam lotionem, etiam frigidiusculam, duci debet. Potioni praestanda est aqua, addito succo Citri, decoctum crustae panis domestici, decoctum Tartari. Primum est quies, et hominem in tenebris esse, ab omni strepitu remotum, sine animi contentione et sollicitudine. Si nimium vrget sanguinis profusio, locis remotioribus admoueri possunt cucurbitulae, vel siccae, vel concisae prius cute. Aer sit

sit frigidus, cui etiam supra expositis auxiliis refrigerium afferri oportet. Si vero homo sanguinis profusione exhaustus est, is debet contineri in loco obscuro, et ab omni strepitu remoto. Alendus est iusculis ita, ut horum non nisi parum atque egelidum aegro afferatur. Si metus est, ne iterum erumpat sanguis, potioni praestandum est decoctum fursuris, panis domestici, hordei excorticati. In victu adhibeantur austera. Aeger abstineat a vino, aromatato, cibo valentiori, Venere, corporis exercitatione, negotiosa actione et omnibus, quibus sanguis cietur.



HAEMORRHAGIA NARIVM.

§. 269.

Hoc sanguinis profluuium per nares in febribus est vel criticum, vel symptomaticum. Si autem sine febre et sine alio morbo incidit, nec morbum relinquit, dicitur nonnullis spontaneum. Hoc vltimum pueris frequentius est, praeceteris iis, qui ab infirmis geniti, debilesque, pleno lautoque victu aluntur, corpus vero parum exercent. Experientia docuit, hos, nisi a tali victu et a potione valentiori abstineant, adolescente aetate sanguinem exspuere. Senibus, quibus praeter consuetudinem sanguis frequentius per nares erumpit, metum apoplexiae facit. De critica haemorrhagia supra dictum est, quam morbos acutos, phrenitidem, febrem ardentem, hepatitidem, immo et pleuritidem, apoplexiam, interdum etiam chronicos, diuturnam cephalalgiam, grauedinem, nervorum distentionem, solvere compertum est. Retulimus etiam, criticam profusionem a symptomatica distingui tempore et coctionis signis. Alius generis mentio facta est, quod, quamvis morbum non prorsus soluat, eum tamen plurimum leuet, quod in variolis

lis potissimum eruptionis tempore accidit. Symptomatica profusio, a morbo eiusque causa profecta, nocet, et interdum non sine periculo est. Hominibus enim valde infirmis quandoque vita cum sanguine effunditur, vel relinquitur tabes, cataracta et glaucoma, gutta serena, et ex his oculorum caligo atque coecitas. Symptomatica non raro oritur propter maiorem viscerum obstructionem, quae hecticam relinquit. Vbi vero hecticis, quibus sanguis valde tenuatus, omniaque vasa resoluta laxaque sunt, sanguis copiosior profluit, mors in propinquo esse solet.

§. 270.

In curatione animus aduertendus est ad omnia, quae supra de haemorrhagiis in genere praecepi (§. 268.). In corporibus robustis vegetisque non est, quod paullo longius profluvium timeamus, quod non raro salubre est. Tanto magis de criticis haemorrhagiis haud ignorari oportet Medicum, nihil paucum criticum esse. Certiora signa habemus, quae ostendunt, aegrum ex sanguinis profusione periclitari. Absumi, immo et rapi illa potest aeger, si ei corpus per naturam tenuius est et imbecillum; si sanguis cum impetu erumpit, ut brevi tempore aliquot eius librae profuant; si cum his corpus, facies, ungues et prae ceteris labia cum pallore inalbescunt, extrema frigent, arteriae subeunt et quiescunt, homo somno urgetur, et anima etiam deficit. Nec tamen semper animae defectio terrere debet. Nam non raro sub hac imbecillitate sanguis, qui artis auxiliis suppressi haud poterat, sponte conquiescit. Si autem hoc profluvium saepius reuertitur, id etiam metum cachexiae, lentae febris atque tabis facere potest. Quare si corpori pleno atque iuuenili periculum ex profusione imminere videtur, adversus eam adhibenda sunt omnia, quae eam avertere possunt. Primum est sanguinis missio, qui ex talo detrahendus est, longissime ab ea sede, ex qua erumpere solitus est. Nam haec sanguinis detractio facere potest, ut e naribus fluere desinat, si illa aliquoties iteratur. Non nisi parum

parum detrahendum est, et interdum loco incisae venae cutis concidi potest, et ex hac impositis cucurbitulis sanguis extrahi. Aeger abstineat ab omni re, qua sanguis cietur. Vita sit debilis, aër quantum fieri potest frigidiusculus, portio dilutior, cibus ex materia minus valente atque talis, qui aegrum sustinet, non alit.

§. 271.

Haec quum idonea sint, vbi haec profusio saepius revertitur, iam videndum, quid agere oporteat, quo tempore sanguis cum periculo ex naribus funditur et metum facit, ne hominem interimat. Plures etiam hic iubent sanguinem ex alia parte, et ex incisa iuxta talum vena emittere. Hoc vero in vehementi malo non sine periculo est, quum homo facile exhauriri possit, et experientia docuerit, sanguinis cursum hac per artem facta detractione haud cohiberi cucurbitulis. Confert extremos artus, manus pedesque, lino ita deligari atque constringi, vt sanguinis cursus per arterias liber sit, eius vero reditus per venas tardetur. Admoueri debent collo, nuchae, fronti, epithemata frigida ex aqua rosarum, addito sale communi; si tempus id permittit, radices Bistortae, Tormentillae, herba Millefolii, Saniculae, Sigilli Salomonis, Alchimillae, coquantur ex oxycrato, addito sale. Saepe proficit, si aegro haud opinanti gelida aqua adspargitur. Alius ducenda est enemate frigido, vt retenta materia euocetur; post in eam immittendae sunt lotiones ex aqua frigida, addito nitro. In nares immitti possunt linamenta, cum alcohol vel tinctura terrae Catechu expressa madefacta. Valentius est vitriolum, si id aqua soluitur, et eo linamenta madefiunt. Necessè vero est, vt haec linamenta oris venarum adprimantur. In Chirurgia traditur methodus, qua illa, filo per nares faucesque traiecto, valentius adduci et adprimi possint. Vid. Cap. de Polypo. Praestanda est frigida, dandum est nitrum cum coralliis. Abstineat aeger ab omni calido.

§. 272.

Quia haemorrhagia narium plures morbos soluit, alios leuat, plures hanc excretionem moliti sunt, et varia tum a Graecis, tum ab Aegyptiis excogitata fuerunt ferramenta, aliaque ad id idonea. Anserinam pennam, cuius extrema ora in longum incisa et retorta est, a recentioribus adhibitam esse legimus. Id quod ex ARETAEO discimus, nec non Aegyptii, auctore ALPINO, de scarificandis naribus cogitauerunt, et varia instrumenta inuenerunt. Vid. nostra *Differt. de Scarificatione oculorum.*



HAEMOPTYSIS.

§. 273.

Est sanguinis paullo copiosioris profluuium per pulmones. Distinguitur a sputo cruento, quod quandoque a faucibus erosio vel exulceratis, a gingiuis, dente carioso, crebrius a naribus fertur. Ex naribus enim exit et saepe in fauces defluit sanguis, qui vel sreatu, vel leui tussicula reiiicitur. Hoc sputo cruento, in quo nullum periculum est, soluitur quandoque cephalalgia. Aliud sputum cruentum est in peripneumonia, ubi sanguis cum pituita remixtus, post praegressam febrem coctionemque tussi extunditur. In vomitu cruento sanguis magna cum nausea ex ventriculo reiiicitur per vomitum, qui plerumque nigricans est et coactus. Quibus haemoptysis imminet, ii sentiunt aliquam spirandi difficultatem, molestam faucium et pectoris intra scapulam stricturam, horripilationem et frigus extremorum, dolorem in pectore, cordis palpitationem. Post aeger paullum tussire incipit, sentit pruritum et aliquem calorem in trachea adscendentem, sanguis in os fertur, sine dolore, qui coccineus, multo aëre remixtus, spumidus respuitur. Si sanguis ex inferioribus pulmonibus procedit, tussis vehementior

mentior est, quam si ex supremo pulmone fertur. Si sanguinis maior modus fuit, et aeger tempore, quo is prorumpit, supinus cubavit, accidere potest, ut eius aliquid deglutitum fuerit; quod post vomitum reiectum Medicum fallere potest.

§. 274.

Morbus hic frequentior est iunioribus, quibus corpus procerum est et tenue, et fibrae infirmae sunt, qui ex re quavis protinus rubore suffunduntur, et qui pectus depressum habent, praecipue si illis sanguis abundat, isque tenuis et rubellus est. Morbus haereditate propagatur. Aliae causae procatasticae plures sunt, obstructio mensium et haemorrhoidum, citatio cursus, vehementior nixus, et si homo graue portat onus, maxime si tales exercitationes in aëre vel iusto frigidiori, vel etiam calidiori fiunt. His causis adnumerari debet ira cum multa vociferatione et voce acuta, tibiæ inflatio, potus inebrians, balneum calidum, diuturnior alui obstructio, nixus ad deponendam aluum, vel ad partum edendum, arctiores vestes thoracesque, quibus foeminae amittuntur. Plurimum confert aër vel nimis tenuis, in altiorum montium cacuminibus, vel nimis frigidus. Vtroque enim sanguinis transitus per pulmones et perspiratio tardantur cohibenturque. Raro sanguis effertur ex arteriis venisque per halitus sulphureos acidos excisis. Alii metallici halitus occasionem dare possunt, dum his pulmo constringitur et sanguinis motus impeditur. Interea humorum acrimonia, quamvis non ita facile vasa arrodit, tamen minima vascula stringit arctatque, sanguinem cogit, qui in vascula lateralia transfusus, haec subsistendo diuidit, et spasmos, stricturem, sanguinis sputum aliosque morbos excitat. Ab interna acrimonia malum ortum esse, notam habemus ex sapore salso, de quo aeger conqueritur. Phthificis non raro sanguis ex pulmonibus prorumpit, quae res hominem subito strangulat, vel mortem certo maturat. Haemoptoe ex menstruis suppressis orta, eorum plerumque perio-

periodum seruat, quam præterea ex vulnere icæne grauiore, pectori illato, interdum oriri nemo ignorat.

§. 275.

Sanguis ex naribus et faucibus in pulmonem destillans, qui etiam in aspera arteria titillationem tussimque excitat, decipere potest Medicum. Tunc vero aegri molestum sensum habent in palato, non vero in pectore vel trachea. Vera hæmoptoë nunquam sine periculo est. Sanguis enim, qui ex receptaculis suis erumpit, non solum in pulmonis vesiculas, sed etiam in contextum cellulosum, qui inter illas medius est, ingreditur, in quibus calore corrumpitur, ut vlcera sequantur. Raro hæmoptoë repente funesta est, nisi phthisicis. Crebrius Phthisis et Asthma eam sequuntur. Maior metus est, si corpus cacochymia vel alio morbo laborat. Plus periculi habet, si sanguis ex rupto vase maiore et ex imis pulmonibus procedit. Si post hæmoptoën pus excreatur et febricula accedit, phthisis sequitur. Mali morbi testimonium est, si is per hæreditatem relictus fuit. Minus periclitantur aegri, quibus ab aëre nimis raro, vel a catameniis suppressis orta fuit hæmoptoë. Ex causarum enim notitia atque aestimatione petenda est et prognosis et medendi ratio.

§. 276.

Vbi itaque sanguis cum impetu ex pulmonibus effertur, isque exspuitur, protinus eius non parum, et ad minimum libra pondo, ex talo detrahenda est. Sanguinis missio iterari debet, si homo plenior est, atque calor et febricula manet. Dari possunt nitrum cum coralliis ana gr. xv. vel loco coralliorum lapides cancrorum cum acido Citri. Alius soluenda est lotione emolliente frigida, addito melle et nitro. Quamprimum sanguis conquieuit, dari debet Apozema ex Tamarindis, Passulis, cum Manna, vel Syrupopo de Cichoreo cum Rhabarbaro. Sales alieni sunt. Si malum vehementer vrget, crura quoque et femora, immo et brachia pluribus locis deligari possunt. Primum est quies,

tum

tum corporis, tum animi, maxime pectoris et pulmonum. Nocet aer nimis calidus, nimis frigidus, nimis etiam rarus et concretus. Pessimus vero aer, qui morbum fecit, si is non mutatur. Dari possunt emulsiões ex semine Cardui Mariae, Papaveris, Pineis, addito pauco nitro. Adstringentia non ita tuta sunt, quod ex iis tubercula vel vomicae nascuntur, et ex his phthisis relinquitur. Ceteris tolerabilior est Tinctura terrae Catechu. Extollunt succum recentem Centupodii, vel Vrticae minoris, qui aquis destillatis, vel decocto hordei, admisceri potest. Nocent omnia acria et volatilia. Victus sit modicus, a fame propior. Conueniunt puliculae ex oryza, auena, hordeo excorticato, gelatina ex Cornu Cerui cum succo acido et alia similia, fructus etiam horaci aëre exsiccati. Aeger ab omni tum corporis, tum maxime pectoris exercitatione, a Venere etiam et a balneo absteineat. Aëris rationem habeat, et conclaue calidum inclusum, multa vestimenta eaque arctiora, vitet. Numquam alius adstricta sit vel iusto siccior. Si malum vehementer vrget, quandoque ad sanguinem sistendum proficit haustus frigidae aquae.

§. 277.

Si sanguis prorsus conquieuit, relicta tamen fuit spirandi difficultas, semper metuenda est phthisis. Omne praesidium in abstinentia et regimine positum est. Plurimum proficit lac asininum, quod per vnum alterumue mensem potandum est. Si homo lac ferre nequit propter imbecillitatem, et quod illud in eius ventriculo coacescit, is potare potest serum lactis dulce ad methodum HOFFMANNI. Etiam conducunt infusa aquosa dilutiora, nec valde calida, ex herba Veronicæ, Chaerophylli, Scabiosæ, floribus Arnicae, Bellidis et Rosarum. Floribus Arnicae, quos ex aqua vel cereuisia coquunt, magnam virtutem tribuunt. STAHLIUS laudat aquam pectoralem ex herbis recentibus fermentatis paratam. Vid. eius Dissert. de *Affectibus pectoris* §. 53. Plures extollere solent balsama acriora, quo-

rum vnā vel alteram guttulam cū vitello oui, vel etiā emulsione subactam, interdum dare licet. Quam primum vero deprehenditur, his anxietatem sanguinisque motum augeri, ab iis abstinendum est. MORTONVS plurimam tribuit Cortici Peruuiano, qui vero etiā caute adhibendus est. Quando omnia conquieuerunt, maxime post vsum lactis asinini, in corpore, cuius fibrae relaxatae, ille admitti posse videtur. Nocent becchica sine moderamine data, quibus pulmonum fibrae relaxantur. Primum et optimum auxilium est abstinentia et continentia aegri, cui nocet omnis potus inebrians, victus aromaticus, sale conditus. Nam etiā medicamenta ex salibus nocere possunt, dum nimium stimulant et tussim excitant. Nocet etiā omnis valentior exercitatio, animi perturbatio, maxime etiā repletio tum ventriculi, tum intestini coli, quibus tumidioribus diaphragmatis motus impeditur. Alius sit libera, numquam cohibeatur sudor, et vitetur, quantum fieri potest, sternutatio et tussis. Conuenit vectio in curru, in aëre puro, nec nimis frigido, nec calido, et pro valde imbecillis gestatio in lectica. Robustioribus, vbi sublatus est sanguinis motus, equitatio. Victus ab initio parcus sit, a fame propior, ex vegetabilibus, lacte et fructibus horaeis aëre siccatis, hordeo et auena. Diligentius omnia obseruanda sunt, et sanguis mittendus ex talo, idque ab initio secundo et tertio quoque mense, si homo plenus est, et cetera viscera ei bona sunt. Etiā interdum cruribus admoveantur cucurbitulae, concisa prius cute. Si malum ab haemorrhoidum moliminibus profectum esse videtur, profunt hirudines. Summum remedium est aëris salubritas, quare ab huius mutatione nonnumquam omne praesidium petendum est.

VOMITVS CRVENTVS.

§. 278.

De vomitu cruento, qui ab adsumtis acrioribus, venenis et drasticeis medicamentis oritur, et qui cum inflammatione est, supra diximus. Aliud genus est, quod a causis externis, ictu atque vulnere illato, profectum, raro sanari potest, et violentum cum priori vocatur; spontaneus vero vomitus dicitur, si sanguis ex dilatatis ruptisque vasis sanguiferis in ventriculum effertur et vomitu rejicitur. Differt ab haemoptysi, in qua sanguis extussitur, non vero vomitu editur. Observatio docuit, in iis, qui ex hoc morbo perierunt, repertas fuisse venas, quae ex ventriculo ad lienem descendunt, et vasa brevia dicuntur, sanguine distentas ruptasque, lienem vero tumidum atque induratum, interdum etiam iecur affectum atque durum.

§. 279.

Vomitus cruentus fere ex iisdem causis, ex quibus haemoptysis, oritur (§. 274.), maxime a catameniorum et haemorrhoidum suppressione, et si ex his humida corporis, ipse praesertim sanguis, corrumpitur. Dum enim ab humorum acrimonia spasmi fiunt, iis sanguinis motus per vasa, praecipue per venas, impeditur, vasa intumescunt, et tandem horum extrema et vascula e lateribus educta ampliantur et sanguinem transmittunt. Contingere etiam potest, ut haec receptacula rumpantur et ex iis sanguis feratur. Occasionem ceteroquin dare possunt varia: potus spirituosus, emeticorum abusus, extremorum refrigerium, ira post pastum, si ventriculus cibis valentioribus impletus, tanto magis, si haec fiunt tempore, quo catamenia fluunt, et si haec ex terrore subito supprimuntur. In genere notandum est, si menstrua et haemorrhoides non recte proueniunt, saepe laborare ventriculum, aegrum nausea, dolore
K 2 aliisque

aliisque symptomatibus grauiter affici, idque oriri a sanguinis congeſtione, vel impedito per hoc viſcus tranſitu, non vero ſemper a cruditatibus aliisque, quae alias ventriculum onerant.

§. 280.

Morbus non ſine periculo eſt, eius tamen minus habet, ſi foeminis accidit ex catameniorum ſuppreſſione. Nam his iterum prouenientibus, raro noxa relinquitur in ventriculo vel liene, quod viris longe frequentius accidere experimentis compertum eſt. Foeminis tamen metus eſt, ne morbus, data occasione, recrudeſcat, quare hic abſtinentia valde neceſſaria eſt. Si enim ventriculum re quauis onerant, vel ſaltim implent, iterum diſtenduntur vaſa, et facile ſequitur nouum ſanguinis profluuium. Praegnantibus ſi incidit, poſt partum quieſcit. Si frequentior recurrit, vtriuſque ſexus aëgris periculum cachexiae adfert, quae etiam metuenda eſt iis, quibus quartana vomitu cruento ſoluitur. In acutis vix non ſemper funeſtus eſt, quamvis etiam die critico fiat. Etiam vomitus cruentus ex ſuis cauſis oritur, ſique febrem habet comitem acutam, tunc vel tardiorem, vel ſeriuorem mortem denunciat. Raro accidit, vt ſubito iugulet aegrum. Si ſanguis diutius, vel in obſtrueto liene, vel in ventriculo vaſisque varicofis, conqueuit, praefertim ſi is ab acore hypochondriacorum et melancholicorum coactus fuit, oritur vomitus nigrorum. Haec materia nigra, picea, ex parte per aluum effertur. Hoc ſi incidit, vix ſeruari poteſt aeger, maxime ſi id, quod reiicitur, nares offendit, et cadauer olet, ſi accedit macies, debilitas, et ſi aeger ſaepius animo linquitur. Si autem, poſt ſanguinis nigri coacti vomitum aut deiectionem, ſanguis ſincerus, rubicundus, per aluum deſcendit, vix vlla medicina periculum ſubtrahere poteſt.

§. 281.

Curatio parum differt a curatione haemoptoës (§. 276.). Si multum ſanguinis vomitu editur, et homo plethoricus eſt,

est, protinus sanguis detrahi debet ex talo. Alius ducatur clystere molliente et frigido, addito nitro. Ventriculus plerumque omnium rerum impatiens est. Dari potest infusum vel decoctum Millefolii, florum Arnicae et Chamomillae cum liquore anodyno. Nec alienum est decoctum Myrtillorum et Mespilorum siccatorum. Valentiora tonica et adstringentia bona haud sunt. Si vomitus paullulum conquieuit; dari potest puluillus ex Coralliis, Conchis citratis, dente Hippopotami, mandibulis Lucii piscis vel Cornu Cerui sine igne, addito pauco nitro. Si tamen morbus vehementer vrget, dari etiam potest terra Catechu, vel terra sigillata. Obseruatio docuit, in foeminis, praecipue grauidis, satius esse malum tolerare, quam sanguinem adstringentibus coërcere.

§. 282.

Vbi omnia placata esse videntur, educendus est sanguis et repurgandus ventriculus. Omnium optime hoc fit dato Rhabarbaro cum lapidibus Cancrorum cum acido citri saturatis, et addito pauco nitro. Proficit etiam lene digestium ex liquore Terrae foliatae Tartari, addito spiritu nitri dulci. Tandem vero, vbi omnia conquieuisse videntur, dari possunt ab initio emulsiones ex aquis tonicis, et tandem aliqua paullo efficaciora, veluti Tinctura Vitrioli martis Ludouici ad guttas XXX-XL. Tinctura Coralliorum, eadem circiter dosi, et similia. Quo nouus insultus auertatur, ante omnia euitanda est omnis repletio. Nam semper oportet ventriculum contractionem esse, quare aegrum ita esse oportet, vt parum alimenti simul sumat, numquam ventriculum oneret. Pestifera est ira, omnisque animi atque sanguinis commotio. Saepe alius ducenda est lotionibus, nec non Rhabarbaro, Apozemate ex Rhabarbaro, Tamarindis, Manna. Pedum refrigerium omni studio vitandum, eorum autem fricationes et pedilauia utilia sunt. Potior cura habenda est menstruorum et haemorrhoidum. Victus necessarius est tenuis et potio diluta.

tior, minime fermentata. Cibus optimus est ex iesculis, quae ex auena, hordeo, fagopyro parantur, nisi sanguis reiectus acorem spiret, vbi iuscula carniū meliora sunt. Numquam dari debet homini emeticum vel acre purgans. Plurimum proficiunt temperatiores aquae minerales, praefertim si morbus a catameniorum vitio ortus fuit. His etiam, nisi aliquid obstat, lac admisceri potest, praecipue vbi iam tabes imminere videtur. Cum cura et haec adhiberi debent, nec etiam his ventriculus impleatur, vel vomitus cieatur. Vrgente malo pedes, ratione supra exposita, deligari possunt.



VITIA MENSIVM.

§. 283.

Ab his saepius plures grauesque morbi, quibus foeminae consueant, nasci solent, et si haec aliis morbis, ex aliis causis profectis, obnoxiae fiunt, catameniorum vitia saepissime illis superuenire solent. Magnum tamen inter foeminas est discrimen, non solum quoad periodum, sed frequentius quoad sanguinis, qui singulis periodis excernitur, copiam. Illud cum aliis observatio docuit, sub coelo frigido puellis iunioribus aliquando, decimum vel duodecimum aetatis annum agentibus, prouenire catamenia. In locis vero septentrionalibus hoc tardius etiam adolefcentibus euenire. Apud nos decimo quarto aetatis anno sanguis plerumque fluere incipit, et quadragesimo octauo circiter definit. In omnibus oportet medentem considerare corporis habitum, consuetudinem aliaque, vt scire possit, quid secundum naturam fiat, et quid praeter naturam sit, atque morbum significet. Puellae autem non raro aegrotant, quibus solito tempore menstrua non proueniunt. Nam si illae sine hoc profluvio recte valent, nihil tentandum est.

Con-

Conqueruntur de languore, humborum artuumque dolore, respiratione impedita, palpitatione cordis, ventriculi inflatione, nausea, ventris torminibus, insomniis. Facies fit pallida, oculi obscuri fiunt, urina est tenuis, vel cruda et turbida, et tandem si morbus ingrauescit, praesertim si is medicamentorum ingluvie oppugnatus fuit, nausea, aliis morbis, fluore albo, chlorosi, cacochymia, cachexia, imo et hydrope infestantur, quae deinde mortis periculum ostendunt.

§. 284.

Frequens hoc vitium est plethoricis, et quae pleniori victu vsae corpus non exercent, nec non aliis, quibus ante tempus catamenia medicamentis sic dictis emmenagogis mota fuerunt, quale praematurum profluvium plerumque pertinacior obstructio sequitur. Nam tum a plethora, tum a sanguinis defectu mensium vitia oriri, usus docuit. Non parum conferunt occulta Veneris desideria, amor et moeror. Ex ceteris causis potiores sunt ingluvies, vel, qua nonnumquam laborant, Pica, et si puellae ventriculum valentioribus alimentis, pane calido, similibusque glutinosis vel alienis, creta, carbonibus, onerant. Acida etiam, veluti acetaria, fermentescencia, aromata, idem efficiunt. Tanto magis haec nocent, si vel imminentibus, vel fluctantibus catameniiis sumuntur. Pedum et genitalium refrigeria, otium torpidum, parcior potus, vita sedentaria, maxime si varium opus perficientes corpus inclinant et abdomen comprimunt, causis accenseri debent. Multum etiam nocent arctiores, quibus amictuntur, thoraces. Raro puellae atretae sunt, quibus scalpelli opera necessaria est, de quo vitio Chirurgia videnda est. Mala etiam esse potest ipsius uteri conformatio.

§. 285.

Curatio causis accommodanda est. Nam medicamentis emmenagogis sine discrimine datis et spes frustratur, et morbus pertinacior redditur, ut etiam plura alia incom-

moda ex iis nascantur, Nec semper proficiunt sanguinis missiones, quibus etiam puellae, propter alibi dicta (§. 265.), non tam cito aduesieri debent. Praecipue nocet sanguinis praematura detractio corporibus tenuioribus, imbecillis et simul raris. Animus ad ipsa, quibus puella vexatur, symptomata aduertendus est. Nam quae e catameniorum moliminibus proficiuntur, plerumque certo tempore exasperantur reuertunturque. Et illo potissimum tempore aliquid moliri potest Medicus. Si enim illo tempore vehementior sanguinis motus est, et quasi quaedam febricula, cum lumborum et capitis dolore, abstinencia et quiete opus est, Medicamenta cum his vel nulla danda sunt, vel pauca et non alia, quam temperantia, veluti pulueres ex arcano duplicato, nitro, conchis citratis. Si vero puella phlegmatica est, et illa non tam febricula auctoque aestu, quam spasmis vexatur, conueniunt Pilulae Becheri. Nec in his aliena sunt sic dicta emmenagoga, Essentia Absynthii, Pimpinellae albae, Vincetoxici, Corticum aurantium, Myrrhae, Croci; Elixir proprietatis, Elixir vterinum Crollii et similia. Non nimium tamen his calidis insistendum est, et necesse est prius repurgatas esse primas vias. Illo tempore adhiberi possunt frictiones pedum cum lintheis asperioribus, pediluua, fatus genitalibus admissi, et alia, quibus sanguis ad inferiora et genitalia euocatur.

§. 286.

Postquam vero omnia conqueuerunt, tunc, quamuis menstrua non prouenerunt, non medicamentis pugnandum, sed abstinencia vtendum est, et corporis moderata exercitatione, donec post quartam hebdomadem iterum illa symptomata sentiat aegra. Vbi autem ex aliis intelligitur, lentos viscidosque esse humores, vel pituitam in ventriculum et duodenum esse contractam, proficiunt infusa, alibi laudata, per epicrasin purgantia, quae parari possunt ex radice Aristolochiae, Angelicae, Gentianae rubrae, Ari-
Cypero rotundi, Pimpinellae albae; ex herbis Matricariae,
Melissae,

Melissæ, Menthae, Rutae, Abrotani, Sabinae, Rosmarini; summitatibus Centaurii minoris, et Absynthii; semine Foeniculi, Anisi, Carui, baccis Juniperi; cortice Winterano, Aurantiorum, addito Rhabbarbaro, Senna, fibris Ellebori nigri, vel Agarico in petia ligato. Sedulo tamen prospiciendum, ne his valentioribus utamur in foeminis imbecillis et valde teneris, quibus maior sanguinis mobilitas est. His proficiunt aquae minerales et acidulae, quibus etiam lac admisceri potest. Interdum dari possunt cum his diluentibus Pilulae Stahlî. Plurimum proficiunt Thermae Carolinae. Aliis, quibus corpus valde rarum et partium solidarum magna imbecillitas et atonia est, conveniunt interdum martialia, quae ideo emmenagogis adnumerantur: Tinctura Vitrioli Martis Ludouici, Tinctura Martis helleborata Wedelii, Tinctura Martis cum succo pomorum Borsdorffianorum, ipsa limatura martis. Haec aliena sunt, ubi fibrae rigidae sunt, sanguis abundat, vel ubi corpus vitiato humore abundat. Plurimum vero proficiunt, si post graues haemorrhagias menstrua deficiunt, corpus autem prius iurulentis diluentibusque impletum fuit. His omnibus accommodandus victus est, ut eo tempore, quo molimina percipiuntur, puella ab omnibus, quae ventriculum onerare vel offendere et spasmos excitare possunt, abstineat. Plurimum etiam confert corporis exercitatio, praecipue saltatio. Pessimum vitium est mala conformatio vteri.

MENSIVM SUPPRESSIO.

S. 287.

Catamenia naturaliter nec gravidis, nec lactantibus pro-
ueniunt; nec tamen hoc perpetuum est. Etiam post
partum, post magnas euacuationes et venae sectionem, post

K 5


diutur-

diuturnos morbos, interdum catamenia per plures hebdomades desiderantur. Nec semper, si menstrua deficiunt, propterea mulier aegrotat. Saepe sine his satis bene valent foeminae, quae vlcera chronica, praesertim in cruribus, habent. Nec in his quicquam molendum est. Verae autem suppressionis causae variae sunt, quibus aptanda curatio est. Si oritur a defectu humorum, tolerari debet, et dandus est victus laudabilis, inalentus, praecipue iuscula cum herbis recentibus et radicibus Apii, Petroselinii, Cichorei et similibus decocta. In nonnullis vero Plethora est sine cacochymia, id quod ex Plethorae signis et corporis habitu intelligitur. His proficit sanguinis missio ex talo, quae medio, inter duas mensium periodos, tempore suscipienda est. Simul alius lenioribus ducatur, veluti Tamarindis, Passulis, Manna, Cremore Tartari, foliis Sennae. Cum his pulveres ex nitro, arcano duplicato, conchis cum acido citri praeparatis, conveniunt. Plerumque nihil magis proficit, quam potus diluens aquosus, aquae minerales, quae etiam potioni praestari queunt. Eadem medendi ratio quandoque necessaria est foeminis valde robustis et exercitatis, et quae corpore adstricto sunt, quibus sanguis propter nimium solidorum robur et exercitationem valde coactus est. Etiam his multum proficiunt balnea ex aqua dulci, vel ex decocto emollientium, quae minime calida esse oportet. Quibus humores visciidi sunt et lenti, quae colore pallido sunt, quae corpus satis non exercent, somno indulgent, et quibus pulsus debilis est, iis conducunt emmenagoga. Praemitti debent purgationes ex massa Pilularum de Succino Cratonis, Extracto panchymagogo Crollii, Mercurio dulci, Resina Jalappae, Diagrydio. Deinde dari debent infusa vel decocta ex supra dictis emmenagogis (§. 286.), quorum decoctorum aliquot unciae bis per diem epotari, ante cubitum vero sumi possunt Pilulae Stahlī. Optime his proficiunt Infusa per epicrasin laxantia. In his omnibus vero curationibus duo potissimum notanda sunt, ut primo semper a lenioribus incipiamus, et ut omnia accommodemus periodo men-

menstruorum. Quare, si quid molendum est, illud potissimum eo tempore, quo catamenia fluere solita erant, fieri oportet. Plurimum proficit, praesertim in corporibus pituita redundantibus, corporis exercitatio et frictio pedum cum linteis calidis. Multi etiam usus sunt pediluvia.

§. 288.

Si catamenia subito terrore fuerunt repressa, quandoque vehementiora symptomata oriuntur. Si haec vehementer urgent, venaesectio necessaria est in pede et frictio pedum. Dari debent antispasmodica, nitrum, cinnabaris, et cum his Pilulae istae (§. 287.). Optime Pilularum scrupulus, cum nitri granis decem, soluitur in vino vel aqua mellissae et protinus aegrae propinatur. Multum iuuant pedum frictiones et pediluvia. Interdum, si accidit passio hysterica, proficit opiatum, Laudanum liquidum Sydenhamii ad guttas x. xv. vel Laudanum opiatum, cuius gr. j. commodè admiscetur illis pilulis, quibus etiam adduci potest Extractum Castorei. Nam opiata etiam emmenagoga esse possunt, si menstrua a concitatoribus spasminis supprimuntur. Si ex frigore catamenia repressa fuerunt, adhibenda sunt pediluvia, immo semicupia et balnea, cum frictione partium inferiorum; si vehementiora urgent symptomata, quandoque necessaria est venaesectio.



MENSTRVA NON BONI COLORIS.

§. 289.

Non aliam fere curationem postulant catamenia, quae non boni coloris sunt. Si sanguis, qui excernitur, nigricans est, et fere adustus, metuendum est, ne sanguinis crassitudo et illa diathesis oriatur, quam vulgo ad atram bilem

lem referunt. Plerumque ex parciore potu nascitur. Di-
luentia imperanda sunt, atque egregie proficiunt aquae mi-
nerales, quae quum variae sint, corporibus, quorum di-
uersus admodum habitus est, accommodari oportet. Vbi
vero sanguis pallidus est, et pituita abundat, videndum,
num fluor albus accedat, de quo seorsim dicendum est.
Saepissime a spastica contractione vteri non sincerus, sed di-
lutior sanguis et pallidus profluit, vbi adhibenda, quae spas-
mos atque horum causas tollunt. Non paucis proficiunt
balnea, fomenta genitalibus admissa, et alia iam supra propo-
sita. Interdum spasmi oriuntur a ventriculo, quem pituita
vel alia mala materia infestauit, vel foemina hysterico mor-
bo obnoxia est. Si vero sanguis pituita abundat, profi-
ciunt illa infusa per epicrasin laxantia, Thermae et Acidu-
lae valentiores diu potandae, cum subinde datis Pilulis Stah-
lianis. Thermae etiam extrinsecus adhibitae, veluti Toe-
plices, et si harum copia non datur, balnea ex aqua
fluuiatili, multum prodesse solent, potissimum post finitum
aquarum mineralium potum. Omnibus accommodandus est
victus, et caueant sibi foeminae, ne tempore, quo catame-
nia instant vel proueniunt, ventriculum onerent, quo tem-
pore etiam alia, quae in rerum non-naturalium usu com-
mitti solent, prae ceteris animi perturbationes, magnam
nocendi potestatem habent.



SANGVINIS NIMIUM PROFLVIVM MENSTRVVM.

§. 290.


Raro menstrua modum excedunt. Nam multa differen-
tia inter foeminas est, et pluribus, quibus viscera
integra sunt, singulis mensibus magna vis sanguinis cum eu-
phoria profluit. In his, si sanguis supprimitur, maiora pe-
ricula

ricula oriri necesse est. Igitur non semper fides habenda foeminis, quibus hoc profluuium molestum est, et saepe de eo vt nimio conqueruntur. Considerari debet corporis habitus, et num profusionem sequatur imbecillitas vel alius morbus. Nec ignorari potest, post suppressa per aliquot menses catamenia, id quod post partum aliasque occasiones fieri solet, saepe sanguinem copiosiore fluere, et hoc etiam tolerandum esse. Si vero sanguis cum impetu erumpit, atque ex hac profusione periculum imminet, vel si, hoc profluuium per plures dies perseverante, foemina valde debilitatur, videndae sunt causae. Id enim quandoque oritur a vini iunioris et metacioris abusu, a victu aromatico, a vehementi corporis exercitatione, ab iracundia, terrore, ab abusu emmenagogorum calidorum. Pessimum est, si vel in ipso vtero, vel in aliis visceribus abdominis, qua parte vel tumor, vel scirrhus est, et ob hunc humorum circuitus turbatur. Scirrhus vteri ex frequentioribus causis est. Ex hac profusione metus oritur cacoehymiae, cachexiae, hydropis et haemorrhagiae.

§. 291.

Etiam aduersus hoc profluuium proficiunt temperantia, non raro nocent adstringentia. Si foeminae id metuunt, ante catameniorum periodum aluus liberanda est lotionibus emollientibus fere frigidis, aqua etiam simplici, addito nitro, in aluum immissa. Praeter enemata aluus etiam, antequam catamenia proueniunt, duci potest Apozemate ex decocto Tamarindorum, Passularum minorum, Manna, Cremore Tartari. Cum his dari possunt pulueres temperantes ex nitro et coralliis, atque cum his alibi propositae emulsiones cum nitro. Si foemina valde plena et plethorica est, paucus sanguis ex brachio detrahi potest. Ante omnia necessaria est quies, et aegra supina iaceat in lectulo, coxis elatioribus, ita, vt eam nec lux, nec strepitus, nec nimius calor offendere possit. Animi tranquillitas valde necessaria est. Sunt, qui hoc casu Pilulas Becheri plurimum extol-

extollunt, quae interdum salubres sunt, si haemorrhagia oritur a retenta aliqua parte placentae in praegresso partu vel abortu, et si intestinum rectum fecibus repletum est; sed alia cecoprotica tutiora sunt. Interdum his foeminis, quibus tales profusiones frequentiores sunt, hectica imminere videtur. His sollicite imperanda est quies, aptusque victus et regimen. Necessse est, ut tales per longum tempus lac asininum, vel solum, vel cum aqua Selterana potent, cum quibus possunt balneis uti frigidioribus ex lacte. Plurimum foeminis nocent thoraces aliaeque vestes adstrictiores. Si ventriculus id tolerare potest, potioni praestanda est aqua frigida fontana. Tempore vero, quo sanguis cum impetu effertur, bibat foemina decoctum Tartari crudi cum succo citri. Ceterum ea seruanda sunt, quae dicta fuerunt de haemorrhagia in genere.



A B O R T V S.

§. 292.

In hoc etiam maximum periculum est ex sanguinis profusione. Dicitur vero abortus exclusio foetus nondum maturi, per spasmos uteri et musculorum abdominalium, quibus spasminis diducitur ab utero placenta, et aperitur orificium internum uteri. Auulsa placenta, ex dilatatis uteri vasculis sanguis cum impetu profluit, quae profusio vix supprimitur, antequam excluso partu uterus contrahi potest. Foemina abortum fecisse dicitur ab altero circiter gestationis mense ad finem sexti usque mensis. Vltimis mensibus partus praecox adpellatur. Quum menstrua etiam interdum in gravidis proveniant, necesse est, eorum profusum ab ea profusione distingui, quae in abortu fieri solet. Discrimen vero est in modo ipsius sanguinis, in causa et periodo menstrua. Abortus fieri solet cum doloribus, qui similes sunt

sunt iis, qui in partu sunt. Praeter haec menstrua grauidarum ex vagina proueniunt, non ex vtero, quum os vteri his fluentibus clausum sit, quod, vbi abortus imminet, aperitur. Hoc vero manus obstetricia tactu experiri potest. Ceteroquin abortum imminere ostendunt dolores vagi in abdomine, et illae etiam notae, quae partum in vtero obfusse ostendunt. Nam mortuus partus interdum per plures dies atque etiam hebdomadas in vtero relinquitur. Sunt illae notae, insolitum pondus, quod etiam mutato situ voluitur, languor, facies lurida, mammarum macies et extenuatio, et si foemina nullum foetus motum percipit, et aliquando inhorret. Ipse abortus, seu illud, quod ex vtero eiicitur, aliquando molam repraesentare potest. Nam subinde accidit, vt carnosae eiusmodi moles excludatur, quae vero intus embryonem continet, id quod incidere potest, si sanguis, ex minore parte auulsae placentae fluens, vteri se contrahentis pressione densatur atque coagitatur. A secundo ad quartum vsque mensem abortus frequentiores esse, experimentis compertum est.

§. 293.

Quod ad causas attinet, deprehendimus abortum frequentiores esse foeminis imbecillis, plethoricis, hysteris, gulae, Veneri aliisque voluptatibus deditis, vel animo concitatoribus. Quidquid igitur in his vel ipsum vterum, vel musculos abdominis, vel genus aëruosum in vniuerso corpore, et maxime neruum intercostalem in abdomine vehementer irritat, illud abortui occasionem dare potest. Igitur abortus fit ex terrore, ira, aliisque vehementioribus animi perturbationibus, ex plethora, praesertim si illa commota est, ex alui obstructione diuturna, quoniam vterus, intestino recto iacumbens, hoc male affecto etiam irritatur. Idem accidit ex medicamentis purgantibus acrioribus, dysenteria, diarrhoea, praeterea ex abusu medicamentorum calidorum, eorum etiam, quae aliquando aduersus abortum laudantur, quibus omnibus sanguis vehementius

mentius cietur. Abortus etiam contingit, si abdomen valde premitur, vel thoracibus arctioribus vestitur, praecipue si foeminae cum his altioribus calceamentis incedunt, et si abdomen casu ab alto, ictu illato, aliisque externis iniuriis laeditur, vel si corpus vomitu, saltatione, saltu, sternutatione, tussi, clamore, unctione super loca asperiora, aliisque vehementius concutitur, si corpus repente inclinatur, vel brachium nimium extenditur. Accidit hoc etiam ex fortiori nixu, dum pondus tollunt, vel alium siccam deponunt, nec non ex aliis morbis, ex febris acutis vel intermittentibus, ex haemorrhagia, vel casu, vel ex vulnere orta, ex defectu virium et nephritide, colica et similibus, nec non ex venenis. Foeminae aetate protractiores aequae ac valde iuniores huic malo obnoxiae sunt. Priorae propter fibrarum omnium rigiditatem, reliquae propter imbecillitatem. Sic etiam valde tenuae aequae ac valde obesae, si vtero gerunt, periclitantur. Nec ignorari oportet, foeminas, quae semel abortum passae sunt, eidem iisdem ferre mensibus obnoxias fieri. Saepe aliquid conferre potest umbilici breuitas, et si is circa caput foetus vel aliquod eius membrum circumuolutus est.

§. 294.

Numquam sine periculo est abortus, maximus tamen metus est propter sanguinis profusionem, Optime is auertitur, si illae occasiones, de quibus mox dixi (§. 293.), vitantur, si plethoricis medio gestationis tempore, immo etiam, si id necessarium videtur, ante hoc tempus sanguis mittitur, et si alius frequentius Rhabbarbaro et Manna ducitur. — Multum etiam proficit, cum victu idoneo, quotidiana et corpori accommodata exercitatio.

§. 295.

Si vero abortus imminet, et aegra spasticos dolores, cum his vero adhuc ipsius partus motum sentit, atque sanguis ex genitalibus effertur, protinus imperanda est quies. Iaceat supina, coxis elatioribus, ita tamen, ut nec ex hoc situ, nec

nec ex nimio calore incommodum sentiat. Si valde plethorica est, et non nisi paucus sanguis effertur, vel etiam si vehementior animi et corporis commotio praecessit, mox mittendus est sanguis ex brachio. Quantitas mittendi sanguinis ex ipsius aegrae habitu et sanguinis per genitalia profluio aestimari debet. In aluum immitti potest, praecipue si illa adstricta fuit, lac, vel decoctum emolliens, lenne, tepidum, frigidum potius, quam nimis calidum, addito paucio nitro, saccharo, vel melle, et oleo leniente. Cum his dari possunt pulveres temperantes atque tonici. Potioni praestanda est ptisana ex hordeo vel decocto Tartari cum succo Citri, nec non cum gelatinis, quibus admixti sunt succi acidi; vehementiora vero adstringentia fere aliena sunt. Vbi his sanguinis profluuium conquieuit, dari debent iuscula cum acetosa vel succo Citri, quae ea ratione offerenda sunt, ac alibi dixi (§. 136. 186. 190.). Per plures vero dies quies et regimen necessaria sunt. Non vero sanguis fluere desinit, si is coactus os vteri internum praecludit, qui vero mox cum impetu iterum erumpit, quare quietem diutius seruari necesse est. Si cum magno periculo ruit sanguis, etiam artus ea ratione, quam supra proposuimus, deligari possunt. Nec etiam alienum est epithemata frigida, aceto vel oxycrato madefacta, lumbis et inguinibus imponi, quae vbi incaluerunt, remoueri oportet.

§. 296.

Si vero foetum mortuum esse quaedam indicia significant, maxime, si foemina ante haemorrhagiam inhorruit, si abdomen mutatum est, et quasi pendulum factum, si aegra ab aliquo tempore non infantis motum, sed pondus quoddam in abdomine sentit, si mammae emacuerunt, cum colore faciei lurido, tunc potius allaborandum est, ut foetus excludatur, quare ea, quae in partu fiunt, fieri debent; aduersus profusionem sanguinis vero sola temperantia adhibenda sunt.

L

§. 297.

§. 297.

Est aliud genus haemorrhagiae, quod quandoque cum partu maturo accidere potest. Sanguis maximo cum impetu ex vtero effertur, antequam foetus os internum occupat. Oritur haec vel ab auulsa placenta, id quod ex omnibus illis causis, ex quibus abortum fieri posse diximus (§. 292.), accidere potest, vel foetus umbilico irretitus, dum descendit, placenta deducit. Inter rariores casus est, si placenta non vteri fundo, sed eius ori interno inhaerescit, et dum os vteri internum spasmus ampliatur, diducitur, dilaceratur atque sanguinem fundit. Hoc ultimum tactu cognoscere potest manus obstetricia, si, dum sanguis cum impetu et periculo ruit, digito nec foetus, nec eius humore distenta et aquis turgida membrana, sed corpus aliquod molle rarumque, quale placenta esse nouimus, occurrit. In hoc casu, qui fere desperatus est, nihil proficiunt medicamenta, et minime distans curatio, per manus obstetricis operam, requiritur. Demittenda protinus est manus, perrumpenda etiam placenta ipsaque, qua partus comprehenditur, membrana, et is conquisitis pedibus extrahendus est. Si etiam os vteri apertum non est, illud vi aperiri oportet, inserto vnctae manus digito indice; et demissis post etiam aliis digitis, donec tota manus intus esse possit. Etiam dum sic digitis afficitur irritaturque os vteri internum, spasmi excitantur, quibus illud aperitur, exclusio etiam iuuatur acceleraturque.



LOCHIORVM FLVXVS.

§. 298.

Lochiorum nomine significatur ille humor, qui post partum ex dilatatis vteri vasis, dum is si vterus se contrahit, et ad naturalem habitum reuertit, exprimitur. A primis

mis post partum diebus sanguis sincerus, ab initio multus, post vero paucus, tandem magis pallidus, et sub finem humor viscidus ac gelatinosus, male plerumque olens, profuit. Primo die post partum saepe sanguis per moram in vtero concretus excernitur, id quod in iis, quae olim partum iam ediderunt, continuatis vehementioribus doloribus (*Nachwehen*), fieri solet. Maxima tamen in foeminis varietas est. Nam, quibus menses abundantiores esse solent, iis etiam lochia diutius et maiori in copia profluunt. Quae vero in partu magna sanguinis profusione exhaustae sunt, illis lochia pauciora esse solent. Lochia etiam copiosa feruntur iis, quarum vtero placenta pertinacius inhaesit, et vi fuit auellenda. Necessè etiam est, ut Lochia magis fluant iis, quae lac reprimunt et infantem non alunt. Si recte exeunt lochia, sola quies necessaria est, et regimen; aliena sunt omnia medicamenta. Si vero sanguis cum periculo ruit, placentae pars in vtero relicta est, qua vterus impeditur, quo minus se contrahere possit. Medici igitur officium est, qui puerperae curam habet, ut diligenter inspicat secundam. Etiam lochia quandoque immoderatus fluunt foeminis tenuioribus valde imbecillis, viribus defectis, nec non aliis, quibus sub partu medicamenta cardiaca, vel alia ad ciendos dolores, data fuerunt, quae citius, quam par est, partum laboriosis nixibus adiuturæ, ex iis, vel etiam ex vino, quo se ingurgitarunt, incalescunt. Non parum conferunt animi pathemata, perturbationes, nimius calor, alui obstructio.

§. 299.

Si Medicus certus est, aliquid placentae in vtero relictum fuisse, et si vterus iam iterum contractus est, sanguis vero cum impetu et cum aliquo periculo fluit, seruanda est quies, danda sunt temperantia, et cum his Pilulae Stahlianæ. Dari etiam possunt decocta florum Chamomillae ex cereuisia, cum oleo amygdalarum dulcium recenti non rancido. Si alius sub partu non fuit soluta, ante omnia ad-

L 2

hiberi

hiberi debent lotiones ex decocto emollientium, vel aenae excorticatae, cui adiciatur oleum modo dictum cum pauco sale. Lotiones non calidas esse oportet, sed frigidiusculas. Omnia simul adhibenda, quae in urgente haemorrhagia praecepimus. Iterari possunt modo dictae Pilulae. Aliena sunt omnia valentiora pellentia, quae haemorrhagiam augent, vel vteri inflammationem relinquunt.

§. 300.

Longe frequentius incidit, ut lochia deficient, id quod tanto magis metuendum est, si hoc protinus post partum et repente a causa etiam repentina incidit. Hoc enim fieri potest ex partu difficili, si vterus manu obstetricia violatus, vel valde vexatus fuit, et ob id ille, et praecipue os internum, intumuit, vel si protinus post partum in vterum illapsus est aer frigidus. Nam sub partu, quam primum foemina foetum enixa est, genitalia linteo calido tegi debent. Etiam lochia sistuntur, si foemina debilis citius, quam par est, ex lectulo surgit, et genitalia aëri exponit. Plurimum etiam nocet, primis post partum diebus, potus frigidus et fermentescens, inprimis cereuisia et ipsum, quod sanguinem mouet et inflammationem excitat, vinum. Magnam nocendi facultatem habent etiam in hoc profluvio animi pathemata, prae ceteris terror atque ira. Ceteroquin plurimum confert plethora, et si plethoricis sanguis ante partum non fuit detractus. Saepe etiam hoc efficiunt varii generis medicamenta, quocumque sub titulo, vel in partu, vel post partum data. Fascia, qua abdomen post partum deligatur, si vel nimis adstricta est, vel nimis laxa, id efficere potest.

§. 301.

Ex lochiorum obstructione saepe maxima sequuntur pericula, dolores cum tensione abdominis, huiusque tumor et durities, alui obstructio, anxietas praecordiorum, languor, nausea, vomitus, animi deliquium, frequentissime etiam febris

febris continua et exanthematica, vteri inflammatio. Interdum relinquuntur morbi chronici, melancholia, phantasia corrupta, mania, &c. Saepe in vtero, si eius interior pars inflammata fuit, et inflammatio suppuratione finitur, manent vlcera, quae magis et magis cacoëthica fiunt, ex quibus post mala sanies sine intermissione effluit. Vterus etiam ex inflammatione scirrhusus fit; scirrhus vero non raro in verum carcinoma mutatur. Si lochiorum suppressionem spastici morbi sequuntur, illi tolerabiliores fiunt, quam si accedit febris, et vteri inflammatio, quae, si paullo profundior est, raro feliciter cedit.

§. 302.

Si lochiorum suppressio est sine febre, protinus danda sunt diluentia, quibus sanguis mobilior redditur, et vasa magis aperiuntur, sanguis vero concretus ex vtero expellitur. In hoc casu proficiunt illa iuscula tenuiora pullorum cum oleo amygdalarum dulcium, nec non decoctum florum Chamomillae, et alia similia. Cum his diluentibus dari possunt saepe laudatae Pilulae, vel quoque Apozemata laxantia ex decocto Rhabarbari, Cremoris Tartari, Tamarindorum. Euitentur dulcia; Manna, si adiicitur, oportet illam recentem esse. Si lochia fluere incipiunt, leniore stimulo opus est, veluti Essentia carminatiua cum liquore anodyno. Foeminis autem, quae corpore adstricto sunt, magis prosunt lubricantia, v. g. oleum amygdalarum dulcium cum iusculo calido. Si abdomen tumet et durum est, imponi potest cataplasma, quod componitur ex emollientibus, additis carminatiuis ex lacte decoctis. Vel parari possunt cataplasmata ex pane mellito (germanice *Pfefferkuchen*) cum aqua, addito paucio vino. Etiam conducunt olea emollientia, additis paucioribus carminatiuis. Omnia, quae imponuntur, nec calida, nec frigida esse oportet. Si, his omnibus frustra adhibitis, lochia non fluunt, sanguis mitti potest ex talo. Rarius reperiuntur foeminae, quibus naturale est, vt nulla vel pauca admodum lochia fluant.

§. 303.

Haec vero plerumque aliena sunt, si lochiorum defectus cum febre est, id quod pulsus et alia signa ostendunt. His profunt temperantia, potiuncula ex aquis destillatis Melissae, corticum Aurantiorum. Si mulier dulcia aduersatur, dari possunt pulueres ex lapidibus Cancrorum cum acido Citri, additis paucioribus granis nitri et cinnabaris, qui pulueres etiam sumi possunt ex aqua Melissae sine vino, et aqua corticum Aurantiorum. Cum his vero necessarium est, ut alius aperta sit, quare ducenda est clystere emolliente, vel leni aliquo supposito, veluti globulo moschato. Dari cum his debent diluentia, pitisana ex radice Scorzonerac, Hordeo excorticato, Avena excorticata, addito Syrupo corticum Aurantiorum. Si lochia fluere incipiunt, proficit infusum aquosum ex floribus Chamomillae, Chac-rephylli, corticibus Aurantiorum, semine Foeniculi, quibus sanguis coactus expellitur. Nec contemnendum est decoctum florum Chamomillae. Vbi febris se paullulum remisit et lochia fluunt, dari possunt Pilulae Stahlianac, addito nitro. Post aliquod tempus iis, quibus lochia non satis prouenerunt, dari potest infusum per epicrasin laxans.

§. 304.

Saepe multa controuersia est de sanguinis missione. Illa prodest, si foeminae plethoricae nullus sanguis ante partum fuit detractus, et si cum ipso partu non magnum fuit sanguinis profluuium. Maxime vero considerari debet tempus. Nam quae breui post partum saluberrima est, nocere potest, et mortem maturare, si iam febris inualuit. Nam vteri inflammatio soluitur vel catameniorum profluuium, vel orta in eius parte interiore suppuratione, vel facta metastasi, per purpuram in cute ortam. Si tardius mittitur sanguis, saepe turbatur et suppuratio et purpura. Sanguis, si is protinus post partum mittitur, plurimum pro viribus aegrae detrahi debet.

HAE.



HAEMORRHOIDVM

FLVXVS.

§. 305.

De Haemorrhoidibus multa inter Medicos controuersia est. Observatio docuit, iis fluentibus corpus a variis grauissimisque morbis tutum praestari, plures etiam magnos morbos iisdem solui; e contra vero, si haemorrhoides internis externisque reprimuntur, graues, immo funestas valetudines nasci. Sed tamen hoc non perpetuum est, et docente id etiam obseruatione, hoc profluuium non semper criticum, sed saepe symptomaticum esse solet, quod a fecibus induratis, in intestino recto haerentibus, a viscerum abdominis obstructione, et impedito sanguinis circuitu, a spasmis ortum, corpus imbecillum reddit et aliis morbis obnoxium, immo aegrum interdum celerius praecipitat.

§. 306.

Est vero haemorrhoidum magna diuersitas. Discrimen inter internas et externas docet Anatome. Arteriae enim haemorrhoidales internae oriuntur a mesaraica inferiori, et venae his respondentes pertinent in venam portae, quandoque in ramum sinistram seu splenicum, interdum in ipsam commissuram vel angulum. Arteriae haemorrhoidales externae oriuntur ex iliaca interna, quae alias epigastrica vocatur, quibus respondent venae, quae ideo ad venam cauam pertinent. Plerumque sanguis ex internis fertur, raro ex externis, quae vero longe frequentius, quam internae, intumescunt. Ex anatomicis repeti oportet, ex arteriis haemorrhoidalibus in intestini lacunis mucum secerni, quo aluus lubricatur. Vasa haemorrhoidalia, praecipue venae, multa mollique pinguedine comprehenduntur, quae, dum illae sanguine plenae intumescunt, iis cedit, et quae vaso-

L. 4

rum

rum tunicas multum laxat atque infirmat. Hoc, et situm corporis erectum, ac difficiliorem sanguinis per venas reditum consideranti, ratio apparet, cur haemorrhoidum tumores adeo frequentes sunt, et ex leui data occasione nascuntur. Nonnumquam, loco haemorrhoidum, albus tenaci-orque mucus ex internis excernitur cum leuamine. Vocant nonnulli *haemorrhoides albas*.

§. 307.

Salutares plerumque sunt haemorrhoides, quae anno circiter xxxmo fluere incipiunt. Si pueris proueniunt, plerumque adolescente aetate iterum conquiescunt et varias valetudines relinquunt. Salubriores sunt, quae certam periodum seruant, quam vagae. Illa vero periodus varia est. Nonnullis sexto quoque mense, aliis singulis mensibus recurrunt. Sunt, quibus hoc profluuium fere perpetuum est. Nec foeminae iis destituuntur, quibus frequentiores sunt coecae, quam fluentes. Prae ceteris eis obnoxiae fiunt grauidae et parturientes, quippe quibus ab vtero venae hypogastricae comprimuntur, et quibus sub vehementioribus in partu nixibus capitula venarum intumescunt. Pessimus est mos obstetricantium, si digito in anum demisso os coccygis deprimunt, vt partui exitus detur. Sic enim vexatum intestinum intumescit inflammaturque, in quo illae haemorrhoidales venae attolluntur, quae quasi capitula prominent et conspicuae fiunt. Quibusdam haemorrhoides cum catameniis fluunt, pluribus vero singulis mensibus post catamenia, nec non postquam catamenia per aetatem cessauerunt, hoc incidit. Ex viris haemorrhoidibus obnoxii sunt plethorici maxime, quibus sanguis ater crassusque est, ita, vt propterea is difficilius per abdominis viscera circuire possit. Plurimum confert vita sedentaria, hypochondriorum compressio, alius sicca, liberalior vini, praecipue recentis valentiorisque, potus, Veneris et aphrodisiacorum abusus, victus cum aromate, allio, cepis, purgantia, et ex his praeceteris aloë et elleborus, abusus Pilularum Becheri et
Stahlii,

Stahlii, frequens vsus diureticorum, ex quibus, et ex ipsa gonorrhoea maligna, praecipue si purgantibus curatur, saepe haemorrhoides coecae concitantur. Equites et Rhedarios, qui dum equo vel rheda vehuntur, valde succutuntur, haemorrhoidibus laborare, observatio docuit.

§. 308.

Quibus haemorrhoides criticae fluunt, illos oportet idem regimen seruare, quod foeminis, quibus menstrua proueniunt, necessarium est. Euitanda est omnis medicatio, abstinendum ab omnibus, quibus ventriculus onerari potest, vel sanguis citari. Nocent, cum Venere, animi perturbationes, extremorum refrigeria, vehementior exercitatio. Videndum, ut aluus libera sit, quae etiam lenioribus, Manna, Tamarindis et similibus, non vero aloëticis, solui debet.

§. 309.

Raro haemorrhoides sanguinem ita fundunt, ut ex profluuiio metus esse possit. Id vero magis ex aegri debilitate, quam sanguinis modo aestimari debet. Semper enim considerandus est in homine corporis habitus, victus, temperamentum. Si post diuturnas valetudines haemorrhoides proueniunt, etiam illud verum esse deprehenditur, nihil, quod paucum est, esse criticum. Tunc demum fluxus suspectus est, ubi magnam et indies crescentem imbecillitatem adfert, et si ex eo cachexia imminet. Si cachecticis fluere incipiunt, ab initio leuamen afferre videntur, breui vero aegrum sanguine et viribus exhauriunt. Nimia ex haemorrhoidibus profusio interdum deprehenditur in corporibus adstrictis, ex vini, Veneris, exercitationis, aloëticorum abusu, interdum ex pertinaciori alui obstructione.

§. 310.

Aequè periculosum est, haemorrhoides, ac menstrua, repente supprimi, quare et in hac haemorrhagia abstinentia et quies prae aliis omnibus proficiunt. Aluus si adstricta

L 5

est,

est, liberari debet a fecibus vel induratis, vel etiam acrioribus, medicamentis minus valentibus. Immittendae in aluum sunt lotiones ex lacte, in quo coquantur emollientia, addito vitello oui et oleo liliorum alborum recenti, minime rancido. Etiam conducunt Apozemata antiphlogistica. Vbi magna acrimonia est, et ex hac stimulus in intestino recto, dari potest Rhabarbarum in puluere, additis terreis et paucioribus granis nitri. Si aluus soluta fuit, dari possunt pulueres ex Coralliis cum acido Citri, Cornu Cerui vsto, lapide Manati, addito nitro. HOFFMANNVS extollit liquorem anodynum, quem vehiculo adiicit, quo hi pulueres excipiantur. Etiam experiri licet infusum aquosum ex Millefolio et Arnica. Clysteres tamen et infusa minime calida esse oportet. Vi-ctus ad haec componendus est, circumcidendum est omne vinum, omnisque potio valentior. Proficiunt aquae Selteranae, vel aqua fontana, decocta supra laudata ex furfure, hordeo excorticato. Cibus esse debet ex vegetabilibus acidiusculis, Cremore hordei, auena. Plerumque et in hoc casu optimum leuamen afferunt temperatiores aquae minerales cum lacte asinino, in qua tamen curatione diu et saepe per plures menses, atque diligentius obseruato regimine, perseuerandum est.

§. 311.

Frequentius accidit, vt haemorrhoides fluere solitae supprimantur, id quod non rarum est iunioribus, et quibus ante aetatem hoc profluuium contingit. Saepe etiam hoc accidit ex imbecillitate viscerum, et totius corporis, si homines, olim cum profluuiio robusti, vitam mutant, exercitationes, vel vini largiorem potionem omittunt, otio vel litterarum studio et vita sedentaria corpus imbecillum reddunt. Repente quandoque supprimuntur frigore, animi perturbatione, crapula, Venere. Etiam supprimuntur ex alio diuturno morbo, praecipue febre. Hoc si incidit, sequuntur plura mala, morbus hypochondriacus, viscerum infar-

infarctus et scirrhus, haemoptysis, vomitus cruentus, tussis, asthma, catarrhus suffocatiuus, cephalalgia pertinacior, vertigo, apoplexia, arthritis, nephritis, et plura alia morborum genera. Difficilius restituuntur, praecipue in corpore senescente, et quod olim robustum, post ex modo dictis aliisque causis infirmum redditum fuit. Obseruatione constat, plures, qui olim haemorrhoidibus obnoxii fuerunt, post has suppressas laborare sudoribus, quos tolerare et conuenienti regimine excipere, numquam reprimere, oportet.

§. 312.

Quum valde difficile sit haemorrhoides, praecipue infirmato corpore, restituere, non nimium in hac indicatione perseuerandum, sed potius incommoda, quae inde nascuntur, alia ratione leuanda sunt. Tanto magis hoc fieri debet, si malum iam inueteratum est, et ex eo morbi chronici orti sunt. Si vero haud ita pridem haemorrhoides suppressae sunt, si sine aliis cognitis causis lumborum dolor, intestini recti pruritus, et saepe ardoris sensus, vel etiam vasorum capitula, quae circa anum conspiciuntur, naturam hoc profluvium moliri manifestant, experienda sunt auxilia, quibus interdum haemorrhoidum fluxus reuocari potest. Est tamen quaedam differentia. In corpore phlegmatico dari possunt Pilulae Stahlianæ, addito gr. $\frac{1}{2}$ -ij extracti Hellebori. Illa tamen omittenda sunt, quam primum iis haemorrhoides externae excitantur, et venae intumescunt. Cum his Pilulis proficit Elixir Proprietatis sine acido, Essentia amara, Elixir stomachicum, aliaeque similes compositiones. Qui vero cholericus atque corpore adstricto sunt, iis sub ipsis illis moliminibus utiliora sunt temperantia, sales praecipue digestiui non admodum terendi, sed qui grosso modo puluerisati deglutiri debent. Cum his pulueribus dari interdum possunt saepe commemoratae Pilulae. Id vero praestantius est, si cum his Pilulis potantur aquae minerales paullo valentiores, praecipue Pyrmontanae et Egranae, pro imbecillis Schwalbacenses. Potioni quotidianae praestanda est

est aqua fontana, aqua Selterana, ptisana ex hordeo, ex radice Chinae, Graminis, Cichorei. Victus etiam ad omnia accommodandus est.

§. 313.

De Venae sectione ita existimo, illam necessariam esse, si, repente cohibitis haemorrhoidibus, varia incommoda nascuntur, nec non, si corpus robustum est et sanguine valde abundat. Multum vero nocet corpori imbecillo, etiam cacochymia laboranti. Nec facile sanguis mittendus est eo tempore, quo aeger molimina sentit, nisi hoc propter metuendam inflammationem in haemorrhoidibus coecis summè necessarium videatur. Ceteroquin omnis curatio accommodanda est periodo, si olim haemorrhoides talem seruauerunt. In corporibus valde infirmis, raris, tenuioribus, saepe profunt tonica, maxime praesentibus iam moliminibus. Igitur dari possunt Tinctura martis Ludouici, vel Crocus martis antimoniat, qui Pilulis adiicitur. Etiam praemissis aquis mineralibus, et adhibitis tum in victu, tum ex medicamentorum numero iis, a quibus partes solidae nouum robur accipiunt, veluti infusum corticis Peruuiani cum Limatura martis. Multum etiam in his hominibus profuit cortex Peruuianus cum Conserua viscerali. Magnum vero praesidium est in hirudinibus extrinsecus adinouendis. Corporis exercitatio, praecipue equitatio, valde utilis est. Non prorsus negligi debent fomenta, frictiones tum ipsius loci affecti, tum pedum, et pediluua. In omnibus his curationibus non nimis properandum est.

§. 314.

Haemorrhoides coecae, quae acerbissimos dolores affe-
runt, a nonnullis diuiduntur in turgentes et tumentes. In
prioribus tumor est sine magno dolore. Tumentes pro-
prie sunt coecae, quae cum inflammatione et intolerabili
dolore esse solent. Est genus furunculi. Non ex solis cri-
tici profluuii moliminibus oriuntur coecae, sed non raro ex
morbis

morbis venereis, gonorrhoea maligna, inueterata, et diureticorum abusu, pertinaci alui obstructione, ex abusu vini valentioris recentis, ex vlcere et calculo vesicae, equitatione et uestione in rheda. Saepe iis etiam vexantur grauidae, et post partum puerperae. Nonnumquam in fistulam degenerant, si tumor pus alere et in abscessum mutari incipit. Hoc et infinita mala nascuntur. Non confundi cum hoc aliud vitium debet, vbi scilicet intestinum relaxatum descendit, quod non prius dolet, nec tumet, quam vbi, dum aluus deponitur, illud foras pellitur et a sphinctere stringitur. Haemorrhoides enim coecae pedetentim et non raro intus intumescunt, et tunc protinus dolent.

§. 315.

Etiam in hoc casu medendi via a causae notitia trahenda est. Venereis succurrendum est adhibito Mercurio, non facile medicamentorum antiuenericorum calidorum et sanguinem cientium, nec acriorum purgantium vlu. Quibus sanguis spissior est, his opitulatur potus diluens. Interdum necessaria est sanguinis missio. Prae ceteris aluus semper libera sit et soluta, quae vero non aliis, quam lenissimis, duci debet. Optimum est decoctum Tamarindorum, Passularum et Mannae. Tale decoctum saepe etiam puerperis in hoc casu profuit. Vbi malum inueteratum, etiam adhibendae sunt aquae minerales temperatiores, et si reliqua id desiderare videntur, cum his lac asinum. Acidulae Schwalbacenses et Spadanae aliis fere praeferrī debent.

§. 316.

Remedia externa docet Chirurgia. Aliena sunt omnia reprimētia et discutientia. Pestifera vero spirituosā, maxime alcohol cum Camphora. Optime conducunt epithēmata ex decocto emollientium, vel cum lacte, vel cum aqua, quae parti dolenti superhabentur. Sedulo autem curandum est, ne illa humida sint, nec etiam frigida. Domesticum auxilium est puls ex auena excorticata. Cum his
in

in aluum, quae prius liberanda est, immitti debet leniens, idque recens oleum, v. g. Liliorum alborum, Verbasci. Si quaedam acrimonia in intestino est, his oleis circiter sexta pars vnguenti de Linaria admisceri solet.



MICTVS CRVENTVS.

§. 317.

Est, vbi sanguis cum vrina excernitur. Fluentibus catamenii sanguinem vrinae admisceri naturale est. Vrina crassa, rufa vel nigra, et cui multa bilis admixta est, opinionem sanguinis facere potest. Huius rei vero certior nota est, si calida adfunditur, qua vrina diluitur. Sanguis vero, si admixtus est, concretus, carunculas quasdam aut quasi capillos repraesentat. Si ex renibus sanguis fertur, is cum vrina intime permixtus est, vt in ea parum vel nihil, praeter illos concretos capillos, conspiciatur. Si vero sanguis ex venis in vesicam perrumpit, is in hac concrefcit, qui post haud fluidus, sed sub cruciatibus vehementiorique nixu exprimitur. Aliquando is sic concretus et per vrethram expressus opinionem lumbricorum fecit. Si concretum aliquid ex sanguine intus in vesica se opponit, id vrinam reddi naturaliter prohibet. Vesica tunc distenditur, et circa pubem interiores partes dolent, vbi etiam tumor extrinsecus tactu sentitur. Paucum admodum sanguinem trahit interdum vrina in febribus malignis, id quod a sanguinis resolutione profectum, signum malum esse supra retulimus. Si vitium in vesica est, in vrina non cruenta solum, sed saepe etiam purulenta subsidunt. Mictum cruentum, qui ex renibus prouenit, antecedunt comitanturque vehementes lumborum dolores, spasmi, tormina, ischuria, frequens mingendi et aluum deponendi cupiditas, vel vtriusque sphincteris, tum vesicae, tum ani, tenesmus. Interdum tamen ex renibus

renibus valde relaxatis sanguinis et urinae mixtura sine ullo dolore.

§. 318.

Varia horum morborum occasio est. In renibus interdum hoc sanguinis profluuium incidere potest per diaeresin, ex vulnere ictuue, quibus illi extrinsecus offendi possunt. Alibi dictum est, Cantharides, Millepedes, aliaque valentiora diuretica sanguinem cum urina mouere. Frequentius vero hoc fit per anastomosin in hominibus infirmis, et quorum corpora rara sunt ac resoluta, qui vero cum his pleni sunt et sanguine abundant. Plurimum confert abusus emollientium, oleosorum, diureticorum atque si aeger equitando alioque motu, quo corpus concutitur, sanguinem ad renes euocauit. Nocent etiam his vestimenta arctiora, quibus abdomen multum comprimitur. Ex frequentioribus causis est calculus asperior in rene haerens. Hoc si incidit, illas huius rei notas habemus, quae supra occasione Nephritidis fuere propositae. Ex his primae sunt et reliquis certiores, lumborum dolor, stupor pedis, et in viris stupor dolorque testiculi in adfecto latere. Si a repressis haemorrhoidibus sanguinis mictus oritur, is illis temporibus recurrit, quibus olim haemorrhoides fluere solitae fuerant. Observatione cognitum est, arthriticis, podagricis et chiragricis interdum sanguinem ex renibus crumpere, praesertim illi articulorum dolores, si reuertuntur, mictum cruentum leuant.

§. 319.

Senibus prae ceteris hoc frequens est, ut illis sanguis in vesicam destillet, maxime, si his haemorrhoides, olim fluere solitae, suppressae sint. Hoc profluuium, si diu manet, et si multum sanguinis cum urina redditur, vel ubi haec sanguinis profusio perpetua est, et se haud remittit, tandem aegri exhauriuntur, ut senes, quibus semper maius imminet periculum, marasmo, alii tabe consumantur. Minus malum est, ubi a causa manifesta ortum fuit, et quod breui iterum conquiescit.

§. 320.

§. 320.

Curatio illius vitii, vbi sanguis ex renibus profluit, quietem, abstinenciam, multamque medentis moderationem exigit. Aliena sunt, quae a pluribus extolluntur, adstringentia, vt et acriora et calidiora balsamica. Si id res et corporis habitus postulare videntur, sanguis mittendus est ex brachio, id quod magis necessarium est, si morbus recens et ex ictu casuque ortus est. Illis etiam sanguis detrahendus est, qui, sanguinis missionibus olim adsueta, eas neglexerunt. Cum his alius soluenda est enemate, quod nec calidum esse oportet, nec acre. Dari possunt emulsiones dilutiores cum nitro et diacodio Montani. Vbi autem renes ab acri diuretico, veluti cantharidibus, arrosi sunt, vel vbi ab asperiori calculo conuulnerantur, alia etiam lubricantia vtilia sunt: decoctum auenae excorticatae, oleum Amygdalarum dulcium, quod cum iusculo dari, vel vitello oui excipi et emulsionibus adiici potest. Si autem malum pertinax est, conueniunt lac asininum vel caprinum cum aquis Selteranis, serum lactis dulce, et alia huius generis remedia, quibus renes eluuntur, et ab inhaerentibus calculis ac sabulo liberantur.

§. 321.

Vbi autem renes relaxati sunt, et sanguis sine intermissione profluit, vel vbi is conquiescit, sed nihilominus ex leui corporis et animi commotione iterum erumpit, vitium, praecipue in senibus et quibus malus corporis habitus est, difficiliter tollitur. Aliena sunt valentiora emollientia, et si adstringentia adhibemus, in renibus concitatur inflammatio et a coacto sanguine ischuria. Sunt, qui extollunt decoctum Equiseti et Vrticae minoris. Experiri possumus serum lactis chalybeatum, seu in quo ferrum candens fuit extinctum. Quies imperanda est et abstinencia; his enim neglectis nihil profunt medicamenta. Cibus sit mollis et ex minus valenti materia: iuscula ex auena et hordeo, lac, puliculae ex lacte et amygdalis vel castaneis, addito pauco saccharo,

faccharo, conueniunt. Nocent omnia acria et calida. Potioni praestandum est decoctum Scorzonerae, Hordei, Cornu Cerui, Glycyrrhizae. Extrinsecus admoueri possunt epithemata adstringentia, quae commode ex vino rubro, vel ex oxycrato coquuntur. Nonnumquam in viris, quibus olim haemorrhoides sanguinem fundere solitae sunt, malum auertitur, si ano admouentur hirudines. Tandem illud ignorari non debet, inter rarissimas obseruationes esse, quod apud SCHENKIVM atque HILDANVM refertur, pleuritidem nempe, aliosque morbos, mictu cruento critico fuisse solutos.

§. 322.

Si sanguis ex vesica excernitur, id praecipue, si vitium certis temporibus reuertitur, non adeo magnum metum facit. Multum tamen exasperari potest mala medicatione. Sanguis mittendus ex brachio, alius liberanda est lenioribus, dari debent temperantia, pulueres ex Coralliis, Cornu Cerui vsto, lapidibus Cancrorum, cum acido Citri, pauco nitro. Potioni praestanda est ptisana, vel decoctum radices Chinae atque Graminis. Quies et omnia reliqua, quae supra praecepimus, hic necessaria sunt. Proficiunt hirudines.

§. 323.

Asperius vero malum est, si sanguis concretus se intus in vesica opponit, et vrinam naturaliter reddi prohibet, ita, vt ischuria oriatur. Cum hac circa pubem interiores partes dolent, et vesica etiam vrina plena et tumida facta sentitur. Proficiunt aduersus hoc malum balnea, cum his oleosa, et prae ceteris oleum Anethi, abdomini illiniendum, atque Cataplasmata perinaeo imponenda. Intus dari potest Oxyssel cum aqua. Si haec omnia non proficiunt, demittenda est in vesicam argentea fistula incurua, Catheter vocatur, quo concretus sanguis, qui intus se adposuit, perurapi et vrina euocari potest. Raro necesse est, vt vesica acutriquetra aperiatur, de quibus videnda Chirurgia.

M

VARI.



V A R I C E S.

§. 324.

Varices, graecis κίρσοι, sunt venae sanguine turgidae et tumentes. Illi annumerantur haemorrhagiis, quia interdum rumpuntur, et ex iis sanguis effertur, et quia etiam ex aliis suppressis haemorrhagiis nascuntur. Frequentius infestant crura, a quibus sanguis difficiliter per venas remeare potest. Interdum tamen intumescunt venae spermaticae, quod genus vulgo herniis annumeratur, dicitur enim κίρσοκήλη; de quo herniae genere videnda est Chirurgia. Varix tumor est oblongus, obscuri coloris, minime pulsans, quare differt ab aneurismate vero, in quo tumor magis rotundus est, et pulsat. Varices solent esse cum magno pruritu et ardore, quae res occasionem dat, ut, dum homines scalpunt scabrunque, concitetur erysipelas. Nonnumquam ex varice rupto oritur sanguinis profusio, ad quam suppressendam non ita festinandum est. Si vero id necessarium videtur, sufficit sola fascia paullo adstrictior.

§. 325.

Si varices sponte et sine manifesta causa oriuntur, hoc incidit, quod homini vel sanguis crassior est, vel maior partium solidarum imbecillitas, vel utrumque. Plurimum iisdem vexantur grauidae, propter compressas ab utero venas iliacas. Hoc etiam accidit hominibus, qui frequentius pedes calentes subito in frigidas aquas demittunt. Ceterum praeter has occasiones varices quandoque nascuntur in haemorrhoidariis, arthriticis, podagricis, nephriticis. HIPPOCRATES *Aphorism.* 21. *Secl.* VI. docuit, maniam varicibus ortis solui.

§. 326.

In curatione sanguis diluendus est, quare proficit sanguinis missio, quae grauidis etiam salubris est. Aluus du-
cenda

cenda est lenioribus. Si vitium ortum est ex haemorrhoidum et catameniorum obstructione, haec restituenda sunt. Haemorrhoidariis quandoque profunt hirudines. Omnibus accommodandus est victus, et prae ceteris potioni praestanda est aqua vel potio diluens. Vinum non aliud, quam oligophorum, concedi potest, cui aqua admiscenda est.

§. 327.

Tandem, adhibitis iis, quae e re sunt, et quibus sanguis mobilior redditur, cutis et reliquarum partium infirmitati occurrendum est. Optime hoc fit, dum varices fascia idonea (*Schnürstrümpfe*) adstringuntur. Non facile medicamenta superdari debent. Interdum proficit modesta frictio. Spirituosa si admouentur, duras reddunt partes rigidasque. Lixiuio sulphuris reprimatur varix, id quod vero tutum non est. Si venae et partes vicinae iam induruerunt, id quod crebrius adhibitis illis auxiliis spirituosius et adstringentibus fieri potest, admoueri possunt emplastra de Meliloto, malaëticum, defensuum viride Würtzii, addito diaphoretico Mynsichti. Non tamen semper emplastra super membrum relinquenda sunt. Venae varicosae si temere inciduntur, saepe mala ulcera relinquunt. Ad hoc tamen auxilium confugiendum est, si omnia frustra fuerunt adhibita, tumor vero nec valde magnus, nec valde durus est. Grauidis multum nocet et nimia quies, et si sedilibus demissioribus insident. Edito partu varices evanescent.



* * * * *

MORBI CAPITIS.

CEPHALALGIA.

§. 328.

Frequentissimus morbus est, qui, si diutius hominem premit, nullisque remediis obedit, Cephalaea vocatur; si vero vnum ex temporibus, totumque illud Latus excruciat, Hemicrania. Peculiare et intolerabile doloris genus est circa occipitium, cui veluti clauus infixus est, quae cephalalgia ob id Clauus hystericus dicitur, quod eo plures laborant foeminae hystericæ. Quoniam ille dolor quasi per spinam dorsî adscendit, is a nonnullis Cephalaea ilco-hæmatitica dictus fuit. Nonnumquam dolor in exterioribus partibus, cute musculorum, aponeurosi, et pericranio est, id quod cognoscitur, si pili quasi rigent, atque dolor solo capillitii tactu intenditur, sensus vero interni externique haud hebetantur. Si autem cum dolore mens stupet, vel oculi caligant, auresque grauius audiunt, morbi sedem sub caluaria esse indicium est. Interdum oculi admodum dolent, et lucis impatientissimi sunt, id quod incidit, si tunica choroidea laborat. Vbi nerui paris septimi quacumque re male adfecti sunt, aures intra se ipsas sonant, grauius audiunt, vel aliis vitiis patent, cuius rei causam Anatome ostendit.

§. 329.

Plura sunt, ex quibus cephalalgia oritur. Saepe abundantior sanguis in iunioribus plenisque hominibus ad caput redundat, quo interna externaque vasa distenduntur, spâsmi concitantur doloresque. Aliud genus, a redundante sero profectum, cum catarrho esse solet, quo pituitaria tunica, et cum hac aliae membranae afficiuntur. Dolor capitis

pitis etiam non raro contrahitur cruditate, crapula, et si re quacumque ventriculus laborat. Magnum inter ventriculum et capitis interiores membranas ipsumque cerebrum esse consensum, multis experimentis nouimus. Longum etiam cephalalgiae vel cephalacae genus oritur ex male adfectis visceribus abdominis, praecipue hypochondriis, quod cum morbo hypochondriaco, hysterico, et sic dicta atra bile esse solet. Frequentius igitur cephalaea nascitur a suppressis menstruis, haemorrhoidibus, lochiis, vel repente cohibito fluore albo. Alia est cephalalgia venerea, nec non scorbutica, si mala materia periostium distendit roditque, et tandem alia, quae oritur ab imbecillitate partium solidarum atque neruorum post diuturnum morbum, praecipue febrem, quae interdum cortice Peruuiano tollitur. Cephalalgia etiam symptoma est, quod aliis morbis, praeter febribus, accedit, interdum vero ex aucto dolore febris mouetur. Nonnumquam ex aliis causis spasmi superveniunt et neruorum distentiones. Spasmos vero cum omni fere Cephalalgia esse, vel pedum refrigerium ostendit, quod ii, quibus caput maxime ex sanguinis abundantia dolet, sentiunt.

§. 330.

Quod igitur ad primum genus, Cephalalgiam sanguineam, attinet, quae a plenitudine et sanguinis redundantia ad caput nascitur, dum in hoc vitalis humor per minimas arteriolas non libere mouetur, illius exacerbatio a multis occasionibus fieri potest. Dolor ab initio plerumque frontem et oculos fatigat, ubi vero inualuit, totum caput, turgentibus venis concitatisque arteriis. Iunioribus haec cephalalgia frequens est, qui cum hac febricitant, et soluitur sanguinis ex naribus profluvio, sudore vel vrina crassa, ex qua multa crassaque desidunt, quae in imum deferuntur. Crebrius illa oritur ab omnibus, quibus sanguis citatur, praecipue in iis adolescentibus, quibus frequens est sanguinis profusio ex naribus. Occasionem dare solent, alui

obstructio, plenus ventriculus, quo aorta premitur, adsumpta acriora et spirituosa, vehemens corporis exercitatio, Solis ardor, omnisque aër feruidus, pedum refrigerium, acre studium, et concitatio mentis perturbatio, ut illa, quibus menses et haemorrhoides supprimuntur, taceamus. Morbus, si eius consuetudo sit, tandem, accedente partium solidarum imbecillitate et atonia, degenerat in cephalaeam. Quibus iuuenibus caput multum doluit, illi in senectute metuere possunt apoplexiam, quam futuram esse significat sonitus aurium, vertigo, torpor, et si aeger balbutit. Saepe etiam nascuntur morbi soporosi.

§. 331.

In curatione prospiciendum est, ut aeger amplo conclavi teneatur, quo purum et frigidum aërem trahere possit. Nihil nocentius, quam cubile Sole vel igne calefactum. Oportet vitari omnem strepitum, corporis motum, negotiosam actionem, omnemque curam et animi contentionem, prae ceteris etiam Solis ardorem. Cibus sit modicus, non iurulentus, ex imbecilla materia; potio diluens, eaque multa, vinum nullum, vel oligophorum. Morbus et vigilia et longiori somno exasperatur. Aluo prospiciendum, ut fluida sit, numquam adstricta vel sicca. Perniciosum est, si illa frequentius valentioribus ducitur. Illa lenienda est victu molli, vel, si res id postulat, lotionibus emollientibus, nec non interdum Cremore Tartari, Manna, Tamarindis. Ceteroquin in hoc morbo optimum est nitrum, et praecipue illa compositio Stahliani. Conducit etiam nitrum cum oxymelle, et si dolor vehementius urget, cum Syrupo papaveris albi vel Diacodio Montani. Etiam emulsiō ex papauere, addito nitro, non aliena est. Optimum leuamen affert sanguinis missio, cui tamen iuuenes non temere adfuerieri oportet, ut alibi dictum fuit. Multum prodest sanguinis profluuium ex naribus, quod Veteres variis auxiliis concitauerunt. Si in corporibus raris venae latent, et incidi nequeunt, et si plethora urget, sanguis detrahi potest per

per cucurbitulas. Proficiunt etiam pedum frictiones, quae, si illi algent, fere necessariae sunt.

§. 332.

Non temere in hoc morbo confugiendum est ad valentiora opiata. Proficiunt aliquando externa epithemata ex aceto vel oxycrato cum Sale, mica panis secalini, baccis Iuniperi et semine Carui, nec non alia, quae supra occasione phrenitidis proposita sunt (§. 198.). Vbi dolor se remittit, dum corpus insudat, et ex vrina crassa desidunt, dari possunt discutientia interna: Essentia alexipharmaca, Spiritus bezoardicus Buffii, Tinctura Antimonii, quibus Liquor anodynus adijci potest. Tenuioribus imbecillioribusque oportuniora sunt infusa calida, horis matutinis in lectulis forbillanda. Extrinsecus Cucupha admoueri potest capiti.

§. 333.

In cephalalgia serosa et caput ex abundante sero dolere, ex sopore, torpore, aliisque signis, quae cum catarrho esse solent, nec non ex caussis, ex quibus morbus ortus fuit, cognoscitur. Hoc ignorari non debet, saepe et hanc feri redundantiam ex plethora venire. Nam qui iuvenes cephalalgia sanguinea laborauerunt, iis imbecillioribus factis et senescentibus catarrhi frequentiores sunt, quos auertere possunt, si sanguinis missionem non negligunt, et si victu atque exercitatione visceribus totique corpori robur restitunt. Sed tamen huius cephalalgiae plures aliae causae sunt. Frequentius enim hi dolores nascuntur ex temperantibus, maxime, si his perflatu aliisque occasionibus sudor reprimatur. Vide causas, ex quibus febrem catarrhalem oriri dictum fuit (§. 125.). Soluitur haec cephalalgia plerumque coryza vel phlegmatorrhagia narium, in qua serum flaescens copiosum ex sinibus calvariae non tam destillat, quam cum impetu erumpit. Nonnumquam sudore et diarrhoea.

§. 334.

Quandoque, si mucus, praecipue aucto calore, tum interno, cogitur, is sinibus calvariae inhaeret, et membranam pituitariam grauititer afficit, ex qua re grauedo oritur, et interdum, si hoc in vno latere accidit, hemicrania. Hic dolor, qui etiam cum febricula est, nonnumquam certum circuitum habente, plerumque valde refractarius esse solet, tandemque discutitur, si materia tenacior crassaque ex naribus excernitur.

§. 335.

Cephalalgiae ferrosae non alia curatio est, quam catarrhi, et si febris accessit, huic sunt accommodanda auxilia. Si protinus post subito repressum sudorem homo validus se multum exercet, vel fricatione utitur, vel etiam si puluerem diaphoreticum sumit, moto sudore, omnis discutitur dolor, morbusque tollitur. In his, ubi corpus insudat, sudor cieri potest forbitione calida, vel Essentia discutiente. Si vero morbus inueterauerit, et haec cephalalgia pertinacior facta est, et maxime si in grauedine mucus tenacior sinus frontales occupat; eo tempore, quo dolores vehementer urgent, dari debet nitrum, spiritus nitri dulcis, vel liquor terrae foliatae tartari cum spiritu nitri dulci vel liquore anodyno. Si corpus siccum est adstrictumque, aeger iura tenuiora vel decoctum emolliens Althaeae, florum Chamomillae, Verbasci, decoctum auenae, decoctum cornu Cerui, et his similia maiori in copia bibat. Multum proficit oxymel squilliticum cum multa aqua calida. Remittente se dolore, dari debet infusum Scorzonerae, Salsaparillae, Cichorei. Eo etiam tempore (nam ab initio nocent) proficiunt errhina et ptarmica leniora, Spiritus salis ammoniaci cum calce viua, quae naribus adducuntur. Si dolor valde vrget et contumax est, in homine urbano ac imbecillo dari debet aliquoties Cascarilla in puluere ad scrup. dimid. vel gr. XV. in extracto ad gr. v-viij. Interdum si dolor cum

cum febre est, ceteroquin vero nimis contumax, proficit cortex Peruvianus.

§. 336.

Tandem ubi mucus tenacior ex naribus cum leuamine excerni cepit, dari possunt discutientia, Essentia Succini cum Tinctura antimonii, Spiritus bezoardicus Bussii cum liquore anodyno Hofmanni. In pulueribus Succinum praeparatum. Extrinsecus parti dolenti illini potest Balsamum, veluti Balsamum Scherzeri, quod ex oleo nucistae, addito oleo ligni Rhodii, componitur. Admoueri etiam possunt cucuphae ex roborantibus, quae etiam conspergi possunt oleo ligni Rhodii, Lauendulae, vel alio quodam, cuius odor aegro gratus est. Discusso morbo alius duci potest Pilulis de Succino Cratonis, vel Apozemate ex Rheo, foliis Sennae, Manna. Omnia haec discutientia, nec non purgantia, nimium errhina, roborantia, primis temporibus, et ubi malum se nondum remisit, aliena sunt, et dolores augment. Senes, si sanguinis missioni adsteti sunt, illam non negligere debent: cauendum tamen, ne nimia sanguinis profusione exhaustantur, et ne illorum imbecillitas adaugeatur. Alius subinde ducenda; adhibenda est exercitatio, et post hanc fricatio omnium membrorum. Victus sit congruus cum aromate, pane fermentato, leui tamen, et qui admixtum habet semen Carui, Foeniculi vel Anisi. Vinum paucum sit, sed generosum. Etiam fonticuli excitandi sunt, qui magnum leuamen adferunt.

§. 337.

Si caput ex ventriculo dolet, quod in hoc cruditas est, acor ex vinolentia, vel ex adsumtis fermentescentibus, nec non corrupta bilis vel pituita, dolor frontem praecipue infestat, et cognoscitur ex causa, ex sapore, vel acido, vel amaricante, vel rancido, accedit nausea, ructus, vomendi conatus et grauitas praecordiorum. Si nullus sapor est, frequens vero ructus, et ventriculi inflatio, multa in eum pituita contracta est. Soluitur vomitu aut deiectionibus.

Hanc cephalalgiam optime tollit, si malum recens est, emeticum, cuius tamen usus frequens haud sit, quum aegri, qui luxuriae causa crebrius vomunt, stomachum infirmum reddant atque resolutum. Vomitus ciatur radice Ipecacuanhae, vel multa aqua calida cum oxymelle squillitico. Tutius est cruditatem subigere atque educere digestiuis, sub finem dato Rhabbarbaro. Non facile danda sunt nec emetica, nec purgantia, nisi materia mobilis fuerit. Emetica etiam post iram nocent. Vbi vero cruditas pedetentim ex pleniori valentiorique victu contracta fuit, in digestiuorum et leniorum purgantium usu per aliquot dies perseverandum est. Vbi malum inueterauit, ventriculum optime eluunt Thermae et Acidulae cum corporis exercitatione, quae in omnibus ventriculi vitiis certissima praesidia sunt. Etiam infusa per epicrasin purgantia, si cruditatibus causisque accommodantur, magni usus sunt. Praemissis abstergentibus et euacuantibus, conducunt carminatiua et roborantia: Essentiae carminatiuae, Elixiria, praecipue, si haec methodo ROFFMANNI ex Extractis amaris cum sale Tartari et vino meraco dulci parantur. Imbecillitati viscerum tunc medentur Tincturae martiales, puluis Birkmanni, ipse cortex Peruvianus cum Conferua viscerali. Extrinsecus ventriculo superhaberi possunt scuta stomachica. Etiam ex oleo nucistae, balsamo Peruuiano et oleis fragrantioribus destillatis, pariri possunt balsama extrinsecus ventriculo illinienda.

§. 338.

Si dolor capitis post praegressam iracundiam vrget, non semper tutum est emeticum. Minus nocet, si vomitus copiosiori aqua, eaque non valde calida, addito oxymelle squillitico, ciatur. Dari possunt pulueres ex nitro et magnesia. Alius soluatur lotionem emollientem, addito oxymelle, nec non Apozemate Tamarindorum, Cremoris Tartari, Mannae. Si cruditas in ventriculo orta fuit a potu gelido vel glaciali, a cereuisia non recte fermentata, nec non a deuoratis fructibus horacis, illi quandoque medetur haustus vini

vini generosi, vel vini adusti, vel medicamentum carminativum. Pituita efficiatur, vel emetico, vel dum, praemissis digestinis ex Tartaro vitriolato, Cremore Tartari, Terra foliata Tartari et huius liquore, alius ducitur catharticus, extracto panchymagogo, Pilulis de Succino, et in hominibus imbecillis Rhabarbaro. Aliena sunt terrea, quibus pituita fere induratur. Prospiciendum etiam est, ne salium et catharticorum abusu ventriculi imbecillitas adaugeatur. Si malum refractarium est, etiam ad infusa per epicrasin laxantia et aquas minerales recurrendum. Parum omnia opitulantur, nisi victus mutetur, et adhibeatur exercitatio.

§. 339.

Contumax cephalalgia, vel vera cephalaea, talis est, ut hominem strepitus, lux et vix non omnis mutatio turbet. Dolor intolerabilis pulsans atque spasticus, modo in toto capite, modo est in parte. Si is vnum capitis latus excruciat, dicitur Hemicrania, quae maximis tormentis adnumerari potest; interdum non solum sinciput et oculum, sed aurem etiam dentesque infestat, adeo, ut, si malum vetustum ingrauescit, atque tandem magis intenditur, in oculis caligo, in aure surditas oriatur, ut capilli fluant, dentes cadant. Habet sua tempora Hemicrania; interdum dolor imminuitur, interdum vix vllae eius reliquiae manent, mox vero iterum reuertitur et vehementer vrget. Nonnumquam circuitum habet quartanae vel tertianae; frequentius autem vagus est. Morbus est vel idiopathicus, vel sympathicus. Prioris causa in cerebro et eius membranis haeret; alterius in aliis partibus, maxime in visceribus abdominis. Igitur hunc dolorem excitant vermes, nonnumquam sub caluaria reperti, tinea male curata, arthritis per topica repressa, ossicula in falciformi processu et dura matre inuenta. Saepe etiam in aliqua parte durae matris atonia est. Etiam ex causa externa, casu ictuue extrinsecus illato, hoc morbi genus relinquitur, ex quo atonia manet pericranii, quod a quavis re, tempestatum inprimis malo habitu, afficitur, vt

vt vehementer doleat. Ex venereo morbo et Scorbuto ossa inflantur et dolet periostium, quod etiam acri humore, qui inter illud atque os contrahitur, intenditur, atque tandem roditur. Longe tamen frequentius sympathicus est morbus, et nascitur ab haemorrhoidum atque catameniorum obstructione, hypochondriaco et hysterico malo, atrabile, et interdum ab occultis desideriis venereis, ex diuturno moerore, aliisque causis. Ad hoc vero animus praeter ceteris advertendus est, morbum raro simplicem esse et ab una causa profectum, sed a pluribus inter se iunctis. Si v. g. foemina hysterica est, cuius etiam succi venereo morbo corrupti sunt. Sympathicus dolor postquam desinit, soluitur interdum alui fluxu, deiectione nigrorum et biliosorum, quartana, vlcerebus hinc inde natis, aliisque morbis, quibus cutis infestatur, interdum etiam haemorrhoidum profusione.

§. 340.

Difficilius tollitur cephalaea, et quandoque grauioris morbi, epilepsiae, apoplexiae, morbi soporosi metum facit. Curatio causis accommodanda est. Si causa tolli nequit, imperandus est victus modicus, ex imbecilla materia; aer sit purus, nec frigidus, nec calidus. Interdum leuamen affert fonticulus atque fetaceum. Parti dolenti admo-ueri possunt emplastrum diaphoreticum Mynsichti cum malactico, emplastrum de Cumino, de Cicuta, quibus tamen dolores interdum asperiores sunt. Dolores, si nimis acuti et intolerabiles sunt, requirunt anodyna. Vbi autem haec dantur, prius videndum est, vt alius respondeat, et vt aliae etiam excretiones haud turbatae sint. Dari potest Laudanum opiatum, Extractum opii ad gr. j - ij. Laudanum liquidum ad gutt. XV - XX. Pilulae Starkeyanae ad gr. ij. Theriacae veteris drachma dimidia ad scrupulos ij. Doses in iis, qui his medicamentis adfueti sunt, augeri debent. Ceteroquin etiam proficit, si capilli non tondendo, sed forfice praecidendo tolluntur, et si id, quod ex capillitio residuum est,

est, quotidie pestendo fricatur. De sanguinis missione experimentis cognitum est, illam, nisi plenitudo adsit, in his refractariis doloribus saepius nocere, quum ea nimis infirmetur solida. Si horum magna imbecillitas est, conducit interdum cortex Cascarillae in puluere vel extracto, et cortex Peruvianus. Si causa haeret in visceribus abdominis, his succurrendum est, et opitulatur Thermae atque Acidulae, illarumque usus repetitus, datis cum his Pilulis Becheri vel similibus.

§. 341.

Vbi lues venerea periostrum irritat, huic medendum est. Si tinea repressa fuit, plurimum proficit capitis frictio, datis medicamentis ex floribus Sulphuris, Antimonio diaphoretico, Aethiope minerali et similibus. Propinari etiam possunt decocta ex radice Chinae, Sassaaparillae, ligno Sancto, Sassafras, quibus quandoque reuocatur tinea, quae post iisdem medicamentis curanda est.

§. 342.

Clausus hystericus, nec non cephalalgia ileo-haematitica, vehementioribus pertinacioribusque spasmis continetur. Clausus excruciat verticem et occipitium. Describunt aegri, non alium sensum et dolorem esse, ac si clausus infixus illi loco esset. Tales aegri sentiunt praecordiorum dolorem, quem excipit vehementior spasmus, qui quasi a lumbis et osse sacro per totam vertebrarum spinam ad processus mastoideos et occipitium adscendit, quo tandem ille gravissimus dolor concitatur. Si malum non ita vehemens est, aegri, et potissimum foeminae, conqueruntur de sensu molesto refrigerii, quo illa sedes infestatur. Cum hoc dolore nausea est, et plerumque aluus adstricta. Alia se-et excretionum vitia concurrunt.

§. 343.

Causa huius morbi esse videtur humor corruptus in valis haemorrhoidalibus, vterinis, haerens, cum hic morbus

bus plerumque cum haemorrhoidum et menstruorum vitis esse solet. Plurimum conferre potest, praecipue in foeminis, caelibatus, nec non moeror et sollicitudo. Soluitur haec cephalalgia quandoque, si ex modo dictis vasis humor quidam veluti mucilaginosus aliusque excernitur. Supra de haemorrhoidibus albis dictum fuit. Morbus refractarius est, praecipue in foeminis laute viventibus, otio deditis, et si id, quod morbum fecit, tolli nequit. Spes est, si dolor non continuus est, sed se interdum remittit; maior spes est, si certis temporibus ingrauescit.

§. 344.

In curatione causis occurrendum est, siue morbus ex viscerum imbecillitate et inde ortis cruditatibus, siue ab haemorrhoidum et menstruorum vitis ortus fuerit. In multis opem ferunt Thermae, quarum usum iterari oportet. Nec aliena sunt infusa per epicrasin laxantia. Congruus victus, exercitatio, animi tranquillitas, et omnia cetera sedulo obseruanda sunt. De sanguinis missione supra dixi, eam, nisi manifesta plethora sit, plerumque nocere; ad minimum numquam sanguis saeuiente dolore detrahi debet. Castoreo multum tribuunt in his casibus, quod vero respondet. Vbi praemissa fuerunt congrua euacuantia, illud dari potest in puluere vel essentia, cum essentia corticis Cascarillae et liquore anodyno. Si quartana subesse videtur, praemissis per longum tempus euacuantibus, dari potest cortex Peruvianus. Saeuientibus maiorem in modum doloribus, narium admoueri potest mixtura ex spiritu salis Ammoniaci et essentia Castorei. Haemorrhoidariis saepe profuerunt hirudines.

§. 345.

Est tandem Cephalalgiae quoddam genus, quod nonnumquam praegreditur apoplexiam. Haec repente corripit hominem ita, ut caput vi quasi constringatur, succedit vehementis dolor, vertigo, aurium tinnitus, sensuum internorum perturbatio artuumque torpor. Iterum sponte eualescit,

nescit, saepe tamen reuertitur, et magnum metum apoplexiae affert, de cuius curatione protinus dicendum erit occasione Apoplexiae.

§. 346.

Cephalalgia venerea horis potissimum vespertinis vehementior esse solet, et lectuli calore exasperatur. Dolor est osteocopos, seu quasi rodens et terebrans in interiore calvariae parte. Nascuntur tandem gummata, tophi, alique tumores, de quibus suo loco, ubi de morbo venereo agendum est. In scorbutico plerumque totum caput dolet, et maior solet esse sensuum obnubilatio, quam in morbo venereo.



CORYZA ET GRAVEDO.

§. 347.

Inter catarrhos capitis sunt Coryza et Grauedo, et Phlegmatorrhagia narium. In priori tenuis pituita et plerumque acris salsaque, interdum crassior et lenior, per nares destillat. In grauedine dolor vehemens est, sub quo ab initio nares clauduntur, sub finem crassior pituita, aliquando tenax et sicca excernitur. In phlegmatorrhagia narium humor, qui in calvariae sinubus concurrit, tandem inclinato corpore, sine ullo sensu et cum impetu quasi profluit. Cum his morbis frequentia sternutamenta sunt, et si pituita falsa fauces exasperat, etiam tussis. Caput in Coryza leniter dolet, cuius est magna grauitas et *καρποφορία*. Cum his pigrior mens tardiorque sensus esse solet. Ex his intelligitur, ipsum etiam cerebrum in his morbis affici, et Veterum sententiam, cerebrum his destillationibus expurgari, propius a vero abesse; id quod tamen per factam a natura metastasin vasorum duræ matris cum iis, quae per pituitariam membranam discurrunt, non vero facta destillatione per

per foramina ossis ethmoidei fieri potest. De coryza occasione catarrhi dictum est; de grauedine occasione cephalalgiae. Est coryzae genus, quod infirmos, et praecipue senes somno nimis indulgentes, in aëre paludoso degentes, diu fatigat. Hoc longum est, et ex atonia pituitariae membranae eiusque glandularum nascitur. Qui diu multumque his longis destillationibus obnoxii sunt, illis non raro aliorum morborum, apoplexiae, lethargi, catarrhi suffocatiui pericula proposita sunt. In iunioribus destillatio vel coryza nullo auxilio indiget. Si vero illa longa et pertinax est, cura habenda, ut humorum effluxus auertatur, et partibus infirmis robur restituatur. Dari debent, nisi alia hoc prohibent, purgantia ex extracto panchymagogo Crollii, Massa pilularum de Succino Cratonis, refina Ialappae, Diagrydio sulphurato et similibus. Vbi autem febricula accedit, haec, quando illa aegrum tenet, omittenda sunt. Potioni praestandum est decoctum ex radice Chinae, ligno Sassafras, radice Graminis, addito paucio cortice Cassiae lignae. Cibis sit ex pane bis cocto cum semine Carui, Foeniculi, Anisi, ex carnibus assis, aromate conditis, et abstinendum est ab omni alio cibo, praecipue iurulento. Aër salubris sit, haud paludosus, sed montanus. Interdum vbi dolor non vrget, serenis diebus corpus exerceatur. Aër paludosus corrigitur ardente camino et suffimentis ex baccis Iuniperi, Olibano, Mastiche, Benzoë. Cum his interdum, vbi dolor non vrget, dari potest Liquor cornu cerui succinatus ad gtt. XXX. Essentia Succini, cum Tinctura antimonii. Profunt errhina et ptarmica, quorum tamen usus rarior esse debet. Ceteroquin in catarrhorum curatione considerari debet ventriculus. Si hunc cruditates onerant, coryza in grauedinem mutatur, et dolor omniaque symptomata exasperantur. In longis admodum catarrhis fonticuli, ad auertendam a capite extrahendamque pituitam, optime valent.

OTAL

* * * * *

OTALGIA.

§. 348.

Hec inter aurium morbos frequentior est. Sedes huius doloris est membrana, qua intus meatus auditorius contegitur, et in cuius glandulis cerumen secernitur. Est vero discrimen. Vera enim Otalgia inflammatione illarum glandularum, notha spasmis continetur. In vera omnia vehementioris inflammationis signa sunt. Dolor est intolerabilis, arteriae pulsant, febris, quae accedit, maximum feruorem habet. In utroque genere aeger grauitur audit, et aures, quae intra se ipsas molesto susurro sonant, ob id sonum externum non accipiunt.

§. 349.

Otalgia, quae cum inflammatione est, interdum discutitur, saepe ad suppurationem spectat. Pus, ubi maturuit, ex aure erumpit, cum sensu vehementissimi fragoris, quem aeger sibi audire videtur, id quod accedit, si abscessus maior et puris maior modus fuit. Pus fluere solet per aliquot dies, tandem vero id plerumque desinit, et omnia sine noxa sanescunt. Interdum tamen, si auris multis medicamentis agitata fuit, abscessus in malum vlus fistulamque vertitur, ita, ut nonnullis pus male olens per totam vitam exeat, quibus sub finem etiam vsus auditus aufertur.

§. 350.

Otalgiae variae causae et occasiones sunt. Frequentius hoc accedit pueris, dentientibus gingiuis maxime, ubi molares poscunt, id quod sero fit, gignuntur. Ex anatomico discimus, ramos nervi maxillaris inferioris, qui tertius ramus quarti paris est, et qui ad linguam pertinet, committi cum minori nervo, qui ab aure descendit, et a septimo pari huiusque portione dura oritur. Inter maxillas itaque

N

aurem.

auremque consensum esse, vel ex eo intelligitur. In aliis otalgia est cum catarrho, et oritur ex malo tempestatis habitu, et si vel caput, vel pedes caloribus relaxati subito frigore excipiuntur. Nonnumquam si tinea ex toto, superhabitis extrinsecus remediis, prohibita fuit, mala materia in aurem vertitur. Dolor eo vehementior est, quo inflammatio propior ab aure interna et membrana tympani est. Solvitur otalgia, praesertim ea, quae cum inflammatione et febre est, nonnumquam sanguinis ex naribus profluvio, vel deiectionibus biliosis. Interdum hominem ad dementiam mortemque praecipitare potest: Nam partes, quae afficiuntur, nervosae sunt et a dura matre propiores.

§. 351.

Est otalgiae genus, quod in febribus ardentibus per metastasin oritur, id quod HIPPOCRATES *Sect. IV. Aphor. 60.* animaduertit. Haec febrem leuat, si cum aliis bonis atque coctionis signis est. Si enim oritur cum cruditate, mortem denunciat. Et HIPPOCRATES CELSVSQUE animaduerterunt, otalgiam surditatemque quandoque solui deiectione biliosa, id quod etiam observatio confirmat. Si in otalgia vehemens inflammatio est, id quod ex febre aliisque signis cognoscimus, ab initio adhiberi possunt omnia, quae aduersus hanc valent. Magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis mittatur. Imperanda est fames et potio diluens. A primis initiis profunt saepe laudata Apozemata ex Tamarindis, Manna, Senna et similibus, quae ubi inflammatio iam adoleuit, atque ad supurationem spectat, aliena sunt. Dari potest ptisana, oxymel simplex et alia, quae aduersus inflammationem maxime valent. Extrinsecus nocent omnia spirituosa, quibus et meatus auditorius et tympani membrana indurantur. Auribus admoveantur vapores, qui et molliendi et discutiendi vim habent. Si enim Medicus certus non est, num suppuratio futura sit, utilis est fons ex pane calido secalino, cui, antequam coquitur, persendo, plurimum seminis foeniculi

et

et anisi admiscendum est. Vbi vero tempus, dolor, aliaque ostendunt, in pus versum iri quiescentem humorem, vapor panis fecalini simplicis melior est. Auribus etiam extrinsecus imponi potest cataplasma ex farina feminis lini, foenu graeci, herba Hyoscyami, radice Althaeae, capitibus papaveris, quae coqui possunt ex lacte, addito oleo liliorum alborum. In aurem immitti potest oleum molliens recens, addito oleo Hyoscyami. In his tamen curationibus non nimis diu perseverandum, ne membranae nimis relaxentur.

§. 352.

Postquam inflammatio finita est, et vel discussa, vel in pus mutata, dari possunt discutientia, veluti Essentia Succini, Tinctura Antimonii. Infirmis prosunt sorbitiones ex radicibus Chinae, Vincetoxici, herba Betonicae, Salviae, Melissae, semine Foeniculi, cortice ligni Sassafras, ligno Santalino. Sub finem alius duci potest. Extrinsecus auriculae imponi possunt epithemata, quae vero nec humida, nec frigida esse oportet. Ex vino rubro vel oxycrato coquantur herbae Betonicae, Maioranae, Serpilli, Lauendulae, Rorismarini, Salviae. Decocto admisceri potest sal ammoniacus. Nec suffimenta aliena sunt, vel ex his herbis fragrantioribus et baccis Iuniperi, vel ex Gummi saepe nominatis. Sed et epithematum et suffitionum nimius calor offendere potest aurem. Quae in meatum auditorium immittuntur, maiorem saepe nocendi, quam iuuandi habent potestatem, quare caute agere oportet medentem. Fere optimum est, si guttula olei, vel essentia Succini gossypio excipitur, idque in parte anteriori meatus auditorii continetur. Ulcus ex tali suppuratione relictum, maxime, si ei vetustas accessit, curari, saepe periculosum est. Exemplum legitur in *du VERNEY*, vbi simile profluvium, per viginti et quinque annos toleratum, post autem curatum, homini interitum attulit (*Lib. III. p. 121.*). Quod itaque sine periculo tolli nequit, ferendum est. Experimenti

licet medicamenta sanguinem purificantia intus danda, cum longiori abstinentia; crebrius tamen nec haec opitulantur. Extrinsecus in aurem demissa parum proficiunt. Saepe ulcera sponte sanantur glutinanturque. Vbi in fistulas degenerant, nullam curationem recipiunt. Cauendum, ne, demissis in aurem variis liquoribus, tympani membrana vel rigidior fiat, vel laxior, et ne aliae partes offendantur.

§. 353.

Si vero otalgia sine inflammatione est, id quod frequentius cum catarrho incidit, et si dolor vehementer vrget, auertendus est humorum aditus, impositis supra processus mastoideos cantharidibus. Vtilia sunt masticatoria ex radice Pyrethri, Pimpinellae albae, Mastiche. Alius soluitur Apozemate ex foliis Sennae, Rhabbarbo et Cremore Tartari. In phlegmaticis corporibus adhiberi possunt Pilulae de Succino Cratonis. Si dolor adeo intenditur, ut mentem turbare videatur, periculum adfert primum furoris, deinde interitus. Tunc ad opium, et quae ex hoc parantur, recurrendum est. Extrinsecus admoueri possunt supra laudati fctus ex pane calido cum seminibus, vel epithemata, quibus emollientia admiscantur. In aures immitti potest oleum, cui parum olei Succini admistum sit. Nonnulli extollunt Allium ex oleo diutius coctum. Id vero ignorari non debet, omnia, quae in aures demittuntur, prius calefieri debere. Interdum haec otalgia oritur a nucleis aliisque rebus in meatum illapsis, haec provide suspensaque manu, lubricatis prius viis, volsella educi oportet; si vero dolor ab insectis oritur, quae quandoque in meatum irrepere solent, illa necari possunt decocto Mercurii viui, vel decocto meraciori Absinthii. Etiam, si oleum quoduis in meatum immittitur, et in eo per vnā alteramque horam continetur, insecta praefocantur. Ex CELSI Lib. VI. Cap. VII. consilio, lanae paullulum in aurē compellendum est, quo pulex, vel aliud animal, quod intus est, illud subeat et cum eo extrahatur.

GRAVI.

GRAVITAS AUDITVS ET SVRDITAS.

§. 354.

A variis caussis oritur. Grauius accidunt homines, quibus auricula abscissa est. Fasciis vittisque, quibus puerorum capita vinciuntur, auricula ad posteriora depimitur, quae sic sonos, seu aëris tremores, recte excipere haud potest, qui ideo etiam ad meatum auditorium haud recte perducuntur. Grauitas auditus quandoque est cum catarrhis, dum non solum tympani, aliaeque illorum foraminum teneriores membranae ab aëre humido multum relaxantur, sed dum etiam a sudore et insensibili expiratione repressa febris mouetur, vasa distenduntur, neruique irritantur, et sic susurrus excitatur. In hoc morbo conducunt omnia, quae aduersus catarrhos maxime possunt, et quae etiam in otalgiae curatione proposita sunt. Extrinsecus adnota roborantia, post discussos catarrhos, vtilia sunt.

Tamquam specificum laudatur sequens medicamentum.

R. Essent. Castorei

Spir. vini camphorati ana drachm. dimid.

M. D. S. Etliche Tropfen auf ein Stück weich erwärmtes Brod zu tropfen, und auf das Ohr zu binden.

Si malum iam inueterauit et catarrhus hominem sine intermissione tenet, fonticulus vel setaceum multum proficiunt. Nonnumquam audiendi difficultas a coaceruato induratoque cerumine, quod oleo Amygdalarum dulcium, Liliorum alborum, tepido lacte et melle emolliendum est, magna cura habita, ne laedatur tympanum. Vbi in meatu auditorio suppuratio fuit, etiam coactum induratumque pus occludere potest meatum. Aliquando sarcomata alique tumores

in meatu auditorio nascuntur, qui, si in parte anteriori sunt, scalpello tolli possunt. Septica cum periculo admoventur. Lapis infernalis, si mox calida iterum abstergitur, tolerari potest. Interdum inflammata, scirrhusaque parotis meatum premendo praecludit. Si vero, quocumque casu, magno etiam fragore, rupta est membrana, audiendi facultas non protinus, sed tamen pedetentim et certo amittitur. Nec in hoc casu, nec si intus in interiori aure caries orta fuit, si ossicula concreuerunt, si horum musculi vel ligamenta induruerunt, surditas ullam curationem recipit. Si membrana nimis laxa est, id quod post catarrhos in corporibus infirmatis accidere solet, experienda sunt suffimigia, et, ut aer humidus auertatur, semper gossypium in meatum demittendum est. Frequentius malum haeret in Tuba Eustachii, quae vel ab inhaerenti materia praeclusa, vel exulcerata, vel per cicatricem coalita est. Aer in tympano inclusus, si per hanc tubam renouari nequit, elatorem amittit, et tunc ad intendendas teneriores membranas sonumque propagandum ineptus redditur. Si in tuba mucus haeret, id quod ex praecognitis causis scire licet, conducunt Apophlegmatizantia, radix Pyrethri masticata, vel quae, quod mitiora sunt, praeferrri debent, radix Pimpinellae albae et Mastix. Adhiberi etiam potest Essentia Pimpinellae albae cum frustulo sacchari, os vero gargarismis eluendum est. Si cum faucibus tuba haec ex malo venereo exulcerata est, et ab exulceratione obstructio facta, surditatem tollere potuit Mercurius, et eo excitatus Ptyalismus. Siphonem delineauit GARENGEOT, quem tubae admoventi, et hanc congruo liquore elui posse, proposuit. Num alia experimenta illud comprobauerint, ignoro. Aliquando haec tuba paralytica fit, quare si surditas post apoplexiam relinquitur, et vel vitio huius tubae, vel vitio compressi cerebri atque nervi acustici enata est, malum tolli nequit. Id quod etiam fit, si post grauem ictum, capiti illatum, protinus omnis audiendi facultas amissa fuit penitus. Hoc etiam a resolutis nervis fieri probabile est. Sur-

ditati,

ditati, post grauiore diuturnosque catarrhos, quandoque medetur cautérium in brachio, vel nucha, vel vlcus ad methodum *BELLÓSTII* (*Suite de Chirurgien d'Hospital* p. 282.) in processu mastoideo, mediante lapide infernali, excitatum, cuius suppuratio multa longaque esse debet. Ceteroquin notandum est, omnibus imbecillis, maxime si voraces sunt, et in eorum primis viis cruditates coacervantur, nec non in hypochondriacis, auditum difficiliorem fieri. Tales causam tollere debent. Si externis aures fatigant, plerumque ex Surdastris surdi fiunt. . Aures etiam a bilis redundantia affici, illud, quod supra adduximus, probat, alium biliosam interdum surditatem solvere. Ex graui sanguinis profluuiio auditum cum aliis sensibus hebetari notum est, quae surditas etiam interdum manet.



TINNITVS AVRIVM.

§. 355.

Oritur, vbi distentio fit illorum neruorum, quibus in aure motus et ipsa etiam perceptio vel sensus fit. Si nerui conuelluntur, quibus muscoli ossiculorum in tympano cientur, maior acutusque, vt videtur, oritur sensus. Alius vero, si nerui per cochleam diuisi afficiuntur. Etiam in ipso cerebro potest aliquid esse, quo nerui commouentur. Hinc tinnitus saepe neruorum in corpore distentionem, epilepsiam, imo et apoplexiam praecedat. Curatio causis accommodanda est. Vel enim sanguis mittendus, serosa colluies educenda, primis viis prospiciendum est, vel curanda neruorum imbecillitas. Causae cognoscuntur ex corporis habitu et aliis, qui in eo sunt, morbis. Externa parum proficiunt.



ODONTALGIA.

§. 356.

Nemo ignorat, non ipsum dentem dolore affici, sed membranas, quarum duae sunt; altera a nervis profecta, qua interius cauum, quod in omni dente est, cingitur; altera periostium est, quod radicem dentis alveolo haerentis includit. Hae membranae, maxime interior, dolore adficiuntur, qui non vnius generis est. Is enim vel ab inflammatione, vel a spasmis oritur. Cum eo, qui ab inflammatione nascitur, esse solet febricula, cuius notae sunt pulsus velocior auctusque calor. Haec inflammatio non raro in suppurationem tendit. Pure orto, corrumpitur membrana et ipse dens laeditur, qui carie exesus, vacillat tandemque recedentibus pluribus fragmentis cadit. Si per inflammationem intumuit periostium externum, plerumque etiam pus mouetur, et nascitur parulis seu minor abscessus, Germ. *ein Zahngeschwür*. Dolor spasticus saepe cum catarrhis est.

§. 357.

Causae variae sunt; plethora, neglecta venaesectio, mensium et haemorrhoidum suppressio, propter quam grauidae primis mensibus his doloribus multum vexari solent. Ex frequentioribus causis est catarrhus, si caput, caloribus relaxatum, frigore ventoque excipitur, sudorque reprimatur; si dens iam exesus est, is ex leui occasione dolet. Caries vero duplicis generis est, altera, quae ab interioribus incipit, et quae ab vitiatis humoribus in Cacochymia, Scorbuto, post usum Mercurii, oriri solet; alia nascitur ex munditie neglecta, etiam ex vitiatis humoribus in os confluentibus, inprimis, si macrescentes gingivae a dentibus recedunt, et hi ex sordibus atque inhaerescente tartaro scabri fiunt, tandemque nigri labare incipiunt. Aliud genus doloris

doloris est, quod Veteres *αἰμαδία* vocauerunt, illud a sanguine oriri existimantes. Nihil aliud est, quam stupor nervi, qui per radices dentium perforatas ad interiora descendit. Hic dolor a variis causis, a fonitu rauco et acri, ab adsumentis acidis, crudis et austeris, a potu frigido, etiam a ructu acido, mouetur.

§. 358.

Igitur odontalgia etiam in idiopathicam et sympathicam diuidi potest. Vbi cum inflammatione est, ante omnia alium solui oportet, vel lotionem vel Apozemate minus valente. Vt vero dolor discutiatur, dandum est nitrum cum puluere bezoardico. Sudore veniente debet aeger se continere, ut is per omne corpus diffundatur. Si omnis sudor finitus est, oportet linteum tepescere et paulatim singula membra detergere. Si autem homo valde plenus est, utilius est sanguinem mitti, vel incisa vena, vel cucurbitulis, quae, concisa prius cute, in tergo, brachiis furisque defigendae sunt. Prosumt etiam rubefacientia, pediluua et frictiones, maxime pedum. Non temere properandum est ad opiatorum usum. Si aeger febricitat, febriculae accommodanda sunt auxilia, et ubi corpus insudat, dandae calidae sorbitiones aliaque discutientia. Nec facile in excessum dentem opium demitti debet. Inutile non est, si capita papaueris hortensis, flores papaueris, folia hyoscyami ex aceto coquantur, et ore continentur. Etiam ubi inflammatio valde vrget, cataplasma, quod ex emollientibus, addito croco, cum lacte oleoque componitur, extrinsecus imponi potest, ut in exteriorem partem euocetur inflammatio. Si dens carie adesus est, is interdum bene accommodato plumbo repleri potest, interdum vero sine mora eximendus est, ex quo non raro protinus omnis dolor conquiescit.

§. 359.

Illud odontalgiae genus, quod cum cartarrho est, et quod serosum vulgo vocant, vix aliam curationem recipit,
N 5 quam

quam, qualem catarrhi requirunt. Interdum auerti potest, si mox ab initio alius ducitur lenioribus, fatis tamen valentibus: decocto foliorum Sennae, Cremoris Tartari, Salis cathartici, Mannae. Haec vero purgantia, si acerbato valde dolore sumuntur, malum pertinacius reddunt. Interdum oritur ptyalisinus, data Cinnabari vel Specifico cephalico adaugendus, nunquam vero reprimendus. Hoc genus, si cum nulla febre nulloque aestu est, optime fert masticatoria, ut sunt Mastix, radix Pimpinellae, Caryophyllus aromaticus, Essentia Pimpinellae. Etiam proficiunt Vesicatoria, processibus mastoideis, scapulis aliisque partibus admota. Vulgus utitur allio, quod cuti alligari solet. Alia sunt rubefacientia, quae quum nullum odorem habent, naribus minus molesta sunt. Si dens carie exesus a catarrho dolet, in eum, si educi nequit, demitti potest guttula olei caryophyllorum cum paucis gossypio. Hoc oleum, quod cum Essentia Myrrhae, Aristolochiae et pauca Essentia Euphorbii misceri potest, cariem dentis exedit, et foetorem tollit. Haec, quae ferossae odontalgiae opitulantur, priori generi, quod a sanguinis redundantia oritur, pestifera sunt, doloremque intendunt.



VERTIGO

§. 360.

Est subitanea perturbatio sensuum, cuius varii gradus, variaque nomina sunt. Ab initio homini obiecta in gyrum moueri, vel ex alto labi videntur. Plus mali est, ubi naturalis obiectorum color in viridescentem vel atrum mutatur, et sic accidit caligo seu *morodivia*. Non raro cum his aures intra se ipsas sonant et tandem aliquando superuenit vomitus. Alia et periculosa est species, si aegro genua quasi fatigata tremunt, et magis adhuc periculum inuni-

imminet, si is se sustinere nequit, sed subito concidit; quod alterum genus vertigo caduca vocatur, id quod resolutis ad tempus musculis fieri intelligitur. Vertigo vero desinit vel in syncopen et ἀσφυξίαν, vel in apoplexiam, vel in epilepsiam, quorum tamen morborum varii gradus sunt.

§. 361.

Maximum vero discrimen est inter vertiginem idiopathicam et sympathicam. Nec tamen omittendum est, vertiginem etiam esse inter symptomata, quae crisin antecedunt. Idiopathicae sedes est ipsum cerebrum, sympathicae sunt aliae corporis partes, maxime ventriculus et hypochondria. Vertigo enim oriri videtur, si sensorium commune, vel nervi ad illud pertinentes, certa ratione afficiuntur. In oculis maxime conuelli videntur nervi, ad musculos, praecipue ad ligamentum ciliare pertinentes, quibus conuulsis obiecta tremula homini apparent. Vertigini obnoxii sunt omnes imbecilli, quibus et totius corporis fibrae nervique, et praecipue viscera infirma sunt, et qui propter hanc imbecillitatem re quavis grauiter afficiuntur, vel, ut alii id exprimunt, sensibiliores sunt. Nam his humida etiam mobilissima sunt, ut ex quavis mutatione citentur. Igitur hoc morbo conficiuntur hypochondriaci, hystericae, litterarum studio, nec minus etiam gulae nimis dediti, qui Venere, sanguinis profusione, cathartecorum usu exhausti, contentiosa actione defatigati sunt, iuniores plethorici, senes, arthritici et podagrici, quibus sanguinis profluvium per nares, menstrua vel haemorrhoides suppressum, quibus fonticuli aliaque vlcera chronica curata fuerunt. Idiopathicae vertiginis variae occasiones sunt. Oritur enim, si homo in gyrum mouetur, si is ex praerupto loco et ex praecipitio ad ima, vel ex ponte ad rapidum flumen, ad aquarum vorticem despicit, si is rheda vel naui, praecipue auersus, vehitur, et huius vertiginis insuetus est. Nascitur etiam hoc vitium ex animi perturbatione, terrore, timore et ira, ex ictu capiti illato, ex ebrietate, usu hypnoticorum, narcoticorum aliorumque

ven-

venenorum, a fumo carbonum, a fumo Peti per fistulam hausto, si et huic homo nondum adfectus est, a nimio sanguinis profluio, ab omnibus, quibus boni succi viresque auferuntur. Frequens est vertigo aegris magno vel diuturno morbo confectis, si erecto corpore esse volunt, id quod non raro iis mortem maturat. Inter causas etiam minus frequentes, si arteriae carotides quacumque ratione non prorsus praeclusae sunt, sed ita tamen affectae, ut sanguis per eas difficiliter moueatur.

§. 362.

Deuteropathica vero saepissime oritur a ventriculo et hypochondriis, si cruditates, bilis, acidum, lac coactum, immo etiam pituita in eum contracta sunt. Quare post ingluuiem et crapulam saepe vertigo. Quibus viscera chylopoea et hypochondria laborant, foeminae hystericae, et viri atrabillarii, nec non alii, quibus podagra ventura est, vel quibus hi et similes morbi male curati sunt, quibus lumbrici aluum occupant, quibus quaedam olim in corpore facta excretio suppressa est, vel scabies tineaeque et similia pustularum genera prohibita fuere, vertigine corripiuntur. Interdum soluitur vomitu, deiectione biliosa, podagra et rarius orto in qua corporis parte abscessu. De vomitu dicendum, non omnem criticum esse, sed saepius symptomaticum, quem ex cerebro male affecto moueri alibi diximus.

§. 363.

Omnis vertigo mala, pessima tamen idiopathica est, cuius causa tolli nequit, si talis post alios grauiores diuturnosque morbos, maxime post cephalaeam aliosque capitis adfectus oritur, et quae pertinacior facta frequentius reuertitur. Sympathica interdum soluitur haemorrhoidum fluxu; idiopathica in senibus apoplexia finitur.

§. 364.

Etiam vertiginis curatio causis accommodanda est. Eam ab abundante sanguine nasci, scire licet ex cognitis pletho-

plethorae notis, et si cum vertigine arteriae concitantur, et dolor mallei ictibus fere similis, cum aurium sonitu et surditate, aegrum male habet. His sanguis mittendus est ex talo, et admouendae sunt cucurbitulae, concisa prius cute. Cucurbitulae occipitio impositae multum profuerunt. Necessè verò est, ut prius sanguis incisa vena detrahatur. Etiam alius ducenda est Cremore Tartari, sale cathartico, sale Therma-
rum Carolinarum, foliis Sennae et similibus. Nimium sanguinis motum resoluunt Nitrum, Arcanum duplicatum, lapides Cancrorum cum acido Nitri. His tamen abutendum haud est, quippe quibus tandem ventriculus et viscera infirmantur. De victu et exercitatione infra dicendum.

§. 365.

Si vertigo idiopathica in senibus a redundante pituita nascitur, optimum leuamen affert fonticulus vel setaceum. Si malum minus distantem curationem poscere videtur, verticem ferro candente aduri et pus moueri oportet. Cum his dari possunt infusa per epicrasin laxantia, addito Helleboro et Agarico, Pilulae de Succino Cratonis cum Extracto panchymagogo Crollii, Mercurio dulci, Diagrydio. Caput quandoque, praemissis illis euacuantibus, fricari potest, et post fricationem admoueri possunt cucurbitulae. De vertigine idiopathica illud dicendum est, aquas minerales his plerumque nocentissimas esse, quae in vertigine sympathica saluberrimae sunt. Vbi tamen vertigo a sola nervorum et viscerum imbecillitate, et non a male affecto cerebro oritur, illarum potus salubris deprehenditur, quae tamen res curiosiorem observationem requirit.

§. 366.

Si vertigo ex ventriculo oritur, illud ex nausea, cardilogmo, cardialgia, vel Soda, bilioso rancidoque sapore, aluo vel adstricta, vel soluta, et si cibus ventriculo non continetur, vel si is inconfectus redditur, aliisque signis cognoscimus. Dari debent medicamenta, quibus id, quod cor-

cor-

corruptum est, qua via commode expelli potest, eiiciatur. Emetica, tanto magis valentiora, imbecillis non sine periculo dantur. Aeger, qui vomiturus est, bibat aquam calidam, cuius maiori modo admisceatur oxymel squilliticum, superbibenda est calida, donec vomuerit aeger. Inter vomitus caput deligandum est. Praeter emetica et cathartica communia, aduersus stomachi vitia, multum valent Thermae et Acidulae. Hypochondriacorum et hysteriarum vertigo, si vetustas accessit, difficulter tollitur. In foeminis ad menstrua, in viris ad haemorrhoides, et ceteroquin etiam ad ventriculum aliaque viscera, quibus chylus conficitur, animus medentis aduertendus est. Reliqua in horum morborum historia dicentur. Non raro frequentior diuturniorque Rheii usus profuit. Imbecillitati viscerum succurrendum est abstinentia, cibo modico, potione congrua, de quibus quum saepe dictum sit, hic nihil addendum est. Ex medicamentis, post catharticorum usum, conducunt cortex Peruvianus, cortex Cascarillae, Puluis Birkmanni, martialia,

§. 367.

Sunt aliae quaedam observationes necessariae. Omnibus, qui vertigine idiopathica laborant, nocentissima sunt emetica. Si vero in sympathica os salivae plenum amarumque est, vel si acor per fauces ascendit, si stomachus exaestuatur et nausea crebriorque vomendi cupiditas aegrum vexat, scire licet, vitium esse in ventriculo, et nisi magna atque ex aliis causis orta huius visceris imbecillitas fuerit, confert protinus malam materiam, data Ipecacuanha, eiicere. Si autem stomachus resolutus est, et cibi tenax haud est, et si mali vetustas accessit, nihilque eius, quod adsumitur, concoquitur, sed omne in cruditates conuertitur, summum et vnicum aduersus hoc auxilium est in abstinentia, exercitatione et fricatione, quas viribus hominis accommodari oportet. Crebrius dandum est Rhabarbarum in pulvere. Stomachica et carminatiua calidiora minus proficiunt; meliora

liora sunt martialia et ex cydonio parata. Vitare praecipue conuenit omnem potionem fermentescentem, quippe quae in ventriculo infirmo coacescit. Potioni praestandum est decoctum Chinae ponderosae, vel alia ptisanæ compositio. Cum hac vinum mcracum vetus, leue et edentulum, cerevisia etiam valentior, qualis Anglorum est, si horum parum bibitur, non aliena sunt. Infusum Theae infirmo stomacho minus idoneum esse, obseruatio docuit.

§. 368.

Prae ceteris necessarius est cibus, non solum modicus, sed etiam morbo idoneus. Nocent omnia acria, Sinapi, Cepae, fassamenta, quae intus facile corrumpuntur, dulcia, pingua, iurulenta, lactentia, quae inflant, et maxima leguminum atque olerum pars. Aluum liberam, numquam siccam vel adstrictam esse, conuenit. Fusior autem aluus, si perpetua est, ventriculum infirmum esse ostendit. Venus pestifera est, omnisque animi contentio et perturbatio, multaque et assidua meditatio. Sanguinis missio salubris est iis, qui ex plethora vertiginosi fiunt. Tolerari potest in aliis, qui ei adfueti sunt; nocentissima est, quibus corpus valde infirmum est. Illam in infirmis diuidere oportet, ne corporis infirmitas ea adaugeatur. Si vero apoplexiae metus est, sanguinis plurimum detrahi oportet. Prima autem vertiginis curatio est exercitatio, quae semper cibum antecedere debet. Hanc etiam modicam, non nimis laboriosam, sed assiduam et quotidianam esse oportet. Proficit etiam, si tales multa peregrinatione iactantur, vel ruri sunt, vel ex grauioribus regionibus in salubriores veniunt. Somnus placidus et paullo longior utilis est, qui etiam, si res cogit, medicamentis interdum, habita tamen moderatione, arcessendus est. Vitari oportet turbatus et qui in cubiculis percalefactis capitur. Nulla fides habenda est medicamentis vulgo sic dictis cephalicis et specificis. Quo tempore aegrum vertigo corripit, is se contineat. Vbi illa in syncopen mutari videtur, id quod ex subeuntibus et quiescen-

quiescentibus arteriis sciri potest atque ex calore extincto, naribus admoueantur, quae excitant, Spiritus salis ammoniaci, sal cornu cerui volatilis, cui oleum Lauendulae vel aliud quoddam adiiciendum est. Vbi vero ex tendinum tremore, ex cognito corporis habitu, et iis, quae olim acciderunt, epilepsiae metus est: illa odora, quae excitant, aliena sunt. Aeger quietem seruet, et in loco obscuro, ab omni strepitu et luce remotus, contineatur. Si alius adstricta est, sine mora solui debet lotionem emollientem, vel Apozematē, quae vero lenissima esse debent. Caput velandum est, non tamen onerandum. Veteres, quos etiam nonnulli recentiorum imitantur, caput frigida crebrius perfundere, post fricare pectereque soliti sunt.



MORBI SOPOROSI.

§. 369.

Somnus hominem complectitur, si succus nervosus ex cortice cerebri non libere ad fibras medullares illorumque nervorum initia, quibus sensus motusque animalis praestatur, transire potest. Naturaliter hoc fit, si materia, ex qua ille subtilissimus succus conficitur, et qui sub somno perficitur, deficit. Praeter naturam autem soporatur homo, si aliquid vel in cerebro, vel in aliis partibus, vel in ipsis humidis est, quod illum huius succi transitum impedit. Grauiissimus itaque sopor est, si cerebrum premittitur in apoplexia, a qua morbi sic dicti soporosi gradu differunt. Horum morborum varia nomina sunt et anceps significatus apud optimos auctores. Vsitatiora nomina sunt: *Carus*, *Lethargus* et *Coma*, quibus nonnulli addunt *Cataphoram*. *Carus* praestantioribus Scriptoribus significat altiorē profundiorēque soporem, quo homines haud facile expergesceri queunt. Oritur ut plurimum, si sanguis post
ictum

istum vulnusque capiti illatum cerebrum premit, vel si post phrenitidem cerebri inflammatio iam in gangraenam mutatur. Interdum etiam ab ebrietate, a deuorato opio aliisque narcoticis, a fumo carbonum. Si morbi huius causa tolli nequit, neruorum distentione morteque finitur. *Coma* minor huius gradus, ita, ut homo facilius excitari queat. Vtrumque morbi genus, tum *Carus*, tum *Coma*, cum febre est, de quo tamen, ut dictum, non omnes consentiunt auctores. Diuidunt *Coma* in somnolentum et vigil. In somnolento homo vix non perpetuo somno grauatur, et minor gradus est *Cari*. *Coma* vigil dicitur, ubi homo somno deuinctus breui et repente excitatur, qui vero hoc, quem expellere non potest, mox iterum opprimitur et soporatur. *Coma* vigil ut symptoma accedit hemiplegiae, phrenitidi, febrique acutae et inflammatoriae. Hoc morbo et interrupto, ut dictum, sopore vrgetur homo, si in qua cerebri parte ex dictis occasionibus vasa praeclosa sunt, in alia vero illius visceris parte sanguis per vasa aperta perniciosiori motu traicitur, ita, ut altera cerebri pars quasi soporata, altera autem vehementius agitata esse videatur.

§. 370.

In *Lethargo* homo etiam immodico premitur somno, qui interdiu noctuque continuat, qui vero non repente aegrum obruit, sed qui pedetentim obrepit, et in dies ingrauescit. Sine febre est, superuenire tamen interdum febricula solet, quae saepe vel morbum, vel hominem tollit. Homo hoc morbo compressus, supinus, oculis per palpebras non prorsus contactis, hiant ore iacet, vix non semper dormit, expergefactus sui omniumque rerum, cibi, potionis, necessariarumque excretionum obliuiscitur. Oscitat, parum loquitur, de capitis dolore grauitateque conqueritur, et vix quaesitis respondet, mox iterum soporatur. Cum his pulsus frequens, mollis, inaequalis, languidus et tardus, tandem vndosus esse solet. Respiratio rara et debilis, aluus modo adstricta, modo fusior. Vrina cruda,
 iumen-

iumentorum lotio similis. Non raro sudor per artus extremos, quandoque per omne corpus diffunditur. Ex faucibus aliquando naribusque effertur copiosa pituita vel pus, quod ultimum suppurationem in cerebro esse significat. Morbus hic longus est, et prae ceteris senes atque infirmos occidit. Raro in iunioribus metastasis fit ad aures et parotides, et morbus harum suppuratione soluitur.

§. 371.

Ignorari non debet, esse somni critici genus, ubi aliquando homines per unum alterumque diem vix non perpetuo dormiunt, sub somno vero conualescunt. Hic vero somnus est cum aliis bonis signis, maxime post criticam euacuationem. Oritur ille somnus a defectu humoris blandi, qui sub eo instauratur. In infantibus sub somno cruditas, quae in ventriculo est, et ex qua non raro conuelluntur, coquitur, ac in bonum succum conuertitur.

§. 372.

Quum de Caro, occasione phrenitidis, et in Chirurgia, occasione vulnere capitis dictum sit, iam prae ceteris considerari debet Lethargus. Oriri is potissimum videtur a confluyente in cerebrum eiusque ventriculos sero. Sed id exitu per infundibulum et per venas iugulares prohibetur. Quandoque serum vel pus intra cerebrum et inter duram matrem repertum fuit. Serum vero ex variis sibi contrariis causis in cerebrum huiusque ventriculos contrahitur. Hoc incidit, si post magnam euacuationem, hypercatharsin, haemorrhagiam, diabetem, exigua cerebri vascula propter *νεκρωσιν* collabuntur, illorumque parietes inter se glutinantur. Dum enim tenerrimi succi transfundi requiunt, vascula illa atque receptacula ab humore a tergo veniente distenduntur, quibus medullares cerebri fibrae premuntur. Vasa cerebri ab aliis etiam causis, veluti ab assumentis spirituosis, ab opio aliisque, quibus sanguis rarefieri solet, dilatantur. In valde obesibus adeps mole sua per exterius

rius corpus vasa omnis generis premit arctatque, ita, vt sanguis redundans cerebri vasa laxiora distendat. Nec tamen horum affectuum, nec ipsius apoplexiae causa semper in cerebro est, sed saepe in aliis partibus, veluti si polypus maior, in corde et vena cava haerens, sanguinem in cor libere influere non sinit. Aliae occasiones sunt, ex quibus Lethargus oritur, catarrho vel excretionem muci per nares repente cohibita, fonticulo, cui vetustas accessit, glutinato, scabie, tinea aliisque morbis cutaneis male curatis. Ceteroquin Lethargo, praecipue chronico, magis obnoxii sunt senes, infirmi, voraces, cacochymia multaque pituita laborantes. Etiam Lethargus frequens esse solet ebriosis, praecipue iis, qui se quotidie vino adusto ingurgitant.

§. 373.

Lethargus si repente hominem corripit, efficaciora auxilia poscit. Protinus adhibendi sunt clysteres acriores, etiam ex fumo Peti, nec non suppositoria acriora ex felle tauri inspissato, diagrydio sulphurato, extracto Hellebori, quae omnia cum melle subiguntur. Cum his vero, si ventriculus laborare videtur, dandum est emeticum paullo valentius; hoc tamen liquidum esse debet, quum aeger alia deglutire nequeat. Cauendum tamen, ne vomitu cerebrum magis laedatur. Si purgantibus opus est, resina Jalappae terendo solui potest cum amygdalis. Si haec omnia non profunt, adhibenda sunt alia excitantia. Sunt, qui plantas pedum ferro candente adurunt, magnamque suppurationem mouent. Euellendi sunt pili. Naribus admouendus spiritus Salis ammoniaci cum calce viua, vel vapor ex aceto vini fortissimo super laminam ferream ignitam effuso. De Cantharidibus alibi diximus, eas proficere, si nulla febris est et nulla ex febre maligna metuenda sanguinis resolutio. Vbi pituita abundat, prodesse queunt, maxime si in vlceribus magna multaque mouetur suppuratio. Observatio tamen docuit, interdum lethargo laborantes admotis Cantharidibus non expurgisci, sed neruorum distentione commoueri.

Fere meliora sunt rubefacientia et sic dicti phoenigmi. Fonticuli et setaceum ad euocandos corruptos humores plurimum possunt.

§. 374.

De sanguinis missione ita sentio. In casibus, ubi a sanguine ex vasis suis effluente, veluti post capitis vulnera, vel etiam post apoplexiam, sopor oritur, ad eam sine mora properandum est, quam ab ea vix non omne praesidium a primis initiis petendum sit. Sed in corpore, quod iam mali habitus et longo morbo vitiatum est, et ubi in tali corpore cerebrum a sero, ex receptaculis suis erumpente, comprimitur, sanguinis detractio infirmitatem auget, immo hominem non raro occidit. Ea etiam aliena est, si in sopore cum febre vel in Comate indicia sunt, febrem per parotides aliamque metastasin solutum iri. Viris, quibus Lethargus ex suppressis haemorrhoidibus oritur, quandoque profunt hirudines. Vbi aeger in decessione expergiscitur, vtatur masticatoriis ex Mastiche et Pimpinella alba. Per errhina et ptarmica frequentius sternutamenta euocentur. Compoti etiam possunt Cucuphae. Vbi somnus non ita continens est, et aeger conualescere videtur, dari possunt discutientia et tonica: Liquor Cornu Cerui succinatus, Mixtura ex Tinctura Antimonii, Spiritu Cornu Cerui, Essentia Succini et his similia. De fonticulis et setaceis iam supra retuli.

§. 375.

Sopor ab opio ortus discutitur datis magna in copia acidis. Aqua miscenda est cum multo aceto vel succo Citri. Diu potioni quotidianae acida adiicienda sunt. Grauiissimus sopor oritur ex virulento carbonum fumo. Si enim aeger sui oblitus est, et profundo somno oppressus iacet, medetur emeticum, Gilla nempe Paracelsi seu Sal Vitrioli albi ad drachmam dimid. vel scrupulos ij. aqua soluitur et ori eius infunditur. Cum his adhibendae sunt lotiones acriores, rubefacientia, ptarmica aliaque, quibus ille expergiscitur.

APO.

A P O P L E X I A.

§. 376.

Apoplexia est repentina sensuum tum externorum, tum internorum, motusque voluntarii abolitio, a cerebri compressione, quo tempore non solum manet, sed multum etiam intenditur cordis et pulmonum actio, quippe quae a cerebello proficiscitur. Quibus hoc incidit, illi attoniti dicuntur, inter quos vero magnum discrimen est. Quandoque enim Apoplexia repente et quasi ictu fulminis hominem rapit, id quod incidit, si copiosior humor, ex ruptis receptaculis missus, ventriculum cerebri quartum implet et cerebellum premit, ex quo nervi, vitalem cordis ac pulmonum motum praestantes, educuntur. Distinguunt igitur in Apoplexiam exquisitam et leuiorem. In priori omnes animales actiones prorsus deficiunt; in altera illae laesae sunt, sed non penitus abolitae. Ex hac ultima quandoque aeger sine noxa conualescit, quandoque vero ei ex Apoplexia paralysis in qua parte manet. Haec, si vnum latus tenet, dicitur Hemiplegia, si vero omne corpus, excepto capite, resolutum est, Paraplegia, quae tamen rarius occurrit. Nonnumquam in membris manet quidam stupor, minor paralyticus gradus, et dicitur Paresis. Aliquando non artuum, sed aliarum partium muscoli resoluti sunt, veluti linguae, faucium, sphincterum ani et vesicae. Potior tamen differentia est ab humore in cerebro haerente, illudque comprimente, unde Apoplexia in sanguineam et serosam diuiditur. Raro soluitur variis excretionibus, haemorrhagia, febre, diarrhoea, sudore, immo etiam vomitu. Sedes morbi est cerebrum et huius medulla, quae comprimitur. Si vero hoc cerebello incidit, subito sequitur mors. In sectis cadaveribus, quandoque inter meninges, vel in anfractibus corticis, vel in basi calvariae, plerumque in cerebri ventriculis, in quibus plexus choroidei sunt, reperiri solet humor, vel

vel sanguis, vel serum, vel etiam pus. Non vero semper Apoplexia ab humore extra vasa missa oritur, sed saepe, si sanguis nimio motu vrget in vascula piaë matris, et ille crassior implet vascula lateralia corticis cerebri. Hinc in apoplecticis saepe nullus humor extra vasa missus, sed vasa sanguine turgida reperiuntur.

§. 377.

Necesse est, vt Medicus apoplexiam ab aliis distinguat. In ea est abolitio sensuum et motuum animalium, pulsus vero magnus est et fortis, etiam magna et fortis respiratio cum stertore, quare etiam naturalis, immo auctus calor in corpore esse solet. In Syncope vero nullus pulsus est, et nulla fere ad sensum respiratio. In Lethargo et in aliis affectibus soporosis, qui gradu fere differunt ab apoplexia, aeger acu punctus excitari potest, qui expergefactus mox iterum somno opprimitur. In magna vero apoplexia is nihil, nec acu puncturam sentit, nec vnumquam ad se redit. In catarrho suffocatiuo respiratio etiam cum stertore est et simul valde impedita, pulsus vero est debilis, tardus ac rarus, qui in apoplexia magnus et fortis esse solet, et, id quod primo loco notandum est, mens sibi constat in catarrho suffocatiuo. In epilepsia etiam omnis sensus animalis penitus abolitus est, vt aeger ne candens ferrum corpori impressum sentiat, sed tunc totum corpus conuellitur. In hemiplegia, vbi vnum latus resolutum est, alterius lateris musculi non raro conuelluntur. Vulnere capitis docuerunt, resolutis lateris dextri musculis, sinistrum cerebri hemisphaerium comprimi.

§. 378.

Quibus Apoplexia sanguinea imminet, ii conqueruntur de magno capitis dolore et eius grauitate, sopore, frequenti diuturnaque vertigine, tremore inter somnum, de incubo, venae iugulares tument, oculi illacrymantur rubentque, homo sentit aliquam quasi temulentiam, vertiginem, modo
ocu-

oculorum caliginem et tenebras, modo splendores iis obuer-
santes, aurium tinnitum, formicantem in artubus sensum,
interdum etiam vox tremula fit et balbutiens, vrina aerugi-
nosa, atra, cum multo sedimento κρημνώδε. Etiam caus-
farum notitia morbum futurum esse ostendit, veluti si homo
plenus nimia exercitatione, potione valentiori, medicamen-
tis calidioribus, sanguinis vehementiorem perniciosiorem-
que motum conceitavit: vel si pulsus inaequalis, intermittens,
extremorum frigus, ostendunt polypum in corde haerere.
Vbi vero motus increfcit, sentiunt aegri in se ipsis subita-
neam mutationem, σκοροδνίαν, vertiginem, qui tandem
concidunt, omnemque sensum et motum animaleam amit-
tunt, quibus muscoli, qui in spasticis morbis rigidi manent,
flaccidi sunt. Cor palpitāt, arteriae pulsant, pulsus magnus
est et rarus, respiratio magna cum stertore, facies rubet,
oculi torui sunt. Quo fortior celeriorque est pulsus, et
quo maior et profundior respiratio, et quo cum maiore haec
est stertore, eo maius est periculum. Nam si totum cere-
brum ita compressum est, vt nullus sanguis per illud trañci
possit, huius maior modus pellitur ad cerebellum, ex qua
re fortior atque velocior cordis pulmonumque motus sequi-
tur; sed quoniam ille sanguis non omnis per cerebrum libe-
re moveri potest, tandem etiam huius vasa praecluduntur,
fit obstructio, et sequitur mors. Post mortem caput rubi-
cundum ad sensum saepe intumescit, quia sanguis, qui per
arterias carotides internas et vertebrales diuidi nequit, ad
capitis exteriora fertur. Nonnumquam sanguis ex auribus,
naribus, ore erumpit.

§. 379.

Apoplexiae sanguineae obnoxii fiunt ii, quibus cere-
brum, fracta caluaria, vel hac etiam integra manente,
commotum, et in eo receptaculum quoddam ruptum fuit.
Praeter hos, de quibus in Chirurgia dicendum, attoniti fiunt
ii, quibus vasa cerebri a quacumque ratione nimium disten-
duntur, vel prorsus rumpuntur. Nam tum a sic dilatatis

vasis, tum a sanguine aliisque humidis, qui ex suis receptaculis emittuntur, premuntur fibrae medullares. Non raro corruptus humor acriorque factus tenerrima vascula rodit et exedit. Apoplexiae igitur saepe occasionem dat plethora; obesitas, nimius sanguis, nimia quies et torpor, haemorrhagiae suppressae, victus lautus multoque aromate conditus, ebrietas, Venus, animi perturbatio, compressio iugularium, compressio arteriae aortae a nimis distento ventriculo in voracioribus, malum hypochondriacum, polypus vel in corde eiusque vasis, vel in sinibus durae matris, tumores varii, tum intus in cerebro nati, tum extrinsecus venas iugulares prementes, sanguinis diathesis crassior, vel ex inflammatione, vel viscida ex cacochymia, vel ex atra bile. Sanguis vero acrior fit in hypochondriacis vel atra bile laborantibus, in iis, quibus sudores repente fuerunt cohibiti, nec non quibus scabies, fonticulus, ulcera chronica fuerunt male curata, vel quibus podagra fuit repressa. Is vero acrior rodit atque exedit tenerrima in cerebro vascula, ut sic humor ex iis effluat et nervorum principia premat. Multum etiam confert aer, eiusque vicissitudines, maxime si aëre humido corpora relaxantur. Quare hyeme et sub frigore humido hic morbus frequentior est, id quod tamen de apoplexia serosa prae altera intelligendum. Ex vomitu vehementi, ab adsumtis etiam venenis, maxime iis, quibus sanguis vel repente cogitur, vel praeter modum attenuatur, etiam oritur apoplexia. Prius ab acidis mineralibus sanguini admixtis, posterius ab opio fieri observatio ostendit. Si quis in conelavi, ubi multus crocus est, versatur, vel in eo dormit, metuere potest apoplexiam, quae etiam in cellis vinariis a musto fermentescente oritur. Omne, quod in sanguine coagula polypo similia efficere potest, huic morbo gignendo idoneum videtur.

§. 380.

Periculosissimus morbus est apoplexia exquisita, quae nonnumquam ictu quasi fulminis aegrum rapit. Saepe

finitur

fnitur spatio vnus vel alterius diei. Si aeger intra viginti quatuor horas ad se non redit, nulla plerumque spes est. Manet interdum paralysis artuum inferiorum, id quod incidere videtur, si morbi materia ex capite etiam per ventriculum cerebri quantum in fistulam facram vel vertebrarum thecam defluit. Respiratio, si valde magna est, profunda et rara, minus tamen aequalis, sed impedita, inter peiora signa esse solet. Pessimum vero signum est stertor, rhonchus et oris spuma. Haec vehementiori respiratione ex pulmone effertur. Si respiratio non ita magna est, sed celerior, et si accedit febris pulsusque paullo celerior, et aeger non prorsus soporatus est, sed aliquem sensum habet, melior spes esse solet. A febre tamen plus sperandum in serosa, quam sanguinea. Lethalis est apoplexia a febre acuta, vel ab epilepsia relicta, nec non cui superuenit nervorum distentio. Magnus etiam metus est, si sudor frigidus vel ex toto corpore, vel ex aliquo membro effertur. Reliqua prognosis ex aetate, corporis habitu, causis et aliis depromitur. Malum si etiam superatum fuit, frequentius reuertitur. Ex eo aegri non raro imbecilli fiunt, pusillanimes, et qui ex leui data occasione illacrymantur. Nonnumquam apoplexia soluitur haemorrhagia magna, haemorrhoidibus, vrina multa atque crassa, sudore multo, aequali, calido, rarissime diarrhoea.

§. 381.

In curatione maxima spes est in apoplexia sanguinea, si protinus sanguinis maior copia detrahatur. Sanguinis libra vna, atque in corpore pleno cum semisse, detrahenda est protinus, et quidem, vbi iam brachium resolutum est, ex eo ipso affecto membro. Si corpus valde plethoricum est, breui post sanguis iterum mitti debet ex talo. Si autem facies multum rubet et tumet, incidi potest iugularis. Haec vero si incidenda est, non fascia constringi debet, sed digito saltem comprimi. Sunt nonnulli, qui arteriotomen praeferunt in temporibus. Post has sanguinis missiones ite-

rum venam in talo incidi conuenit, quae semper plagis maioribus aperiri oportet. Alienam minusque efficacem esse, reor, sectionem venae frontalis vel raninae. Etiam concisa in occipitio cute, admoeri possunt cucurbitulae.

§. 382.

His praemissis alius ducenda est lotione vel solutione Salis cathartici. Vitanda sunt in clysteribus acriora, metus enim est, ne, dum spasmos excitant, sanguis maiori motu versus superiora caputque, quod iam grauatur, feratur. Si aegro deglutiendi facultas superest, dari potest decoctum Tamarindorum, Cremoris Tartari, foliorum Sennae, Salis cathartici, et lotio nihilo minus in aluum potest infundi. De his clysteribus tenendum est, eorum modum non ita magnum esse debere, et nimium calorem nocere posse. Cum his adhiberi debent alia excitantia. Admoueatur naribus spiritus Salis ammoniaci, Sal anglicum volatile cum oleo Lauendulae; pedibus superhabeantur fomenta calida et humida; videndum vero, ne pedes refrigerent, et ne nimis calor, ex his vel ex frictione natus, sanguinis motum adaugeat. Nonnulli extrema lino constringunt, et sanguini reditum per venas praeccludunt. Pro sunt omnis generis rubefacientia, ipsumque ferrum ignitum plantis pedum imprimendum, nisi hoc crudele videatur.

§. 383.

Quia plerumque deglutitio laesa est, aliena sunt medicamenta ex pulueribus composita, vel alia acriora, quae tussim excitare possunt. Fere optimum est, in apoplexia sanguinea, nitrum aqua solutum, vel aqua quaedam destillata cum aceto destillato remixta. De medicamentis calidis, vulgo cephalicis dictis, in apoplexiae sanguineae curatione ita statuendum, illis febrem excitari. Sed quamuis febris quandoque saluberrima sit, si ea a natura mota fuerit, et ad auertendam paralyin plurimum faciat; saepe tamen, si mox ab initio his medicamentis calidis sanguis cietur, periculum nasci-

nascitur, ne caussa paralyseos augeatur, dum a commoto sanguine vasa intumescunt, vel dum huius maior modus ex ruptis vasis effertur.

§. 384.

Apoplexia serosa dicitur, quando cerebrum non sanguine, sed redundante sero atque pituita grauatur, quibus etiam interdum vasa distenduntur; longe frequentius autem cerebrum eiusque partes premuntur, quod ille humor ex ruptis vel dilatatis vasis lymphaticis elatus fuit. Hoc genus frequens est senibus, cacochymicis et cachecticis, quibus viscera imbecilla sunt, et qui glutinoso spontaneo viscidaque pituita abundant. Ipsa tamen plethora, sanguinis excretionibus cohibitae, sanguinis missiones neglectae, plurimum conferre possunt, prout alibi observatum est, morbos serosos ex sanguineis oriri. Etiam occasio datur, si ulcera, scabies, tinea, similesque morbi non recte fuerunt curati. Si corpus torpido otio, moerore, nimio litterarum studio, Venere, ebriositate, repletionem imbecillum factum est; vel si primas vias cruditas onerat, si polypus in maioribus venis et in durae matris sinubus haeret, sanguinis motus impeditior fit, et nonnumquam sanguis, nonnumquam etiam serum ex vasis cerebri erumpit.

§. 385.

Quibus haec apoplexia imminet, illi cachectici sunt, colore lurido, anorexia et vomitu frequenti pituitae laborant. Vbi morbus aegrum iam tenet, apoplexia serosa a sanguinea dignoscitur non solum ex hominis aetate et corporis habitu, sed maxime ex colore faciei, qui, ut dictum est, in sanguinea valde rubicundus, in serosa pallidus esse solet. Paralysis illaque pusillanimitas fere frequentius ex hac serosa relinquitur, quam ex sanguinea. Soluitur interdum vomitu, deiectione, magno sudore, rarius catarrho. In curatione excitandus est aeger. Pili euellendi, volatilia naribus admonenda, rubefacientia, supra occasione Lethargi proposita, imponenda sunt. Si ex quotidiano victu et regimine

gimine aegri suspicio est, ventriculum plenum esse crudatum, dari possunt, quibus vomitus mouetur. Non tamen facile drasticeis vtendum, quum ipsa agitatio, quae cum vomitu sit, exasperari possit. De Gilla Paracelsi supra dictum, quae aqua solui et dari potest. Simul adhiberi debent clysteres acriores cum Peto, agarico, colocynthide, vel etiam cum Tartaro emetico.

§. 386.

Postquam ad se redit aeger, debent dari discutientia, Sal volatile oleosum Sylui, Liquor cornu cerui succinatus, Spiritus cornu cerui cum essentia Succini, Liquor anodynus Hoffmanni, addito pauco Balsamo vitae, quibus, si fieri potest, febris excitari debet. Non aliena est Tinctura Coralliorum cum liquore anodyno et spiritu bezoardico. Si vero aucto pulsu, crescente febre, aeger non meliuscuius est, sed si in eo imbecillitas augetur, ab his desistendum est. Singularem vsum praestant vesicatoria processibus mastoideis et nuchae admota; profunt etiam masticatoria et fricationes inferiorum, spinaeque dorsi cum linteis asperioribus et cum vnguento neruino, cui Balsamum Peruvianum et olea destillata, Lauendulae, Salviae, Caryophyllorum, Macis adiiciantur. Ab initio necessaria est abstinencia, post cibis conuenit, qui boni succi est, aromate conditus. Nichil vtilius est, quam totius corporis et praecipue membrorum paralyticorum exercitatio; adhiberi etiam conuenit fricatio. Post aliquot dies quoque aluus duci debet cathartico satis valente, non vero acri, ex Foliis Sennae, Rhabarbaro, Manna, Cremore Tartari. Nec pilulae alienae sunt, ex massa Pilularum de Succino Cratonis, ex Mercurio dulci, ex Extracto panchymagogo Crollii aliisque. Profunt sorbitiones ex herba Betonicae, Salviae, feminibus Coriandri, Cubebarum, &c. Tale infusum horis matutinis in lectulo, adiectis supra dictis misturis, sorbendum est et sudor mouendus. Conualescanti vitanda est impletio, cruditas, ebrietas, negotiosa actio; Venus praeceteris pestifera est, et omne, quod facere potest, vt morbus reuertatur.

PARA-

P A R A L Y S I S.

§. 387.

Paralysis dicitur, si naturalis illa vis in musculis deficit, ita, vt illi membra nec mouere, nec etiam, si haec ab alio homine in altum tolluntur, sustinere possint, quippe qui simul marcescunt, flaccidi fiunt atque aridi. Latinis dicitur neruorum resolutio. Nam ex aliis etiam causis et sine resolutione nonnumquam mouendi facultas musculorum amittitur, veluti si articuli contracti sunt, quod vitium *αγκύλας* Graeci vocant, vel si membrum gangraena affectum, post vero ita curatum fuit, vt omnis tunica adiposa, non solum ea, quae sub cute, sed etiam, quae inter musculos est, suppuratione fuerit corrupta atque vlcere exesa. Plerumque in membris resolutis cum motu etiam perit sensus et oritur *ἀναισθησία*. Rarius obseruatum fuit illud hemiplegiae genus, in quo in vno latere motus, manente sensu, in altero sensus, relicta mouendi potestate, fuit abolitus, cuius exemplum ab HEISTERO propositum vide in *Ephem. Nat. Curios. Cent. II. Obseru. 196.* Gradu differt Paralysis. Si saltem stupor relictus est, Paresin vocant. Plures tamen hoc nomen tribuunt illi intestinorum atoniae, quae ex colica conuulsiva post vsum narcoticorum relinquatur. De Paraplegia et Hemiplegia supra dictum fuit. Paralyticus morbus est catarrhus suffocatiuus. Interdum homo per omnia membra resolutus est. Interdum vero hoc vitium infestat non nisi certos musculos, linguae, pharyngis, sphincterum vesicae et ani. Quid inde sequatur, quilibet, qui harum partium functiones non ignorat, scire potest.

§. 388.

Musculus autem resolutus est, si in eo vel succus nervosus, vel sanguis arteriosus deficit, eumque haud permanat. Imbecillitas alia nascitur, si illa naturalis, quae in omnibus

omnibus fibris est, vis, et qua earum elementa inter se committuntur atque cohaerent, defecta est. Resolutio itaque vel paralyfis oritur, si cerebrum atque medulla spinalis, ex quibus nervi procedunt, premuntur, vel suppuratione, ulcere, vulnere, aliaque ratione laeduntur. Alia paralyfis est, si non tam nervorum initia, quam hi ipsi ab inflatis tunicis, quibus illi comprehenduntur, vrgentur arctanturque. Illa enim inuolucra etiam arterias venasque sanguinem ferentes habent, quae inflammari aliaque ratione intumescere possunt. Laxior cohaesio elementorum frequens admodum est, quae si non veram paralyfin facit, eam tamen non parum adauget. Paralyfis igitur relinquitur ab apoplexia, si calvaria vel vertebrae fractae atque depressoae fuerunt. Etiam per morbos soporosos nascitur, si humor in cerebro ex suis receptaculis emissus viam inuenit in fistulam sacram, seu illud cauum peruium, quod in vertebris est, et medullam spinalem comprehendit. Illae tunicae, quibus nervi comprehenduntur, intumescunt, si illarum minima vascula a mala materia, quae in ea conuertitur, praecluduntur. Hoc accidit interdum iis, qui sudorem, tanto magis criticum, repente reprimunt, qui humentibus vestibus induti, magnum refrigerium patiuntur, qui in grauibz locis, veluti in agro Romano, aestate vel autumnio sub diu dormiunt, qui articulorum dolores, arthritidem et podagram, superhabitis externis, discutiunt, qui cum aëre halitus venenatos, metallicos, praecipue ex plumbo et argento viuo per ignem eleuatos, hauriunt. Scorbuticis peculiare huius resolutionis genus est, quod primum dentes, post alias etiam partes infestat, et quod nomine singulari *σμελοτύρβη* dicitur. Hoc a resolutis nervis maxillaribus quinti paris oriri probabile est. De colica Pictonum, quam alii Saturninam vocant, quae resolutione brachiorum finitur, infra dicendum erit. Tandem etiam Paralyfis oritur in corporibus cacochymicis, Venere exhaustis, si his naturale fibrarum robur deficit. Vehementioribus diuturnioribusque spasmis, convulsionibus, epilepsia tandem nervos resolui, rarum

non est. Ceteroquin paralyfin parere possunt varia, quibus nervi extrinsecus comprimuntur, varii generis tumores, luxationes et fracturae, nec non si in vulneribus illi nervi praeciduntur. Ex fractis vertebrae compressaque spinali medulla paralyfin oriri necesse est.

§. 389.

Anatomicorum diligentia notatum fuit, male affectis certis in cerebro sedibus resolui certos in corpore nervos. A compressis thalamis nervorum opticorum oritur amaurosis, quae nihil aliud est, quam paralyfis nervi optici et retinae. Si sanguis ex plexu choroideo vnius ventriculorum anteriorum emittitur, ille premit corpus callosum et sequitur abolitio sensuum omnium. Corpus enim callosum animae sedem esse, pluribus experimentis post alios nuper probavit *de la PEYRONIE*, Chirurgus Gallus, in *Comment. Acad. Reg. Scient. anno 1741*. Ceteroquin humor ferossus, qui in ventriculos anteriores contrahitur, viam apertam habet ad ventriculum tertium. In hoc infundibulum est, per quod lymphæ ad glandulam pituitariam et per exiles ductus ad sinus venosos durae matris permanat. Vbi vero hic exitus praeclusus est, ex tertio ventriculo aditus datur ad quartum per illum aquaeductum Sylvii, qui sub illis quatuor tuberculis est, quae testes natesque vulgo ab Anatomicis vocantur. Haec vero via naturaliter aperta non est: nam quo minus humor ex tertio in quartum ventriculum descendere possit, obstat valvula magna cerebri. Hanc autem exsuperans humidum tandem perrumpit, ita, ut ventriculus quartus etiam non raro distendatur. Hoc si incidit, cerebellum premitur, et mors in propinquo est, nisi humor iterum, perrupta pia matre, viam inueniat in illud cauum, quod in vertebrae inter has atque medullam spinalem relictum est. Hoc si incidit, oritur paralyfis artuum inferiorum, et si humor ad supremas usque vertebrae in illa fistula sacra vertebrae adscendit, Paraplegia, quod ultimum genus paralyseos rarissimum est. Ceteroquin si dextrum cerebri hemi-

hemisphaerium ab humore vel inter caluariam atque meninges, vel in ventriculo anteriori premitur, lateris sinistri musculi resolvuntur. Vid. *Experimenta anatomica Petri MOETNELLI*, in *Actis Bononiensibus* p. 239. Plura alia experimenta a Chirurgis proposita leguntur. Conf. *de la PEYRONIE* l. s. cit. Ex observatione *WILLISII de Anima brutorum Cap. IX. p. 106.* laesis corporibus striatis resolvuntur crura; conf. *HEISTERI Dissertat. de Paralyseos ratione anatomica.* Ex arteriarum vitio oritur paralytis, si maior arteria, veluti in aneurismatis Chirurgia, secta atque deligata fuit, et si maiores musculi ab exiguis arteriis sanguinem accipiunt. Membra tunc evanescunt, atque mumiae instar arida fiunt. Vid. notabile exemplum in *van SWIETEN Commentar. Tom. I. ad §. 161.*

§. 390.

Paralysin futuram indicat vertigo, ab initio mitior, quae vero mox grauior reuertitur, oculorum caligo, auditus gravitas, sensuum internorum hebetudo et sensus quidam formicans in membris. Paralytis iam praesens cognoscitur ex supra dictis notis. In spasmis musculus contractus et ad sensum durus est, in paralyti flaccidus. Sed paralytis nonnumquam ex distentione vel contractione antagonistarum cognoscitur. Si enim musculus resolutus est, eius antagonista maiori vi adducitur atque contrahitur. Hoc in musculis zygomaticis, in sterno, mastoideis aliisque, frequentius occurrit, oculisque conspicitur. Si vero quae incidere possint in futurum praesagire vult Medicus, debet et hominem, et ipsum morbum considerare. Spes est, resoluta membra sana fieri posse, si malum recens est. Finitur interdum paralytis nervorum distentione, frequentius aliqua excretionem, vomitu, deiectione, sanguinis profusione, sudore, pustulis varii generis. Quae a cerebro male affecto proficiscitur, semper peior est, quam quae a nervis eorumque velamentorum tumore oritur. Melior illa, quae in

corpo-

corpore descendit, quam quae adscendit. Si malo recenti mox ab initio febris accedit, illud interdum tollitur, saepe vero, praecipue si aliquid cerebrum infestat et si febris ingrauescit, mors sequitur. Interdum paralyfin subita animi commotione, praecipue terrore, solutam fuisse legimus. Raro ad sanitatem perueniunt membra vehementer et ita resoluta, ut et sensus et motus abolitus sit. Si illa frigida sunt atque subito emarcescunt, nihil spei superest. Maximum periculum esse solet in hemiplegia, si vnum latus calet, alterum friget. Si in membro arteria maxima, ejusque, quod aiunt, truncus praecisus est, vel ita compressus, ut sanguini nullus ad membrum sit aditus, maxime si nullae aliae minoresque arteriae sic dictae laterales ad illud membrum feruntur, necesse esse, hoc emori et sphacelum oriri. Id quoque interdum incidit, si membrum vehementer atque adeo resolutum fuit, ut, defecta in arteriarum tunicis aliisque partibus vitali virtute, sanguis per eas transfundi nequeat, qui, dum quiescit, putrescere incipit. Neruorum musculorumque actione sanguinis motum, tum per arterias, tum etiam per venas plurimum iuari, multis experimentis compertum est. Paralysis ex ebrietate vel veneno orta, plerumque stuporem magnamque imbecillitatem relinquit. Quibus ex Venere immodica et ex gonorrhoea longa nervi resoluuntur, non facile ad sanitatem perueniunt. Si membro et resolutis musculis manet naturalis calor, si illi non emacrescunt, et si non omni sensu orbati sunt, sed si aeger in eo aliquid, quod formicarum currentium motui simile est, sentit, sperare possumus sanitatem. Maiorem securitatem pollicetur calor, qui si exstinctus fuerat, membro reddit, accedente etiam dolore, et si vterque, et calor et dolor, indies magis increbrescit. Tremor etiam membri resoluti bonum signum est, qui in homine sano paralyfin futuram esse saepe indicat.

§. 391.

In curanda paralyfi, quae ex cerebro orta fuit, observanda sunt omnia, quae supra de apoplexia proposita sunt.

P

Animus

Animus enim ad causas aduertendus est. Sanguinis missio prodest in apoplexia sanguinea mox ab initio: nocere potest in paralyfi iam confirmata, tanto magis in senibus, alio morbo confectis, nec non si vitium a causis externis, repressa Podagra, imbecillitate, primarum viarum cruditate ortum fuit. Sanguis optime mittitur ex membro resolutio. Haemorrhoidariis hirudines aliaque auxilia extrinsecus ad-mouenda sunt, quibus illud sanguinis profluuium potest re-uocari. Si febris accedit, moderatio adhibenda est, illa-que nec prorsus extinguenda, nec tamen nimis incendenda est. Febrem concitare et resolutionem iuuare possunt in-fusa et decocta meraciora, herbae Betonicae, Melissae, Sal-uae, florum Lauendulae, Anthos, Liliorum conuallium, feminis Foeniculi, Coriandri, Anisi, Baccarum Lauri et Iuniperi, corticis Winterani, Aurantiorum, Ligni Sassa-fras &c. Cum his etiam dari possunt Sal volatile oleosum Syluii, Spiritus bezoardicus Buffii, addito Balsamo vitae Hoffmanni, Essentia alexipharmaca cum Essentia Succini, Liqueur cornu cerui succinatus et his similia. Sub horum tamen vsu leniori medicamento, veluti Rhabbarbaro, pur-gandae sunt primae viae. Vbi venter suppressus est et de-iectio medicamentis peti non potest, vel victu vtendum est humidante, vel lotionibus mollientibus.

§. 392.

Ex causa praegressa, errore in victu, accedente nau-sea atque crebra vomendi cupiditate, intelligitur, paralyfin a cruditate primarum viarum fuisse contractam. Aduersus hanc ab initio plurimum valet lene emeticum, ex Tartaro emetico, ex Oxymelle squillitico. Iterari potest post ali-quod tempus hoc medicamentum, et interea illud Oxymel squilliticum sine alio vehementiori emetico adhiberi. Quan-doque in intestinis crassioribus magna vis coactae pituitae haeret, ad quam euocandam prosunt clysteres, quibus ad-misceri possunt aliquot grana circiter IV. V. VI. Tartari emetici. Tartarus emeticus, bene tritus, commode melle vel

vel oxymelle excipitur, cui accuratius miscendus est. Si his nondum purgatae fuerunt primae viae, dari debent cathartica per epicrasin laxantia, vel Pilulae, quibus extractum Hellebori nigri, extractum panchymagogum Crollii, Agaricus trochiscatus, admisceri possunt. Profunt etiam plurimum Pilulae cum Gummi ammoniaco. In his casibus saepe multum proficiunt Thermae et Acidulae, quae, si humor in caluaria haeret, vel si malum a magna solidarum imbecillitate profectum fuit, quandoque malum adaugent. Si vero his sumtis euacuantibus homo viribus deficitur, ab iis abstinendum est, vel adhibenda sunt moderatiora. Raro feliciter cessit ptyalismus Mercurio concitatus. Plures, paralyses per sudores curaturi, aegrum decocto meraciori ligni Guaiaci, Sassafras, radicum Bardanae, Chinae, per aliquod tempus implent, et sudorem in lectulo, vel etiam in laconico, mouent, post linteis tepesactis singula membra detergant, resoluta vero membra et dorso spinam admodum fricant, etiam infra dicendis compositionibus inungunt. Haec curatio summam prudentiam et moderationem exigit, ne, moto vehementius sanguine, vitium adaugeatur. In his curationibus necessaria est abstinencia, cibus paucus, quae facile concoquitur. Pestifera sunt viscida et glutinosa, quae crassiorem pituitam faciunt. Potioni praestandum est vinum meracum, sed paucum, vel cereuisia meracior. Omni vero studio vitet homo repletionem et ebrietatem. Saepissime paralytici ceteris voraciores sunt, qui celerius consumuntur. Homo cauere debet vespertinum frigus, meridianum Solem, nubilum coelum, prae ceteris aerae stagnorem. Pestilentissima est Venus; somnus, qui in cubiculo percalesceto capitur, morbum hunc facere vel multum exasperare potest.


§. 393.

Quod vero ad auxilia attinet, quae extrinsecus admodum veri possunt, a quibus non raro magnum praesidium est, illa negligenda non sunt. Vbi paralytis orta fuit ab ulceri-

P a

bus

bus male curatis, scabie et podagra, plurimum proficit frictio cum linteis asperioribus. Magnus etiam usus est balneorum ex fragrantioribus herbis compositorum, Thermarum praecipue, si hae ab alto in torpens membrum destillant. Praeterea cum frictione adhibenda sunt alia excitantia, cucurbitulae; euellendi sunt pili, cutis caedenda est vrticis, superaddenda sunt rubefaciencia, cantharides, et alia, quae proposuimus. Ipsa vero medicamenta, quae extrinsecus adhibenda sunt, pro aetate atque corporis habitu varia sunt. Iunioribus plenis et sueco turgidis conducunt spirituosae: Spiritus vini camphoratus, Spiritus lumbricorum terrestrium, formicarum, Spiritus matricalis, Serpilli, &c. Senibus vero et macilentis, quibus cutis iam arida et flaccida est, magis prosunt vnguenta. Vnctioni aptissimum est, si vnguento neruino, quod prostat, adiciuntur olea destillata cum balsamo Peruiano. Sunt, qui vtrumque genus, spiritus et olea, inter se miscent.



MORBI

MORBI PECTORIS.

ASTHMA.

§. 394.

Asthmate dicitur laborare homo, si aliquid in pulmonibus vel praecordiis est, quod sanguinis transitum per pulmones impedit, ex quo oritur respiratio difficilis, frequens, densa, cum scapularum motu, sibilo et stertore, summa anxietate et praefocationis metu. Nonnumquam tussicula accedit, aliquando haec fiunt sine tussi. Minor gradus dicitur Dyspnoea, summus vero gradus, ubi aeger non nisi recta ceruice erectoque corpore spiritum trahit, Orthopnoea. In Apnoea omnis respiratio sublata est. Initia morbi haec sunt: Homo sentit pectoris grauitatem tarditatemque ad opus solitum; anxia fit et anhelosa respiratio, praecipue vero, dum is accliuia adscendit, vel currit; stertit vigilans, tanto magis inter somnum. Lectuli calorem aegre ferre potest, et duriora stragula praefert, quod incalescente corpore sanguis citatur. Accedit raucitas et tussis, cum nulla sputi reiectione. Vbi vero malum se intendit, difficultas spirandi hominem fere ex toto strangulat, qui, summa anxietate oppressus, apertis fenestris liberrimam respirationem quaerit. Facies tumet et sanguine turget, oculi prominent. Non tamen omni tempore aeger tam vehementer afficitur, sed remissionem habet. Exasperatur autem asthma plerumque horis vespertinis. In nonnullis certo tempore reuertitur, et periodicum dicitur. Non semper tamen asthmatis sedes in pectore est, sed saepe in ventriculo, immo interdum in utroque, quandoque in hypochondriis. Vltimum dicitur asthma flatulentum, quod ab asthma pectoris et ventriculi distinguitur. Inflato ventri-

culo et colo, diaphragmatis motum impediri nemo ignorat, sed celerius id agunt spasmi, quibus respirationis organa stringuntur. Si male afficitur ventriculus, eius cardia, et prae ceteris diaphragma, Asthma cum summo strangulationis metu est. Distinguitur ceteroquin Asthma in humidum et spasticum seu convulsivum. Differt a catarrho suffocatio. In Asthmate humido vox stridula est, sed clara; in Asthmate spastico vox acuta est, et propter angustias, per quas spiritus euadit, sibilus eliditur. In catarrho suffocatio vox suppressa est, ut vix intelligi possit, et accedit stertor et rhonchus. In asthmate pulsus velox et febrilis est, exspiratio satis bona, inspiratio impedita. In catarrho suffocatio pulsus est tardus, debilis ac rarus, accedit summa virium prostratio. In hysterica passione, quae cum asthmate plurimum conuenit, magis fauces, quam pectus, constringuntur. In hac omnis anxietas et spirandi difficultas ructu soluitur.

§. 395.

Asthma humidum nascitur ex lento viscidoque humore, qui pulmonum vesiculas, nonnumquam etiam cum his ventriculum, et saepe utrumque viscus onerat. Oritur ab omnibus, ex quibus in humidis viscidum et glutinosum spontaneum adaugetur. Si affecti sunt pulmones, multa tussis est cum reiectione pituitae; si vero ventriculus laborat, accedit nausea, praecordiorum anxietas cum tussi, frequentior vomitus, et exacerbatio fit aliquot horis post pastum. Morbus, si inualefcit, difficilius curatur, praecipue in senibus et infirmis. Finitur catarrho suffocatio et hydropse pectoris. In curatione asthmatis humidi, mucus attenuandus, euacuandus et partibus solidis robur reddendum est. Materiam mobilem reddant et incidunt vegetabilia acriora: radix Ari, Pimpinellae albae, Angelicae, Aristolochiae, Caryophyllatae; flores Chamomillae, semina Foeniculi, Anisi stellati, cortex Winteranus, baccae Iuniperi &c. Ex his fieri possunt sorbitiones calidae vel decocta, vel, additis pur-

purgantibus, radice Bryoniae, Agarico, Sale cathartico, foliis Sennae, Noduli laxantes. Efficacissimum est ad pituitam soluendam Gummi Ammoniacum, quod in varii generis misturis dari potest. Si ab his omnibus vomitus cum euphoria sequitur, spes est. Pilulis etiam, v. g. Becheri, admisceri potest Squilla, vel in puluere, vel in Extracto ad gr. IV. V. pro dosi. Extractum de Peto, quod ex aqua coquitur, et ad minimum sexies iterum soluitur, ac totidem iterum inspissatur, si ad gr. ij-iiij datur, efficacissime resoluit.

§. 396.

Praemissis his resoluentibus, si materia non valde copiosa est, illa per pectus educitur, et adhibenda sunt illa expectorantia. Si vero illius maior vis pulmones occupat, educenda est per purgantia. Dari possunt Pilulae de Succino Cratonis, de Gummi ammoniaco Foresti, aliaeque compositiones. Multi vsus sunt infusa vinosa per epicrasin laxantia, ex radice Ari, Pimpinellae albae, Vincetoxici, Aristolochiae rotundae, Valerianae, Ireos Florentinae; herbis Marrubii albi, Fumariae, Trifolii fibrini; baccis Lauri; cortice Winterano; radice Bryoniae, Rhabbarbari; foliis Sennae, Agarico. Infirmis prosunt pulueres ex Rheo et Sale cathartico, qui iteratis vicibus et per aliquot dies dari debent, nec non Apozemata ex Sale cathartico, Sena, vel valde infirmis ex Manna cum Cremore Tartari. Durante tamen ipsa exacerbatione, et purgantia, et alia efficaciora remedia non sine periculo dantur, et metuenda est suffocatio. Si vero in vehementiori insultu huius maior metus est, protinus aluum liquari oportet lotionem, iteratis etiam vicibus in aluum immissa. Admoueri possunt primo scapulis, post etiam artubus et suris cucurbitulae. Prosunt pediluua, phoenigmi, fomenta, et quae alia conditione laudata fuerunt. Intus dari potest mel cum aqua destillata, addito Syrupode Althaea, vel Capillorum Veneris.

§. 397.

Si materia tenacior et viscidior est, aliena sunt purgantia, nec minus acriora incidentia, vegetabilia. Profunt lubricantia, decoctum Glycyrrhizae, Passularum, Caricarum pinguium cum Syrupo de Althaea, Capillorum Veneris, nec non emulsiones ex semine Cardui Mariae, Papaveris, et dictis Syrupis. Dari etiam potest acetum squilliticum, oxymel squilliticum, in quo Gummi Ammoniacy scrupulus dimidijs solui potest. Nec aliena est mixtura ex partibus tribus Essentiae Glycyrrhizae, addita parte vna Essent. Pimpinellae.

§. 398.

Sub his omnibus victus curiosior necessarius est. Multum nocet aer paludosus, vel humidus, coelumque graue, necessarius est montanus, serenus et siccus. Ex obseruatione HOFFMANNI his salubrior est aer varijs et sulphureis lithanthracum halitibus foetus. Aer grauis et humidus corrigitur suffimigijs, igne, lithanthracibus, accensis lignis aromaticis, veluti Iuniperi. In victu nocent omnia viscida et glutinosa, ex farina et butyro pista, pisces, carnes tenaciores pinguiioresque. Profunt iura, croco vel alio aromate condita, carnes iuniorum animalium, panis bene fermentatus, leuis, cum seminibus Anisi, Carui, Foeniculi commixtus beneque coctus. Potioni praestanda est aqua, si fieri potest, fontana, ptisana ex radice Chinae et cortice Cassiae. Vinum concedi potest paucum, sed meracum. Coena nulla esse debet, vel admodum modica, cum horis vespertinis potissimum noua exacerbatio metuenda sit. Saluberrima est corporis exercitatio, numquam vero post partum, vbi metum suffocationis facere potest.

§. 399.

Si his auxilijs morbus vel superatur, vel leuatur, videndum est, vt pulmonibus robur reddatur. Id quod quandoque difficile est, praecipue in senibus, et si iam morbi
vetustas

vetustas accessit. Dari possunt infusa aquosa ex herbis Veronicae, Hyssopi, Scabiosae, Millefolii, femine Foeniculi, Anisi stellati. STAHLIUS extollit aquam viridem pectoralem. Si aegro sudores nocturni manare incipiunt, is monendus est, vt sollicite eos bono regimine excipiat, quum iis non raro Asthma tollatur, vel ad minimum multum leuetur.



ASTHMA SICCV M.

§. 400.

Ia dicitur, quod esse solet cum tussi sicca, ita, vt nulla, vel pauca pituita reiiciatur. Variis debetur caussis. Si sanguinis transitus per pulmones ex quacumque occasione impeditus est, et si hoc etiam incidit in aliis partibus, veluti in diaphragmate, ventriculo, colo, aliisque in visceribus diaphragmati subiectis. Frequens morbus est gibberosus, nec non quibus polypus in corde, vomica et scirrhus in pulmonibus est; quibus pulmones a vaporibus metallicis, sulphureis, ex antimonio, arsenico, mercurio, nec non a pulvere lapidicidarum stringuntur, tandemque indurescunt et scirrhusi fiunt. Est tamen quaedam differentia. Nam id maxime ex his caussis pedetentim ortum, nonnumquam perpetuum esse solet, nonnumquam vero, si id a mensium et haemorrhoidum obstructione natum fuit, iterum evanescit, mox tamen redit, et hominem per intervalla strangulat. Quandoque quasi acutum est, et aegrum repente rapit, praecipue id a repressis exanthematibus et male curatis vlceribus ortum fuit; si a polypo oritur, cor multum palpitare solet. Palpitatio non tamen semper polypum praesentem significat, sed etiam ab aliis partibus male affectis et varii generis spasmis oritur. Asthmatici etiam sunt pueri post variolas malignas. Etiam oritur post repres-

P 5

sam

sam podagram, vel post tussim narcoticis curatam. Morbus hic saepe pertinax est, nullamque curationem recipit, si caussa tolli nequit. Tandem degenerat in hydropem pectoris. Si tussis sicca in humidam mutatur, cum euphoria et virium integritate, id bonum est; si vero cum hac tussi humida aeger de magna infirmitate conqueritur, et haec indies magis increfcit, mors instat.

§. 401.

Asthmatis sicci curatio ab initio requirit aluum ducentia. Utendum vero est mitioribus et lubricantibus. Igitur conducunt clysteres et Apozemata ex Tamarindis, Passulis, Manna, Cremore Tartari. Nec in hoc asthmatis genere, inter ipsas angustias atque anhelationem, venter solui debet medicamentis intus sumendis. Lotiones vero omni tempore salutare sunt. His praemissis considerandae sunt caussae. Si in pulmonibus nimia siccitas est, dari debent lubricantia, emulsiones, decocta auenae excorticatae, hordei excorticati, iuscula carnum iuniorum, vitulinae, et pullorum cum cancris fluuiatilibus, et si malum pertinax est, lac asininum per multum tempus potandum. Efficaciora lubricantia sunt succus Glycyrrhizae; decocta caricarum pinguium, fructuum Sebesten, varii generis Syrupi: Syrupus de Erysimo Lobelii, de Farfara, de Althaea, Capillorum Veneris, quibus admisceri potest Diacodium Montani. Notandum tamen est, dulcium nimio diuturniorique usu nimis laxari et infirmari pulmones, ita, vt tandem phlegma non ex pulmonibus, sed ex corpore per pulmones euocetur.

§. 402.

Si asthma ex febre male curata relinquitur, haec, si fieri potest, reuocanda est. Danda sunt decocta resolutentia ex radice Foeniculi, Glycyrrhizae, Polypodii, Vinctoxici, Caryophyllatae; herba Scordii, Cardui benedicti, Veronicae, Capillorum Veneris; semine Foeniculi et similibus. Si nihil aliud est, quod id prohibeat, etiam infusa

per

per epicrasin laxantia ad febrem iterum incendendam multum possunt. Si asthma ortum fuit a scabie, proficiunt decocta ex Sassaaparilla, Bardana, Scorzonera, China, ligno Sassafras, semine Foeniculi, et cum his pulueres ex Antimonio diaphoretico, additis aliquot granis florum Sulphuris, vel reguli antimonii medicinalis. In phlegmaticis hominibus dari potest Tinctura Antimonii cum Essentia Succhini, et Essentia alexipharmaca. Valde infirmis, ex scabie repressa laborantibus, plurimum profuit serum lactis, ex quo decoquatur herba Fumariae, cuius quotidie aeger libram vnam alteramque bibat. Asthma lapidicidarum tollunt lubricantia, et praecipue lactis diuturnior vsus.

§. 403.

Asthma tandem spasticum, in quo diaphragma potissimum conuellitur, est cum orthopnoea, faciei et oculorum tumore, et maximo suffocationis periculo. Hoc reliquis generibus magis acutum magisque periculosum est, et saepe neruorum distentione per vniuersum corpus finitur. Et huius variae causae sunt. Tumores et scirrhi in pulmonibus, nec non in visceribus abdominis, maxime hepate, polypus in corde, haemorrhoidum et menstruorum obstructio. In imbecillis repente admissum refrigerium, et sudor cohibitus, potus frigidus, aliena et irritantia, quae in ventriculo haerent, praecipue pituita acrior et tenax, ori superiori ventriculi inhaerescens, animi commotio, maxime ira et terror, hysterica passio. Gibberosius frequentius asthmatici sunt, tum propter pectoris angustias, tum propter neruorum spinalium compressionem, quos cum intercostalibus committi Anatome docet. His modo dictis occasionibus hic morbus, si homo eodem iam laborauit, reuocari et exasperari solet. In senibus saepe in catarrhum suffocatum degenerat. Morbus saepe hereditarius est.

§. 404.


In curatione, et ipso vehementiori insultu, protinus adhibendi sunt clysteres emollientes, non valde aeres, quos iterari

iterari oportet. Si corpus valde plethoricum est, vel etiam, id quod non raro incidit, si morbus ortus fuit a repentina menstruorum, per terrorem, refrigerium, aliasque causas, suppressione, sanguis mittendus est ex talo ad libram vnam et ultra: Si vero morbus iam adoleuit, et frequentius rediit, sanguinis detractio sub ipsa exacerbatione nocet et morbum pertinaciorem reddit. Aegro propinari potest aqua, in qua nitrum solutum fuit, vel liquor anodynus Hoffmanni cum spiritu bezoardico. Adhiberi debent frictiones pedum, cucurbitulae, Sinapismi, et alia supra laudata. Semper considerari debent causae.

§. 405.

Nonnunquam asthma oritur, quod parum a spastico differt, si in ventriculo humor acidus vel rancidus, vel tenacior pituita est. Ventriculus enim nervis abundat et in *καρδια* inseritur par octauum. Aegri tussi vexantur et sentiunt stricturem etiam in summo pectore, quae proficiscitur a spasmoe oesophagi. Exacerbatio fit plerumque post pastum et post assumpta cruda, fermentescencia, vel rancescentia, a quibus stomachus exaestuat. Leuatur vomitu, ruetu, diarrhoea. Male agitur cum tali aegro, si ei expectorantia exhibentur. Hoc asthma tollunt abstergentia et euacuantia. Vomitoria non semper tuta sunt, praecipue si iam robur in ventriculo deficit. Si tamen hoc opportunum visum fuerit, dari potest robustioribus oxymel cum Tartaro emetico, vel etiam radix Ipecacuanhae. Aliis conueniunt digestiua, aliquoties per diem deglutienda. Horis vespertinis cum his detur Rhabarbarum in puluere ad gr. xxv. cum Cremore Tartari vel Sale cathartico. Haec per tres quatuorue dies continentur, et interpositis aliis diebus repetantur. Etiam dari potest per vnum alterumque diem aqua amara vulgo dicta, seu salsa Seydschüzensis (vulgo *Bit-ter-Wasser*). Si malum adoleuit et refractarium est, id optime tollunt Thermae Carolinae, vel aquae minerales paullo

paullo efficaciore. Nec aliena sunt infusa per epicrasin laxantia. Victus tenuior et parcius imperandus est. Plurimum proficit, si aeger a potu fermentescente abstinat.



T V S S I S.

§. 406.

Est vehemens, crebrior, interrupta et sonora explosio aëris ex aspera arteria per glottidem, et cum aëre saepe pituitae aliusque humidi, quod ex vesiculis pulmonum, bronchiis et aspera arteria huc fertur. Nemo ignorat, hoc cum magna pectoris, diaphragmatis et totius corporis agitatione fieri. Distingui solet tussis in humidam, siccam et conuulsivam, a parte affecta in pectoralem, stomachicam et hypochondriacam. Idiopathica est, cuius causa haeret in aspera arteria. Sympathica, cuius causa in alia sede, veluti in ventriculo et hypochondriis est. Humida, in qua serum, pituita, pus alique humores, varium etiam colorem habentes, extussuntur; arida vel sicca, in qua nihil vel parum extussitur, quae ob id maiorem habet difficultatem et dolorem. Haec, et conuulsiva, ex variis causis, ex spastica thoracis et diaphragmatis contractione, a materia acirheumatica, nascitur; quae acrior materia et lymphæ, ut probabile est, ex glandulis bronchialibus, tum in asperam arteriam, tum in oesophagum destillat. Vid. LANCISIUS *Tr. de Corde*. Tussis etiam sicca contrahitur, si ventriculus a quacunque re, veneno, ab acri materia, flatu, bile, acido, afficitur, vel adsumtis oneratur, quae tussis saepe ructu, vomitu soluitur. Par octauum nervorum, quod cum intercostali conspirat, et a quo pulmones nervos accipiunt, in ventriculi *cardiac* inferitur. Oritur etiam ex obstructione viscerum abdominis, praecipue hepatis, huiusque tumore. Tussim etiam movent omnia, quibus fauces

ces irritantur, nec non alia, quae supra de Asthmate exsequutus sum. Frequentior est infantibus et senibus. Infantibus enim nerui sunt, qui facile commouentur. Senes abundant acri viscidaque pituita. Nonnumquam infantes, dum dentes gignuntur, multum tussunt. In morbis acutis tussis nonnumquam neruorum distentione finitur. Est tussis ab initio arida, post humida, quae in nonnullis hominibus certo tempore reuertitur, quae si toleratur, nullaque medicatione turbatur, utilis esse solet. Non raro tussis epidemica est, et cum catarrhis homines infestat. Tussis si vetus et perpetua fere facta est, tandem asthmate, et non raro in senibus catarrho suffocatio finitur.

§. 407.

Tussis conuulsiva, Gallis *la Coqueluche*, est omnium pertinacissima, non raro epidemica, et infantibus prae adultis frequentior. Est cum summo praefocationis metu, pulsu forti et celeri, faciei tumore et rubore, oculis prominentibus, et, qui saepius superuenire solet, cum vomitu assumptorum. Interdum mutatur in neruorum distentionem, nonnumquam in atrophiam et maciem. Et quoniam omnia assumpta vomitu reiciuntur, quandoque morte finitur. Princeps eius sedes est in ventriculo, et huius *καρδιά*, cui acrior tenaciorque pituita inhaeret, quae, in sectis corporibus, tum in ventriculo, tum etiam in aspera arteria inuenta fuit.

§. 408.

Si vero praeuidendae sunt causae, tussim faciunt omnia, quibus nerui diaphragmatis, musculorum thoracis, partium vicinarum, faucium et pulmonum, stomachi atque ventriculi irritantur. Quare tussunt plethorici post paullo vehementiorem exercitationem, quoniam sanguis non libere per pulmones traicitur. Idem fit ab aspiratione aëris vel nimis frigidi, vel nimis calidi, quo pulmones constringuntur, vel nimium siccantur, ab aëre, variis effluuiis acidis, metallicis, etiam vario puluere referto, a potu et aliis adsumptis frigi-

frigidis, ab omnibus, quibus gula et ventriculus afficitur. Tussi etiam vexantur infirmi, sub tempestatibus, quae aequales non sunt, sed multum variant, praecipue si corpora calore relaxata subito frigore excipiuntur, et si ex aliis occasionibus sudor atque exspiratio, quae per cutim atque pulmones fieri solet, repente cohibentur. Idem accidit, si humidis mala materia admixta est. In morbis exanthematicis, variolis, morbillis, antequam per pustulas papulasque cutis exasperatur, aegrum tussis et vomitus male habent. Tussis etiam non raro post superatos hos morbos continuatur, si humida non prorsus integra facta sunt, sed in iis aliquid malae materiae superest. Ea etiam infestat alios, quibus menses aut haemorrhoides non proueniunt, quibus suppuratio in externis vulneribus vlceribusque cohibita fuit, vel tinea, scabies prohibita, rheumatici atque arthritici dolores externis impositis curati, quorum morborum mala materia in pectus conuertitur. A vomica, tuberculis scirrhisque, ab exulceratione pulmonum in phthisi, ab humore corrupto in caëochymia, nec non ab hydropse pectoris, a rebus, quae in glottidem illapsae sunt, et asperam arteriam offendunt, tussim oriri, quotidianum est. Hanc nonnumquam peregrina concitant. Noui exemplum, vbi tussis ferina a frustulo vitri deglutiti, per aliquot menses in ventriculo haerente, hominem male habuit, donec illud tandem tussiendo et superueniente vomitu fuerit elisum. Nonnumquam tussis mouetur a vermibus aluum occupantibus. Causas etiam certis notis distinguere possumus. Si tussicula lenis est et sonus magis acutus, atque aeger aliquem sensum in faucibus percipit, materia haeret in larynge et suprema asperae arteriae parte. Si vero aeger molestiam sentit in ipso pectore, si, dum paullo altius spiritum trahit, mox tussis mouetur, et si spirandi difficultas quauis ac leuiori exercitatione citatoque paullulum sanguine intenditur; si sonitus quasi ex alto venit atque raucus est, intelligere possumus, pulmonem laborare. Si his omnibus vesperi febricula accedit, nihil vero extussitur, pulmones tubercula obsident.

Si

Si autem homo sine difficultate spirare potest, sonus etiam quasi ex profundo fertur, sub scrobiculo cordis dolor et cum hoc nausea est, atque omnia post deglutitum cibum vel potum exasperantur, tussis fertur ex ventriculo. Hypochondriorum morbus, cui non raro ferina tussis etiam accedit, suas notas habet.

§. 409.

Tussis, tanto magis quae vetus facta est, in senibus et imbecillis semper metum facit, praecipue, si macies magnaue imbecillitas accedunt. In gravidis ex tussi vehementius vrgente fieri potest abortus, aliis hernia; in plethoricis haemoptoe, in infantibus neruorum distentio tussim interdum sequitur. Salutaris est, qua pituita cocta excrescitur, et sub qua vires non decedunt, sed augentur. In peripneumonia salutare est, si cruenta pituita extussitur. Quae cum exulceratione pulmonum est, et a viscerum etiam abdominis obstructione, praecipue hepatis et lienis scirrho orta, raro eliditur, sed superueniente febricula tabem mortemque infert.

§. 410.

In curanda tussi humida, cuius sedes in pectore est, saepe praestat nihil agere, quum non raro melius sponte finiatur. Si vero tussis pertinacior aegrum infestat, corrigenda est materia, vel acrior, vel tenacior, illique vehementior adfluxus auertendus, et tandem, si necessarium fuit, motus ipse sopiendus est. Si materia valde acris est, qua pulmones nimium irritantur, vt tandem asthmatis vel exulcerationis metus esse possit, adhibenda sunt lenientia iam supra laudata, iuscula ex auena excorticata, hordeo excorticato, emulsiones, decocta radicis Glycyrrhizae, Altheae, Scorzonerae, herbae Parietariae, Maluae, Violarum, florum Papaueris rhoeados, Chamomillae, Verbasci, nec non oleum Amygdalarum dulcium, Sperma ceti, etc. Dari etiam potest Syrupus Capillorum Veneris cum infuso herbae Theae et plantarum pectoralium.

§. 411.

§. 411.

Vbi materia tenuior est, multi vtuntur decoctis sic dictis pectoralibus, quae ex fructibus dulcibus aëre siccatis, caricis pinguibus, passulis, fructibus Sebesten parantur. Videndum vero est, ne dulcia vegetabilia acorem augeant. Decocta etiam haec facile fermentescunt. Efficacius pituitam tenacem resoluit Oxymel squilliticum, nec non Gummi ammoniacum, de quibus sub Asthmate dictum, quae multum nocere possunt, vbi pulmo valde infirmus est, vel si eum vomica obsidet. Multum etiam proficit mixtura ex essentia Glycyrrhizae cum essentia Pimpinellae, quae simul resoluit et pulmonem roborat. Lubricandis pulmonibus etiam externa auxilia conueniunt, si vel solius calidae, vel decocti emollientis vapor per infundibulum ore adducitur, vt is ad pulmones cum tracto spiritu perueniat.

§. 412.

Materiae vero aditus a pulmonibus auerti potest, ab initio catarrhi, qui fere semper cum aliqua febre ordiri solet. Si seruetur in hac regimen, cum ea medendi ratione, quam de febre catarrhali praecepimus, tussis auerti potest. Vbi vero iam tussis hominem vexat, eaque adoleuit, materia autem abundat, adhibenda sunt sub finem laxantia, Massa Pilularum Becheri cum Gummi Ammoniaco, vel etiam in debilioribus pulueres ex Rhabbarbaro et Sale cathartico, Apozemata ex decocto Rhabbarbari et foliorum Sennae. Praemissis euacuantibus dari potest mixtura tonica, ex Tinctura Antimonii et spiritu Cornu Cerui, vel spiritu Salis ammoniaci anisato; Essentia Succini, cum Essentia Pimpinellae et his similia. Inprimis vero conducit Cascarella, quae cum lapidibus Cancrorum cum acido citri dari potest. Omnibus efficacior esse solet Massa Pilularum de Cynoglossa ad gr. j-ij. pro dosi, quae admisceri potest pulueribus et Pilulis. Ad haec tamen remedia non nimis cito properandum est. Nam metus esse potest, ne, cohibita tussi, mala materia in pulmonibus retineatur.

Q

§. 413.

§. 413.

Tussis sicca eandem curationem postulat, quam asthma siccum, et haec semper accommodanda est caussis. Sanguis mittendus est, si a plethora; si a scabie repressa, illa reuocanda est, dato Sulphure vel Aethiope minerali, de quibus suo loco.

§. 414.

In tussi, quae ex stomacho oritur, obseruanda sunt, quae de Asthmate stomachali dixi. Tussis hypochondriacorum nonnumquam prodromus hecticæ est, de qua infra dicetur. De Tussi phthysicorum propediem dicendum erit. In omni tussi euitanda sunt adstringentia, quae saepe infarctum pariunt. Sales, qui stimulant et tussim concitant, nimium expectorantia et lubricantia, quae et pulmones et ventriculum nimis laxant, etiam absorbentia, quibus viscida pituita tenacior minusque mobilis redditur. Si tussis quaecunque, maxime ferina, adeo vrget, vt praefocationis metus sit, mox sanguis ex incisa vena mittendus est, quo id periculum auertitur. Non tamen praeter necessitatem id fieri debere, intelligitur. In tussis conuulsivæ curatione non minus properandum est; Sales pituitam attenuantes, Terra foliata Tartari eiusque Liquor, Arcanum duplicatum, Tartarus tartarifatus, per plures dies dari debent, et his iungi Rheum. Hoc tamen tussis genus saepe longum esse solet, quod tempore, paucis vero datis medicamentis, vincitur. Opus est modicis ac temperatis cibis. Victus omnis vel rerum non naturalium vsus omnibus adcommo-
dandus est. De quo iam saepe diximus.



RAUCITAS.

§. 415.

Symptoma est, vbi vox praeter naturam rauca fit et suppressa. Sedes est in larynge, si haec non glabra, sed aspera est, id quod inflatis etiam tibiis incidit, quae si laeves non sunt, asperiores sonum referunt. Est vel acuta, vel chronica. Acuta oritur ab inflammatione musculorum et membranarum, ab humoris serosi et acris destillatione, praesertim a subito frigore calenti vel sudanti corpori admissio, et ab aëris gelidi aspiratione, sub cantu, declamatione, aliaue vel pectoris vel totius corporis exercitatione, ab acri et acido halitu et aëre frigido, nec non a siti. Chronicam saepe facit glandularum arytaenoidearum obstructio, quarum succo larynx interius lubricatur. Hac raucitate laborant pueri rhachitici, quandoque venerei et scorbutici, quibus catarrhi male curati sunt, et inflammatio refrigerantibus curata. Obseruata fuit raucedo ex potu frigido et glaciato. Ex malis etiam vlceribus, praecipue venereis, exulcerantur tonsillae, et roditur cartilagineum tunica seu perichondrium, quod vitium nullam curationem recipit. Nec omittendum est, omnem vocem suppressi in iis, quibus nervus recurrens dissectus, vel alio modo laesus fuit. Phthisicis, cachecticis, ante mortem vox etiam rauca fieri solet. In morbillis, si incidit, malae materiae insignem acrimoniam significat. Etiam a vermibus raucitatem ortam fuisse legimus, id quod ex consensu nerui intercostalis atque vagi fieri posse, probabile est, et hysteriarum raucitate confirmatur.

§. 416.

Ex causarum notitia curatio petenda est. Vitium, quod ab assumptis acidis et austeris ortum est, tollitur lubricantibus, decocto aenae excorticatae, hordei excorticati,

Q 2

emul-

emulsionibus, Syrupo de Althaea cum Diacodio Montani et similibus. Si vitium oritur a ventriculo et ructus acidi efferruntur, dari potest magnesia aliaque absorbentia, et ventriculus aquis mineralibus eluendus est, aliisque percurandus, de quibus protinus dicam. Catarrhi suis auxiliis tolluntur. Morbus venereus non nisi propriis auxiliis curatur. Chronica rævitas si inueteravit, difficilius tollitur, praecipue in senibus. Experiri licet iuscula carniū iuniorum, ex quibus coquuntur herbae recentes: Cardui benedicti, Chaerophylli, Cochleariae, vel radices Petroselini, Apii, Cichorii. Haec iuscula quotidie per mensem et ultra horis matutinis forberi debent. Multum extollunt Aethiopem mineralem, cuius bis per diem aliquot grana, vj-viij. dari possunt. Parari vero is debet non per solam trituram Sulphuris et Mercurii, sed adhibito etiam igne. In corporibus macilentis proficit lac, praecipue asinum vel solum, vel cum aquis Selteranis. Gargarismi etiam adhiberi possunt his causis accommodati. Efficaciter pituitam tenacem resoluit Essentia Pimpinellae albae, si eius pauciores guttulae frustulo Sacchari excipiuntur et deglutiuntur. Lubricandis faucibus inseruiunt, quae ex radice Althaeae et Glycyrrhizae parantur.



VOMICA PVLMONVM.

§. 417.

Vomica est abscessus vel vlcus reconditum, quod quasi velamento suo inclusum haeret in medio pulmone. Differt a Phthisi, in qua vlcus apertum est, et vera exulceratio pulmonum. Empyema, quod plures cum vomica confundunt, proprie abscessum in pleura significat. Vomica a primis initiis difficilius cognoscitur, praecipue, si illa minor vel plures minores adsunt, et si illa non tam sanguini-

sanguinem, quam alium concretum humorem, veluti pituitam continet. Talis saepe per plures annos sine magna noxa in pulmonibus haeret. Vbi vero tumor increfcit, tunica, quae malam materiam comprehendit, pedetentim distenditur, et homo dyspnoea, tussicula sicca, febricula vaga, cum aliqua imbecillitate, laborare incipit, tandemque tussis sicca in humidam vertitur. Ad extremum vomica rumpitur, et pus, si tumor in parte exteriori pulmonis fuerit, effluit in pectus, vel si in interioribus pulmonum haeserit, fertur in asperam arteriam. Si maior puris modus est, illud asperam arteriam praeccludit et hominem repente strangulat. Etiam hoc fieri potest a maxima mole puris in pectus effluentis, quo pulmo ita comprimitur, ut spiritum trahere non possit. Minor vero vomica plerumque in phthisin degenerat. Raro eiusmodi vlcus sanescit. Si in pulmone dura et scirrhusa tubercula sunt, corporis habitus non minus corrumpitur, et homo tabe consumitur, quod illa tubercula sanguinis cursum per pulmones eiusque perfectionem prohibent. Rarissimum est vomicam purulentam solui per metastasin, et pus per urinam vel aluum efferri. Hoc, quod natura raro molitur, numquam Medicus imitari debet.

§. 418.

Relinquitur vomica ex peripneumonia, si febris sine coctionis signis, manentibus eius quibusdam reliquiis, minuitur, ex haemoptysi, praecipue si aduersus hanc adstringentia valentiora et refrigerantia fuerunt adhibita, ex vulneribus illatis, ex morbis catarrhalibus et tussi, si haec sopientibus curata fuerit. Qui sudantes vel ab exercitatione venientes frigidam sitienter bibunt, et inflammationes et haec tubercula facere possunt. Omnis vero vomicae finis est, ut maturescat et rumpatur, quod celerius fit, si sanguis magna multaque corporis exercitatione, aucto pulmonum motu, cantu, cachinno, scretu, febre, assumtis calidis, potu valentiori, ira, aliisque citatur.

Q 3

§. 419.

§. 419.

Si iam in pulmone malae materiae coitus factus est, et vomica orta, illa dissipari nequit; si ex caussarum notitia, ex impedita respiratione, tussicula, aliisque signis intelligimus, talem esse in pulmone, abstinendum est ab omnibus, quae mox inter causas relata fuerunt, praecipue a cantu et declamatione, a cursu omnique exercitatione, a refrigerio pectoris et pedum, a potu meraco, ut et calido, ab emollientibus et sic dictis expectorantibus, a Thermis, Acidulis, omnibusque, quibus sanguis calefcere potest. Si vires permittunt, et febris nondum superuenit, sanguis mittendus est saepius ex talo, aliusque ducenda remediis lenioribus, Tamarindis, Passulis, Manna, foliis Sennae. Vitanda sunt omnia acria et salsa. Victus sit modicus, ex imbecillissima materia, atque fere necessaria est abstinentia a fame propior, ut corpus diminuatur. Potioni praestandum est decoctum hordei, Scorzonerae, quibus etiam, si eorum copia est, adiaci possunt poma dulcia. Lac, quod in aliis pectoris morbis saluberrimum est, vomicae rupturam maturat.

§. 420.

Huius rei maior metus est, si febricula accedit, quae aliquot horis post sumtum cibum incurfat. Tunc non facilis reditus ad sanitatem est abstinentia; potioni praestanda aqua vel ptisana. Cauendus est cibus inrulentus. Danda sunt temperantia, praecipue Corallia vel Lapides cancerum cum succo Citri, addito paucio nitro. Vbi tandem vomica rumpitur, et maior puris modus non protinus omnem spiritum elidit, intueri oportet id, quod exferatur, et totum etiam corporis habitum. Pus, si bonum est, coctum, flauescens, non ita copiosum, si respirationis non maxima difficultas est, si homo viribus nondum defectus cibum adpetit, et ex hoc refectioem sentit, spes est, illum feruari posse. Si vero spirandi difficultas magis et magis intenditur, si vires decedunt, si pus huiusmodi est, coeno-

noenofum, nigricans, male olens, graue et quod in aqua defidit, fi in dies magis corpus tenuatur, hominem Phthifis tenet funefta.

§. 221.

Si vomica rupta eft, quantum fieri poteft Medico enitendum, vt vlcus purgetur glutineturque, id quod difficilimum eſſe ex modo dictis adparet. Ad id neceſſarium eſt, vt homo vtatur victu curioſo, vt cibo modico et qui ad morbum idoneus eſt, aëris etiam puri, liquidi, adſpiratione ſuſtineatur. Abſtineat ab omni victu animali. Repurgato prius corpore per leniora cathartica, ex Manna, Tamarindis, foliis Sennae et ſimilibus, is vtatur lacte cum pane candido et potione non alia, quam ex aqua, ptifana, vel ſero lactis. Vitam debilem viuat et corpus ita exerceat, vt numquam ſanguis multum cieatur; praecipue in aëre ſereno et ſalubri conducit equitatio, nauigatio, vectio in curru, geſtatio. Si vero tuſſicula ſicca fit, et nihil cum hac exſcreatur, cum his vero ſpirandi difficultas et praecordiorum dolor ingraueſcit, danda ſunt, quae faciunt, vt mala materia lubricetur, et tuſſi extundatur. Ad id vtilia ſunt expectorantia alibi laudata, emulſiones, decocta et Syrupi. Ne vero et his infirmitas pulmonum adaugeatur, cauendum eſt. Vbi vlcus putum eſſe videtur, conueniant ſorbtiones ex herbis, v. g. Millefolio, Veronica, Chaerephyllo; floribus Roſarum rubrarum, quae etiam commode ex ſero lactis coquuntur. Plures fidem ſuam addixerunt Balfamis exoticis, Peruviano, de Copaiua, et praecipue de Mecha. Quid vero haec efficiant, is intelligit, qui ex vulnerum vicerumque externis curationibus non ignorat, quantum ab his ſperari poſſit. Balfama haec, et eorum quidem vna alteraque guttula, ouo ſorbili admiſceri poteſt, vel eum amygdalis dulcibus conteri, vt fiat emulſio. Sunt qui extollunt flores Sulphuris, Rubinum Sulphuris Rulandi ad gr. j. ij. iij. pro doſi. Conſeruam roſarum rubrarum antiquam ad aliquot drachmas, herbas adſtringentes, Virgam auream,

Veronicam, Pilosellam, Arnicam, Saniculam, Vrticam minorem, Alehimillam, radicem Symphyti, flores Hyperici, &c. quibus vero minus fidendum est. Sunt ex recentioribus, qui laudant Corticem Peruvianum, ad quem non tamen temere properandum. Ille, ut videtur, proficere potest in corporibus, quorum viscera et ipsi pulmones atonia laborant. Si vero iam hoc vlcus infestat, ad huius curationem parum conferre poterit. De sanguinis missione illud tenendum, illam salutarem imo necessariam esse iis, qui sine febre et sine magna imbecillitate sunt, qui sanguine abundant, et quibus sanguinem statis temporibus detrahi iam consuetudo facta est. Ea vero, si febricula iam orta fuit, nocet, quam in omni febre hectica pestilentissimam esse supra retuli. In his et aliis morbis plurimum prodest animus compositus; morbum vero exasperant et aegrum celerius praecipitant ira, metus atque desperatio.



P H T H I S I S.

§. 422.

Est vlcus pulmonum late serpens, totum pulmonem, tandemque omnem corporis habitum, orta tabe, corrumpens. Phthisis vix de alio, quam de pulmonis vlcere dici solet, quamvis ceteroquin vocabulum ex etymo nihil aliud, quam tabem, significet. Hectica vero dicitur, si vlcus est in aliis sedibus et visceribus. Aliud genus est, quod sine vlcere corpus consumit, veluti tabes Britannica, quae oritur, si humida corporis, ipseque sanguis non recte coactus, sed rarior est, cum solidarum summa imbecillitate, ob quam causam omnia tandem degenerant. Febris vero, quae vlceri superuenire solet, et aegrum tandem extorret, non alia est, quam hectica, de qua supra diximus. Magnum discrimen est inter huius, de quo nunc agendum est, morbi

morbi initio, et si is iam intulit. Videndum est, ne pro vera phthisi habeamus alios morbos, tussim, catarrhum diuturnum, asthma, stomachi vitia, et quae sunt alia. Nam nonnumquam in his quoque morbis materia excreatur extussiturque. Qui vero phthisi vera laborant, nec spiritum trahere, nec eum lente et aequabiliter reddere possunt. Materia, quae reiiicitur, aquae admiscenda est. Pituita huic innatat, pus desidit. Hoc carbonibus candentibus impositum foetet. Vix non omnes phthifici tussunt, raro pulmones sine tussi exulcerantur. Increcente morbo, phthifici cruenta extussunt, ut puri paucus sanguis admixtus sit. Genae roseo colore, praecipue post sumtum cibum, conspicuae, sanguinis tenuitatem atque cum hac acrimoniam ostendunt; tandem accedit febris, quae vel incurrat, vel intenditur tertia quartaque hora post prandium, quo tempore novus chylus sanguini adfunditur, et hac tandem aeger emacrescit. Non tamen semper tussis pituitam purulentam trahit, sed nonnumquam, si pulmones materia calcaria repleti sunt, sicca est, id quod etiam incidit, si tabes non ex qua exulceratione, sed ex cachexia humorumque non recte confectorum vitio nata fuit. Si phthisis inueteravit, homo, summa macie extenuatus, habet articulos rigidos, pedes tumidos, cutem pustulis exasperatam, accedit defluviū pilorum, et tandem sudores vel deiectiones sic dictae colliquatiuae superueniunt. Interdum homines subito vel suffocantur, vel exhausti extinguuntur, orta haemoptoe, si qua arteria vel vena in ulcere excisa ruptaque fuit. Nonnumquam pulmo malo ulcere excesus inflammatur, et inflammatio in gangraenam atque sphacelum fertur, id quod pus foetidum, frigidum, cadauerosum, significat.

S. 423.

Huic morbo praeter ceteris obnoxii sunt homines imbecilli, plethorici, quibus corpus gracile est et procerum, collum oblongum, pectus pressum atque angustum, quibus pueris sanguis multum et saepe ex naribus fluxit, quibus

catarrhi acriores, acres destillationes in pulmonibus frequentes sunt. Morbi huius est quaedam contagio, maxime inter coniuges sub iisdem stragulis incalescentes, nec non propagatio in sobolem, et interdum phthisis certis familiis quasi gentilitia est. Ex haemoptoë et variis causis nascitur, quas occasione haemoptoës et vomicae adduximus. Occasionem dare potest sanguinis transitus per pulmones impeditior, si illi aduerso vento currentibus nimis distenduntur (Germ. *das Versangen*). Etiam occasionem dare potest pectoris vulnus, praecipue si adhibita fuerunt medicamenta sanguinem sistentia. Nonnumquam mala materia ex aliis corporis sedibus in pulmonem conuertitur, si lippitudines chronicae, ulcera, quibus vetustas accessit, reprimentibus curata fuerunt. Ob id etiam a malignis variolis et morbillis phthisis relinquitur. Foeminis grauem hunc morbum, aliquando etiam lippitudines chronicas cum dentium casu, affert fucus ex Cinnabari vel Mercurio sublimato paratus. Periclitantur etiam foeminae, si fluor albus repente, praecipue externis, sistitur.

§. 424.

Morbus raro curationem recipit, et non nisi inter initia. Difficile enim est mederi exulcerationi, quae est in viscere membranoso, quod perpetuo motu concutitur, et in quo, praeter aëra, copiosissimus sanguinis omnisque generis humidum conluit. Ab initio tamen, si nulla febris est, si sputum album est, lenè et vniusmodi, et si causam auertere possumus, veluti menstruorum et haemorrhoidum vitia, si licet aëra victumque mutare, quandoque spes esse solet. Ex phthisi, quae orta fuit ex labe pulmonibus villata, veluti ex vulnere, ex haemoptoë per cantum aliasque similes violentas occasiones excitata, homines interdum ad sanitatem perducuntur, ad minimum facilius, quam si illa ab acrimonia, aliisque occasionibus intus haerentibus, nata fuit. Foeminae, quibus ex catameniorum obstructione sanguis sursum erumpit, si haec haemoptoë periodica est, et

et cum catameniis conspirat, minus periclitantur quam viri. De tussi notandum in genere, illam necessariam esse ad vlcus purgandum et quo mala materia ea extundatur. Ast vero tussi etiam pulmo contunditur, humores ad vlcus inuitantur, hocque exasperatur. Celerius moriuntur phthifici, si tussis valde humida est, et multam pituitam purulentaque trahit. Pessima est, quam haemoptoë relinquit. Etiam de haemoptoë illud in genere addendum, si sanguis confertim et maiori in copia in pulmones fertur, illam non ita mortiferam esse, quam si is sensim, sed sine intermissione, erumpit. Prius enim per anastomosis fieri probabile est, alterum per *diæβæσιν*. Si etiam vera phthisis hominem tenet, si haec nondum inueterauit, si nulla adhuc febris accessit, et ventriculus appetit ac digerit ita, vt cibus in eo nec coacescat, nec corrumpatur, ita vt lac ferre possit, is ad sanitatem perducitur potest. Plurimum terrere potest febris, si illa accedit, quamuis haec quandoque per aliquod tempus quiescat. Ad vltima ventum esse testatur, febris assidua, et vrina, ex qua crassa subsidunt, pus cum sanguine concretum et male olens. Protinus moritur aeger, qui in hoc morbo pus exspuit, multum iam vero ex toto spuerit. Ver et autumnus saepe tabidos opprimant.

§. 425.

Optimum praesidium ab initio huius morbi petendum est a victus ratione. Cibus valentior, falsus, acris, aromaticus, nec non qui ex virulentis, piscibus, onis, facile corrumpitur, potus fermentescens, valentior, alienus est. Aëris vicissitudines, maxime etiam animi perturbationes et Venus plurimum nocent. Alius interdum duenda, non tamen aliis remediis, quam lenissimis, lotionibus mollientibus, Tamarindis, Passulis, Manna. Vbi tussis copiosam pituitam cum purulenta trahit, dari interdum potest Rhabbarum in puluere, cui aliquot grana nitri addici possunt. Si febris nondum tenet, aegro, tanto magis, si eius rei consuetudo facta fuit, sanguinis parum mitti potest ex talo, idque

que interdum repeti. Parum praesidii a medicamentis peti potest, plurimum a victu ex solo lacte, si id ferre potest ventriculus, id vero potari debet ruri, in aëre sereno, aperto, puro et montano, quod lac etiam misceri potest vel cum aqua Selterana, vel cum decoctio hordei. Si lac in ventriculo cogitur, anxietatem parit. Tunc id vel omitti debet, vel eius non nisi parum bibendum. Coagulum vero resoluit Sapo Venetus, si eius aliquot grana cum lacte deglutiuntur. Si alius siccior est, illum lubricant ex saccharo parata, Iulapium rosatum, vel Syrupus quidam, veluti de Rosis pallidis, de floribus Persicorum. Interdum dari possunt iuscula carniū iuniorum, maxime pullorum, cum cancris fluuiatilibus, qui viui et recens contundendi sunt, nec non cum Cochleis, Ostreis et Testudinibus, quae Iurulenta interdum proficiunt, si lac in ventriculo coacescit, id quod accidit, vbi hypochondriacus morbus cum pulmonum labe est. Illa autem aliena sunt, vbi iam febre conflictatur homo. Nec aduersus febrem inueniri possunt auxilia. Sunt, qui cum MORTONO, Britannico scriptore, corticem Peruuianum extollant, et huius per diem vnam alteramque drachmam deuorandam suadēant, id quod vero non semper bene cedit. Ceteris remediis tolerabiliora sunt Conchae vel lapides Cancrorum cum succo Citri praeparati, Liquor terrae foliatae Tartari et Syrupi acidiusculi. Quam primum autem diarrhoea oritur, a Syrupis et liquoris vsu desistendum. Commode etiam iuscula coquuntur ex pullo cum hordeo excorticato, additis passulis succoque Citri. Conducit etiam decoctum auenae excorticatae cum passulis. Gelatinae, si aestus valde magnus est, interdum conueniunt, si succo acido abundant. Omnis vero gelatina in corpore, in quo febris est, in viscidum et rancidum mutatur. Prae ceteris necessarius est potus aquosus, decoctum Hordei, Scorzonerae, Furfuris, quod vltimum in acri destillatione laudem meretur. Vbi febris vrget, potio acidiuscula esse debet, et ptisanis adiiciantur liquores acidi minerales. Cibus esse debet ex regno vegetabili, et qualis est hecticorum. Symptomata con-

considerari debent. Si tussis nihil trahit, sed sicca fit, et cum hac spirandi difficultas increbrescit, vtendum est becchicis, Syrupo Capillorum Veneris cum Diacodio Montani, emulsionibus et aliis. Si acris humor destillat, in pectus, conueniunt lubricantia, et interdum Diascordium Fracastorii ad scrup. j. vel drachm. dimidiam pro dosi. Si vero aeger iam valde infirmus est, cauendum, ne ex nimio huius vsu obrepat, et aegrum tollat. Aduersus diarrhoeam, vt vulgo vocant, colliquatiuam, nulla auxilia sunt. Si vires id permittunt, enema parari et in aluum immitti potest ex decocto auenae excorticatae, cui admisceri potest Terebinthina vitello oui subacta, cum Diascordio vel Theriaca Andromachi. Nihil magis nocet mortemque certius maturat, quam medicamentorum varietas.

PLEVRITIS SPVRIA.

§. 426.

Differt ab inflammatoria, et est morbus spasticus. Rheuma est, quod occupat partes exteriores pectoris, musculos imprimis intercostales. Dolor tamen non in vna sede est, saepe locum mutat. Is differt ab inflammatione, et nec ardens, nec pulsans est, sed quasi pungens. Respiratio non ita impedita est, nec tantum suffocationis periculum, ac in pleuritide vera. Morbus finitur quandoque pedetentim, saepe mutatione facta in vrinam, aliquando sudore. Interdum febricula accedit parum vehemens, illi fere similis, quae cum arthritide esse solet. Durat febricula per paucos plerumque dies; nonnumquam mutatur in alios morbos spasticos, arthritidem, malum ischiadicum, podagram, nephritidem. Accidere tamen potest, vt, neglecto regimine, et ex calidorum nec non externorum abusu, vera pleuritis sequatur. Spuria sine periculo est. Interdum epidemica est, ex tempestatum vicissitudinibus orta. Ceteroquin nascitur

nascitur plerumque ex cohibita insensibili expiratione et sudore, et ex humorum acrimonia. Auerti potest congruo victu, datis interdum catharticis, aquarum mineralium usu, ac si sudor atque exspiratio numquam negliguntur. Sub morbi exacerbatione dari possunt pulveres antispasmodici cum pulvere bezoardico, vel Antimonio diaphoretico, Liquor anodynus Hoffmanni cum spiritu bezoardico Bussii, et alia medicamenta discutientia. Vbi vrina mutari coepit, profunt infusa ex herbis et radicibus diaphoreticis. Nonnulli extrinsecus loco dolenti cucurbitulas admoueri iubent, concisa prius cute, quae res quandoque leuamen affert, non semper. Emplastrum saponatum Barbette dolorem tollit, sed non sine periculo.



PALPITATIO CORDIS.

§. 427.

Est motus cordis alienus et quasi conuulsivus, quo micro imprimis agitur. Hic motus non solum ab aegro sentitur, sed auribus etiam percipitur. Sub eo tamen pulsus arteriarum parum mutatur, qui paullo celerior, non vero durior fieri solet, immo quandoque languentibus arteriis et pulsu fere intermittente hic motus continuatur. Cor palpitare solet in recte valentibus ex quacumque causa, qua sanguis mouetur, veluti ex animi perturbatione, corporis exercitatione, balneo calido. Etiam si ventriculus vel flatu distentus est. Ceteroquin cor palpitat vitio solidarum partium, si quaedam sunt, quae sanguinis motum in cor et ex corde impeditiorem reddunt. Praeterea etiam hoc accidit ex plethora, ex neruorum mobilitate et debilitate, alii sensibilitatem vocant, quare in hypochondriacis et hystericis hoc frequentissimum est. Id etiam fieri solet ex defectu virium post graues euacuationes, maxime post haemorrhagiam.

giam. Si polypus in corde et venis ex eo ductis haeret, et si sanguis crassior est, vel si humida in toto corpore acrimoniā habent, frequens oritur palpitation. Igitur cor palpitat ab exanthematibus, podagra, scabie, vlceribus repressis et male curatis. Idem accidit ex obstructione viscerum, vomica, empyemate, aneurismate interno, hydrope pectoris, scirrhus, calculo, vermibus, mensium et haemorrhoidum obstructione. Distingui igitur solet in morbum idiopathicum et sympatheticum. Ex frequentioribus causis est repletio, vel si pituita vel aliud quid ventriculum onerat.

§. 428.

Curatio causis accommodari debet. Polypum in corde esse intelligimus, si cum palpitatione pulsus nullo non tempore inaequalis est, intermittens, debilis, cum dyspnoea, si homo saepe animo linquitur, vel imbecillitatem sentit. Euitanda tunc sunt omnia, quae sanguinem mouere et suffocationis periculum adferre possunt. Curiosior adhibendus est victus; vitanda est omnis repletio, omnisque etiam exercitatio. Potioni praestanda est aqua, et nisi aliud hoc impediatur, crebrius sanguis mittendus est. Si palpitation ex ira orta fuit, dari debent temperantia, nitrum cum absorbentibus. Vlcera reuocari debent, vel excitari fonticuli, et semper causae remoueri.



CATARRHVS SVFFOCATIVVS.

§. 429.

Est subitanea repletio pulmonum, in quos resolutos magna copia feri consluit, cum summa difficultate spirandi, anxietate et suffocationis metu. Morbus est peracutus, sine vlla febre. Is prae ceteris frequens est infantibus et senibus, raro mediae aetatis homines corripit. Si ille incursetur, vix illud sentit aeger; frequens tamen sputatio

tio feri acris, falsi, destillatio in fauces cum anxietate, illum instare significant. Aegri plerumque subito et quasi ex improviso eo opprimuntur. Summa est spirandi difficultas, magna pusillanimitas, tussis pauca vel nulla, et qua nihil extunditur. Vox ab initio celerior, mox debilis, depressa, quae vix intelligi potest, cum rhoncho. Pulsus tardus est ac rarus et debilis. Aeger, quamuis omni vitali virtute defectus sit, se tamen eodem loco continere nequit. Facies tumet rubetque.

§. 430.

Distingui debet ab Apoplexia. In catarrho mens sibi constat, et homo nec internis, nec exterioribus sensibus orbatur. Apoplexiam praecedat vertigo, amittitur omnis sentiendi facultas, pulsus fortis est et magnus, respiratio magna, homo stertit, et prostratus alto sopore oppressus decumbit. In syncope deficiunt etiam sensus, pulsus et respiratio, accedit summa debilitas, et extremorum frigus. Asthma conuulsivum, in quo mens sibi constat, habet pulsum celerem et febrilem, vocem acutam, stridulam, respirationem impeditam, sonoram, stridulam, a spastica contractione pectoris. Asthma remissiones habet, nullas catarrhus suffocativus, qui vel soluitur, vel morte finitur. Proxime cum catarrho suffocativus convenit passio hysterica, in qua tamen non tam pectus, quam fauces laborant.

§. 431.

Sedes huius morbi varia esse videtur, quandoque in cerebro, quo laeso, resolutisque nervis, pulmones paralytici fiunt; aliquando in pulmonibus, aliquando in ventriculo. Cerebrum se male habere, significat illa summa infirmitas totius corporis, praecipue pectoris, quum aeger humorem, quo pulmo opprimatur, nec excreare, nec extusare queat. Humor vero, cuius tanta vis in pulmones confluit, ostendit, ductus excretorios in variis membranis, in pituitaria narium et faucium, atque in ea, qua intus aspera arteria cingitur, relaxatos esse et resolutos, et quoniam pulmo-

pulmones moueri nequeunt, sanguinem eos permanare non posse. In incisis post mortem corporibus, pulmones tum sanguine, tum muco et sero pleni inueniuntur. Et probabile est, in senibus, defecta per aetatem naturali virtute, hoc vitium a sola redundantia muci, a pulmonum infirmitate oriri. Ventriculum, si quae sunt, quae eum onerant, etiam hunc morbum concitare, vel infantes docent, quibus a lactis coagulo id saepe accidere solet.

§. 432.

Ex variis autem occasionibus oritur. In infantibus ex dentitione, qua nerui grauiter afficiuntur, nec non id, quod iam diximus, crebrius ex lacte in ventriculo coacto. In adultis ab aëre humido et frigido, ab insensibili expiratione cohibita, a repletionem ventriculi, deuoratisque, quae insunt et difficilius concoquuntur, ab ebrietate praecipue ebriosorum, ab abusu potus Coffee; praeterea in corpore debili ab omnibus, quibus neruosum genus laeditur infirmaturque; ab animi pathematibus, vigiliis, Venere, sudore nocturno et matutino cohibito, a menstruorum vitiis, a scabie, porrigine, crusta lactea, male curatis, hic morbus contrahitur. Eo etiam opprimuntur, qui febribus exanthematicis laborant, si harum mala materia in pulmones conuertitur, id quod etiam in rheumatismo, arthritide, podagra frequentius fieri solet. Senes corripit, si vlcera crurum vel alia arte facta, seu fonticuli glutinantur. Qui asthma laborant, illis non vanus metus catarrhi suffocatiui esse potest. Morbus hominem quandoque momento temporis tollit. Si vero ultra diem durat, spes est aegrum seruatum iri, praecipue, si altero tertio die accedit febricula, et ex vrina multa crassa desidunt. Pueri sine noxa conualescunt. Senibus vero, si elucentur, saepe manet imbecillitas, asthma humidum, marcor atque marasmus senilis. Si pueris hoc morbo correptis accedit neruorum distentio et epilepsia, mors in propinquo est.

§. 433.

Auxilia in hoc morbo cum festinatione capienda sunt. Si homo adultus sanguinis missioni aduetus fuit, hanc vero neglexit, et etiam, si senex satis sanguinis et virium habet, protinus is detrahi debet ex brachio ad vncias x. vel xij. et vltra. Sanguinem abundare cognoscimus tum ex corporis habitu, tum ex faciei rubore; vbi autem pituita abundat, vel ventriculus ex adsumtis laborat, dari debet emeticum. Fere optimum est vinum emeticum ex vitro Antimonii ad vnciam vnam, Gilla Paracelsi ad drachmam semis aut scrupulos ij. vel solui potest Tartarus emeticus ad gr. iij. et Syrupo Rubi idaei vel Oxymelli squillitico admisceri. Laudem meretur Sulphur Antimonii vltimae praecipitationis, cuius gr. v. - vj. Tartaro vitriolato misceri et exhiberi possunt. Si horum nihil ad manus fuerit, Petum coqui potest cum cereuisia aut aqua. In aluum etiam protinus immitti debent clysteres acriores cum colocynthide in petia ligata, nec non cum Tartaro emetico ad gr. vj. qui cum alio Sale, vel Tartaro vitriolato aut Nitro, miscendus est. His enim mucus, qui intestina occupat, efficaciter excutitur. Si autem morbus ortus fuit ab exanthematibus repressis, imperandum est regimen, et adhibendae sunt frictiones extremorum cum linteis calidis asperioribus. Danda sunt bezoardica in morbis acutis, Pulvis bezoardicus Wedelii ad gr. xv. cum Nitri gr. iij-iv. Camphorae j-ij. gr. Si vero res a scabie orta fuit, conducunt pulueres ex Antimonio diaphoretico, additis floribus Sulphuris.

§. 434.

Quibus omnibus praemissis, si aeger ad se redit, dari debent discutientia et tonica: Mixtura ex spiritu Cornu Cerui cum Tinctura Antimonii tartarisata, cum spiritu Salis ammoniaci, Sal volatile oleosum Syluii, Liquor Cornu Cerui succinatus. Etiam conducunt decocta radicis Pimpinellae, Vincetoxici, Caryophyllatae, Petasitidis, Costi dulcis; herbae Trifolii fibrini, Cardui benedicti; Ligni Sassa-

Sassafras, seminum Foeniculi, Anisi, baccarum Iuniperi et Lauri. Debilitati medentur, praecipue in senibus, vinum generosum cum paucis Sacchari et Cinnamomi et alia analeptica: Balsamum vitae Hoffmanni.

§. 435.

Senibus et qui viribus defecti sunt, catarrhus suffocativus vel cito funestus est, vel non ita vehemens. Aliena his sunt emetica. Persistendum est in clysteribus, cum quibus dari possunt aluum ducentia: Pilulae ex Extracto panchymagogo Collii, additis Pilulis Becheri. Praecipue conducit Gummi ammoniacum, quod aceto solui, iterum inspissari et aegro dari potest ad gr. X-XV. Vid. quae de Asthmate dicta sunt. Tandem perficiunt mox laudata tonica et discutientia. Si superato catarrho febricula manet, ea plerumque in marasimum degenerat.


§. 436.

Magna cura habenda est convalescentium, quos oportet vitare aëris subitas mutationes eiusque nimium calorem, nimiumque frigus. Valde necessaria est corporis exercitatio, quantum id vires permittunt. Nocere potest et mortem etiam adferre impetuosior corporis motus post partum. Nocet repletio, alui obstructio, omnis cibus valentior et acris, et maxime ebrietas.

§. 437.

Infantibus, praecipue lactantibus, lac saepe unica huius morbi causa est. His dari potest lene emeticum, si Ipecacuanha radix ad pauciora grana cum aqua decoquitur. Etiam emeticum infantibus idoneum est, Antimonium diaphoreticum non ita depuratum, sed quod cum duabus partibus Nitri fusum fuit, huius gr. v - viij - scrup. dimid. lenem emesin movent. Adultioribus conducit Tartarus vitriolatus, cuius scrupulus semis ad unum aqua solui potest. Cum his lotiones in aluum immissae necessariae sunt. Vbi
malum

malum non ita praeceptum est, satis esse potest Rhabarbarum in pulvere. Pituitam soluit Oxymel squilliticum, cuius drachma j. ad ij. vel vnciam dimidiam aqua misceri et infantibus dari potest. Vbi dentitio vrget, proficiunt temperantia et leniora anodyna. Sed tamen in hoc etiam casu plurimum proficit Rhabarbarum, si cum Nitro et absorpentibus datur. Ante omnia videndum, vt infantibus detur victus idoneus, vt lac bonum sit, quod congruo lactantis victu et regimine obtinetur, vt etiam pulticulae recte coquantur.



POLYPVS CORDIS.

§. 438.

Est coagulum, quod praeter naturam in corde et maioribus vasibus, quae cordi adnexa sunt, omnium frequentissime in ventriculo dextro vel vena caua nascitur. Nomen habet a multis radicibus vel pediculis, quibus ille sedibus inhaerescit, ita tamen, vt sine negotio educi et euelli possit. Est tamen discrimen. Aliquando enim coactum quasi sanguinem repraesentat; aliquando seuum et solidam medullam; aliquando ex membranis quasi concretus videtur. Polypus interdum ex corde per vasa maiora, praecipue venam cauam, altius adfurgit, vt talis quandoque in durae matris sinibus reperiatur. Sunt, qui polypum in viuentibus esse negant, existimantes, sanguinem in morientibus concresecere et post mortem reperiiri. Sed magni densitatisque polypi, quibus cor etiam distenditur, vix dubitare sinunt, eos superstitae vita fuisse formatos conglobatosque. Nasci etiam potest ex diathesi inflammatoria, si sub aestu febrili, vel calente post exacerbationem corpore, frigida potatur. Inter alias causas etiam est spiritus ardentis abusus. Polypo vix non semper laborant asthmatici, cachectici, hydropici, praec

prae ceteris, quibus aqua in pectus contracta est. Et in his morbis polypus quandoque caussa est, quandoque maiore caussae effectus. Quibus menstrua et haemorrhoides non proueniunt, iis etiam interdum polypi gignuntur.

§. 439.

Diagnosis ab initio admodum difficilis est. Polypum in corde esse significat pulsus valde inaequalis, saepe intermittens, qui semper talis est, accedente dyspnœa, quae, dum homo corpus mouet, vel per accliuia adscendit, multum increbrescit, cum cordis palpitatione et superueniente animi ex leui caussa deliquio. Explorari in homine possunt arteriae in temporibus et vtriusque manus carpo, atque videndum, num pulsus synchronus sit. Qui polypo laborant, his metus est, ne subito, praecclusis maioribus arteriis venisque, suffocentur. Ex eo saepe fiunt aneurismata in aorta; vid. LANCISIUS *Tr. de Corde*. Sub finem homines, qui non subito iugulantur, ex asthma vel hydropereunt. Malum si adoleuit, nullamque curationem recipit, auerti debent caussae. Qui eo laborant, iis obseruanda sunt, quae supra de palpitatione cordis dicta fuerunt.





MORBI ABDOMINIS.

ATONIA VENTRICULI.

§. 440.

In omnibus curationibus considerandus est ventriculus, a cuius actione omnes reliquae actiones naturales dependent. Saepissime tamen actio ventriculi laeditur per consensum, et si non tam is ipse, quam aliae partes laborant. Praecipue ventriculus turbatur ac offenditur ex male adfectis in omni corpore partibus nervosis. Docet id nausea et vomitus nephriticorum, vertigine correptorum eorumque, qui capite vulnerati sunt. Ex linea alba, ense percussa et leuiter vulnerata, vomitum vehementem fuisse sequutum, memini. Conqueruntur igitur saepe aegri de atonia ventriculi, si febris imminet, vel iam incursat, si catamenia et haemorrhoides non fluunt, vel si illae instant, si podagra alique morbi futuri sunt. In phthisicis et hecticis, nec non quibus in aliis sedibus magnae suppurationes fiunt, ita, ut omnia humida et saliva etiam atque liquor gastricus corrupta sint, ventriculus laborat. De gravidis res notissima est. Distinguenda vero est atonia a dyspepsia et cruditatibus, de quibus seorsim dicendum. Vera atonia rara est. Deprehenditur quandoque in hominibus infirmis, corpus non exercentibus, Venere, litterarum studio vires exhaurientibus, praecipue vero in iis, qui voraciores ventriculum nimis onerant, nec non in bibonibus, qui cum portione nimium distendunt laxantque. Plurimum confert aliarum rerum, etiam medicamentorum, abusus, salium, absorbentium et terreorum. Interdum ventriculo vim inferunt foeminae, quae deuorata creta aliisque rebus sibi pallorem quaerunt. Apud nos inter frequentiores est calidae nimius potus.

§. 441.

§. 441.

Morbus cognoscitur ex causis praegressis, si aeger post pastum conqueritur de molesto sensu in praecordiis et de ventriculi inflatione. Vagus cum his esse solet calor et rubor faciei, accedit anxietas et vertigo. Alimenta aliquot horis post pastum reiciuntur, plerumque tamen haec, ab actione ventriculi non mutata, suam naturam retinent, ita, ut ex vegetabilibus et fermentescentibus acor acerrimus, ex animalibus et pinguibus rancidum fere vrens nascatur, quod vomitu reicitur, immo saepe sine vomitu excreatur. Cum vero cum atonia est plerumque coniuncta anorexia, interdum tamen, maxime exsuperante in ventriculo acido, homo vehementer appetit. Ventriculi atonia tandem degenerat in cachexiam; hydropem, in senibus in marasimum. Nonnumquam per morbum articulare, si eo corripitur homo, omnia in melius mutantur.

§. 442.

Mature medendum est morbo, antequam corpus aliescit, atque orta tabe consumitur. Quibus auxiliis tolli debeat cruditas varii generis, mox occasione dyspepsiae videbimus. Si pituita vel alia mala materia in ventriculum contracta est, is ante omnia purgari debet. Firmando ventriculo inferuiunt amara: Absynthium, Centaurium minus, radix Gentianae; Cortex Cascarillae; Cortex Winteranus; quae amara vel in pulvere et Tragea, vel in Extractis, vel in Essentia dari possunt. Prosumt etiam alibi laudata Elixiria ex Extractis amaris, Tinctura Tartari et vino Hungarico. Pulvis Birkinami quotidie aliquoties ad drachmam j. deglutiri potest. Si acidum exsuperat in ventriculo, pulveri illi adiaci possunt lapides Cancrorum praeparati. Proficiunt etiam Martialia, veluti Limatura Martis, Tinctura Martis tartarifata, Tinctura Vitrioli Martis Ludouici, Tinctura Martis cum vino Maluatico vel succo pomorum Borsdorffianorum. Praestantissimum auxilium ex medicamentis est Cortex Peruvianus, qui vel cum Limatura Martis in in-


R 4

fuso,

fuso, vel cum Conferua viscerali, addito Syrupo quodam amaro, commode dari potest. Eius vero usus, interpositis etiam aliquando aliquot diebus diu continuandus est. Omnia tamen parum proficiunt, nisi simul adhibeantur duo illa maxima praesidia, abstinencia et corporis exercitatio. Cibus sit paucus, non tamen ex nimis imbecilla materia. Conuenit panis cum seminibus Foeniculi, Carui, Anisi pistus et bene fermentatus. Carnes assae elixis meliores sunt. Potum nimium et fermentescentem vitari oportet. Vinum detur paucum, sed meracum, praecipue vinum illud rubrum, Gallis *Pontac* vel *Eremitage* dictum. Prae aliis potionibus est saluberrima aqua fontana saliens, cuius aeger etiam cyathum horis matutinis, ieiuno ventriculo, bibat. Fere melior est aqua Selterana. Vtile etiam esse potest decoctum radicis Chinae cum Cassia lignea.

§. 443.

Non prorsus negligenda sunt externa, scuta et balsama stomachalia. Pauperes vtuntur fermento panis, quod cum aceto acerrimo subigunt, atque extrinsecus ventriculo imponunt. Fieri possunt emplastra, ex emplastro Oxyroceo, de Tacamahaca, de Crusta panis, quibus adiiciuntur Balsamum Peruvianum, Olea destillata Macis, Caryophyllorum, Maioranae, Absynthii, Menthae, Melissae, Carui, Foeniculi, Anisi. Ex his etiam Balsama componuntur.



D Y S P E P S I A.

§. 444.

Est actio ventriculi laesa, si adsumta non recte concoquuntur. Causa est plerumque copia assumtorum et ingluuies, quod fibrae nimium distenditae tandem relaxantur infirmanturque, et quod liquor gastricus iners redditur.

Saepe

Saepe in ventriculo relaxato cruda haerent, quae coctionem multum impediunt. Id vero etiam ex aliis causis accidit. Si vero ventriculus spasmis afficitur, liquoris gastrici secretio multum impeditur, isque ipse etiam mutatus corruptusque ad ventriculum fertur, id quod in hypochondriaco et hysterico malo, nephritide et similibus morbis spasticis accidit, et si in corpore febris est, vel aliqua parte malum vlcus, quo omnes humores corrumpuntur. Etiam hoc in vera atonia fieri intelligitur. Minor huius vitii gradus dicitur Bradypepsia, et, si ventriculus omni concoquendi facultate destitutus est, Apepsia. Morbus, qui plerumque cum oculorum caligine, vertigine aliisque imbecillitatis signis esse solet, tandem in cacochymiam, cachexiam, hydropem mutatur.

§. 445.

Etiam hic causae considerandae et, si fieri potest, tollendae sunt. In cruditatibus distinguere oportet eam, quae a bile est, ab altera, quae a pituita, et tertia, quae ab acido esse solet. Bilem in ventriculo haerere, ostendit aegri temperies, ira, maxime si haec cibum statim subsequitur, sitis, sapor amarus, siccitas, et in ieiunio ventriculo dolor quidam, qui sub praecordiis et scrobiculo cordis percipitur. In hoc casu non semper tutum est emeticum, multo minus tale, quod ex valentioribus esse solet. Si tamen aeger nausea et vomendi conatu vexatur, vomitus cieri potest, data copiosiori calida cum butyro non salito, vel, quod fere melius est, cum oxymelle simplici. Irritari etiam possunt fauces. In aliis vero praemittendi sunt Sales neutrius generis, Tartarus vitriolatus, Arcanum duplicatum, Tartarus tartarizatus, Terra foliata Tartari et eius Liquor ad guttulas 80-100. Vel deglutiri possunt pulveres ex Magnesia, Sale cathartico, Nitro. Praemissis digerentibus, necessaria sunt, quae aluum ducunt, ex Tamarindis, Manna, Cremore Tartari, Rhabarbaro, vel ex pulvere Rhabarbari cum Tartaro tartarizato, vel ex Magne-

R 5

fia

sia et Sale cathartico. Si, id quod aliquando fieri solet, tenacior, coactaque per calorem bilis ventriculo inhaerescit, conducunt Spiritus acidi, Clyffus Antimonii, Spiritus Sulphuris per campanam, quorum guttae XX. dari possunt. Necessè vero est, vt maior copia aquae pro vehiculo adhibeatur. Tandem, vt ventriculo robur addatur, adhibenda sunt, quae alibi proposui, et praecipue Extractum Centaurii minoris. Proficiunt aquae minerales. Etiam si harum vsus continuari nequit, confert per vnum alterumque diem illas cum Sale cathartico atque Magnesia potare.

§. 446.

Pituita nascitur in ventriculo ex adsumtis glutinosis, tum vegetabilibus, tum animalibus. Si ventriculus resolutus, viscera infirmiora, haec recte exterere et concoquere nequeunt. Qui hoc glutinoso laborant, illis ventriculus et cum hoc etiam duodenum multum inflantur, quae res intolerabilem anxietatem praecordiorum, vertiginem aliaque adferre solet. Si pituita sincera est, id quod saepe ex victu accidit, non cum acido vel rancido mixta, frequens est ructus sine sapore, nonnumquam pituitae vomitus, deiectio, immo, id quod tamen rarum est, eius per vrinam excretio. Morbus hic difficillimae curationis est. Spem facere possumus, si ventriculus infirmus, non vero prorsus resolutus est, et si aeger congruo victu et exercitatione vti velit. Ab initio, in robustioribus, confert emeticum; debilioribus dari possunt Sales digestiui; in valde imbecillis Liquor terrae foliatae Tartari bene praeparatus, et cum his pulueres ex Rhabarbaro. Simul vero conducunt alia resoluentia, Oxymel squilliticum, Sal volatile oleosum et alia saponacea, ipse Sapo Venetus, qui Pilulis Becheri et Gummi Ammoniaco admisceri potest. Si corpus robustum est, efficaciora purgantia, Pilulae de Ammoniaco, adhiberi possunt. Si malum valde pertinax est, illud optime tollitur Thermis Carolinis, vel Thermis Aquisgranensibus, et si illarum nulla opportunitas est, Acidulis Egranis vel Pyrmontensibus.

Lauda-

Laudabilem etiam operam praestant infusa per epicrasin purgantia, ex amaris et Rhabarbaro composita. Praemissis his non omitti debent roborantia, aromatica: radix Ari, Enulae, Calami aromatici, Gentianae rubrae, Galangae, Zingiberis, Zedoariae, Cortex Winteranus, Cascarillae, Cinnamomi, Cardamomum, herba Centaurii minoris, Absynthii et semina carminatiua. Fere meliores sunt radices conditae, vel in puluerem redactae, in Tragea. De aliis roborantibus supra dictum est. Hoc tamen tenendum, nisi victus mutetur, corpusque recte exerceatur, nihil ab his sperari posse. Victus ratio, sine qua omnia frustra sunt, ex ante et saepe dictis petenda est. Conducit panis cum semine Carui vel Foeniculi coctus, rarus, numquam recens et glutinosus. Ex aromatum generibus Zingiber potissimum in iusculis adhiberi debet. Etiam Cydonia huic morbo opportuna sunt. Potioni praestari potest decoctum crustae panis fermentati, vel decoctum radice Chinae cum paucis cortice Cassiae lignae.

§. 447.

Acidum in primis viis exsuperat, si cibus potioque fermentescens non recte in ventriculo subigitur, ita, ut in eo coacefcat. Hoc fit in voracioribus, corpus non exercentibus, maxime hystericis et hypochondriacis. His sapor acidus cum dentium stupore saepe molestus est. Ructus sunt acidi, fames canina, ventriculus pinguium et lactis maxime impatiens. Deiectiones acidum spirant et ex adsumto lacte fiunt aeruginosae. Urina est alba, cruda. Frequentes sunt dolores colici, iliaci, cum borborygmis &c. Malum, si vetustas accessit, quandoque aegrius, et, nisi victus mutetur, numquam tollitur.

§. 448.

In curatione acidum obtundi potest absorbentibus vel Limatura martis. Cauendum tamen, ne dentur absorbentia, si, id quod saepe incidere solet, cum acido viscidum et glutinosum

tinofum in ventriculo est, id quod ventriculi inflatio, vomitus et deiectiones mucidae crebriores ostendunt. Nimia absorbentia ventriculum magis infirmant, quibus semper nitrum admisceri debet. Optimum etiam remedium est Magnesia alba, rite per calcinationem praeparata, cui addi potest Sal catharticus. Acidum etiam optime obtundunt Sales vegetabiles: Absynthii, Cardui benedicti, nec non Oleum Tartari per deliquium. Omnes tamen hi Sales non sine magno vehiculo dari debent. Haec vero plerumque, si malum iam inueterauit, ad breue tempus proficiunt. Si vero morbus eradicandus est, confugiendum erit ad Thermarum et Aquarum mineralium vsum. Reliqua curatio cum iis conuenit, quae mox de malo hypochondriaco proponuntur.



ADPETITVS LAESVS SEV ANOREXIA.

§. 449.

Adpetitus est sensus, qui in ventriculo percipitur, si is vacuus est, dum in eum naturales humores, salina et liquor gastricus, feruntur, quos inedia acriores fieri necesse est. Huius autem adpetitus laesi variae causae sunt, a quarum notitia medendi viam trahere debemus. Accidere enim potest ex vitio ipsius ventriculi, si is resolutus est et vera atonia laborat, si oscula et glandulae, ex quibus liquor gastricus emittitur, vitio laborant, si pituita in ventriculum contracta est, quibus omnibus adpetitus laeditur. Etiam anorexia nascitur vitio salinae, si illa propter varias causas deficit. Anorexia laborant omnes, quibus lymphatici humores corrupti sunt, veluti si magna suppuratio, vlcus et carcinoma in corpore est, si hoc febris tenet, vel si illud

illud maiori sanguinis profusione exhaustum est. Adpetitus etiam laeditur in grauidis, in quibus pars sanguinis, per catamenia effundi soliti, humoribus admiscetur. Cura et hic a causis, et quae haecenus dicta sunt, petenda est.



BVLIMVS ET FAMES CANINA.

§. 450.

Morbus anorexiae contrarius est, in quo homo inseparabili desiderio quaeuis alimenta adpetit, cum magna debilitate et superueniente etiam lipothymia. Est tamen ex sententia Auctorum differentia. Βέλμης non perpetuo vexat aegrum, sed placatur ventriculus adsumtis. In fame canina alimenta, quae deuorata sunt, iterum vomitu reiciuntur, quare homo, fractis viribus, summa macie tenuatur. In bulimo frequentior lipothymia est, quae non raro in syncopen tendit. Vtrumque vitium a variis causis proficiscitur. Bulimus ab inedia, nec non a magno frigore, a quo *ventres calidiores fieri* scripsit HIPPOCRATES. His liquor gastricus acrior et copiosior fit, aliquando a lumbricis aluum occupantibus, et prostat in BONETI *Sepulchr. Lib. III. Sect. II. p. 735.* exemplum, vbi hoc vitium ortum fuit a deuoratis contra icterum pediculis. In quibusdam post mortem ventriculus sine rugis, in aliis, id quod in VESALIO legitur, ductus cholodochus ventriculo vel pyloro insertus fuit repertus. Fames canina plerumque ab acido, si illud non solum primas vias, sed sanguinem etiam omnesque humores corrumpit, nascitur. Etiam in his a causis petenda est curatio. Haec acrimonia Thermis et Acidulis diu, iteratis etiam vicibus, eluenda est. Victum idoneum corporisque exercitationem et hic necessaria esse, nemo non deprehendit.

MALA.

MALACIA ET PICA.

§. 451.

Malacia est, adpetitus vagus molliculorum, otioforum et morbis diuturnis, lenta maxime febricula, ex vlcerebus reconditis, suppurationibus, vomicis laborantium. Tales quaedam magno cum desiderio appetunt, quae mox iterum fastidiunt et auersantur. Pica, Graecis *πικρα*, frequens est symptoma grauidarum, aliquando etiam puellarum, viduarum, nec non foeminarum chlorosi, mensium obstructione et hysterico morbo laborantium. In pica prorsus heterogenea appetunt, pisces carnesque crudas, cretam, calcem, carbones, candelarum funiculos, filum cannabinum, narium mucum inspissatum, immo sterces humanum. Nonnumquam se illae aliis cibis praeter modum implent, quos olim auersatae fuerant. Nasci videtur hoc vitium ab humoribus quodam in viscere, praecipue in vtero, corruptis, quibus nervos affici, et humorem etiam, qui naturaliter ad ventriculum fertur, corrumpi, a vero propius est. A corruptis enim humoribus si nervi afficiuntur, laeditur tandem phantasia, quare etiam ex aliis occasionibus, vermibus, certis veneris, &c. id fieri solet. Grauidis menstrua non proueniunt, a qua re primis mensibus magna mutatio in oeconomia animali fit, et sanguis in vasis vterinis coaceruatur. Aliae ex aliis causis hoc profluuium defectae sunt. Nonnullis sanguis paucus, pallidus vel corruptus affertur. In non paucis genitales humores exsuperant atque corrumpuntur. Adpetitui grauidarum interdum indulgendum est. In his enim pica post quintum circiter mensem finitur, in paucis ad partum vsque continuatur. Virgente malo dari possunt absorbentia, ipsa creta et nitrosa, Magnesia et similia, quibus ille sensus in ventriculo aliquantum obtunditur. Dato etiam Rheo cum Nitro et absor-

benti-

bentibus, alius ducenda est crebrius. Reliqua curatio a causarum notitia petenda est, et quum haec symptomata mulieribus frequentiora sint, his non alia saepe curatio necessaria est, quam hystericiis.



ARDOR VENTRICULI SEU CARDIALGIA VEL SODA.

§. 452.

Est dolor molestus, quem aeger sub cordis scrobiculo sentit, dum *καρδία*, seu supremum ventriculi os, male afficitur. Esse solet cum anxietate, vomendi conatu et spasmio oesophagi, quo non raro totum pectus ita constringitur, ut aeger se pectoris morbo laborare persuasum habeat. Oritur a cruditatibus ventriculi, crebrius ab accrescentibus, aliquando etiam a pinguibus, rancidis, putrescentibus. Hunc morbum ex ventriculi imbecillitate, et si liquor gastricus debilior est, oriri, certum est, sed tamen id etiam tenendum, quod supra retulimus, dolorem interdum sympathicum esse, et cum aliis excretionibus, praeter ceteris menstruorum et haemorrhoidum, conspirare, iisque provenientibus solui. Ex vomitu atque diarrhoea levamen sentiunt aegri, quod vero breue plerumque esse solet. Quos crebrius atque diutius cardialgia infestat, iis non vanus metus est mali hypochondriaci, cacochymiae et cachexiae.

§. 453.

Maximum praesidium a victus ratione petendum est. Imperanda est corporis exercitatio, et haec quidem quotidiana per plures menses continuanda. Vitanda sunt omnia
acida

acida, fermentescentia, dulcia, ex saccharo et melle, austera, pinguis, butyrum, oleum, caseus, tum recens et acefcens, tum vetus et rancidus, vina oligophora, vel acida et mangonifata. Vinum etiam, quamvis bonum, si paullo maiori copia in talem ventriculum ingeritur, coacefcit. Quum etiam his morbis frequentius obnoxia fit corporis partiumque solidarum imbecillitas, videndum est, ne homo nimio litterarum studio, negotiosa actione, vigiliis, aliisque enervetur.

§. 454.

Si dolor cum ruftu acido est, et alia ostendunt, acidum infestare stomachum, leuamen temporarium afferre possunt pulueres ex lapidibus Cancrorum praeparatis, Conchis praeparatis, Magnesia, addito Nitro. Celeriore opem adfert Creta, ex qua Morsuli fiunt. De absorbentibus vero notandum, ex crebriori illorum vsu tandem indies magis debilitari ventriculum. Hoc tanto magis metuendum est a Creta, quae, vt videtur, villosae ventriculi tunicae eiusque plicis nimium inhaerescit. Etiam cum acido plerumque pituita in ventriculum contracta est, quae si ei terrea admiscetur, induratur, et longe difficilius excutitur. Vbi bilis exsuperat, vel vbi rancida in ventriculo esse sapor ostendit, cardialgiam repente tollit frigida, addito succo Citri vel aceto. Si vero ipsi morbo mederi volumus, subtrahenda est mala materia et enitendum, vt adsumta melius digerantur. Maximum praesidium petendum est ab aquis mineralibus, praecipue a Thermis Aquisgranensibus. Plurimum etiam proficiunt infusa per epicrasin laxantia, quae ex amarioribus componi oportet. Pilulae Becheri, Rheum, Sal Thermarum Carolinarum, Sal catharticus, adhiberi possunt. Sed cauendum, ne ducendo saepius alvum, infirmitatem adaugeamus. Parum enim haec omnia proficiunt, et vera sanitas haud redditur, nisi victus curiosior atque exercitatio adhibeantur, quae, quum iam supra comprehensa sint, hic repetere superuacaneum foret. Tam-

Tamquam specificam laudant alii spiritum Vitrioli ad gtt. IV.-V. Dempta mala materia, confirmari ventriculū oportet, id quod, quibus auxiliis fiat, saepe diximus. Multum extolli debet cortex Peruvianus, vel in pulvere, vel in infuso cum Limatura martis.



MALVM HYSTERICVM.

§. 455.

Foeminis hic morbus frequens est, cum quo in viris malum hypochondriacum in multis, non vero in omnibus conuenit. Dantur tamen nonnumquam viri, qui vix non hystericis simillima symptomata patiuntur. Hypochondriaci veri et hystericī morbi sedes differt. Prior est in visceribus chylicationi inferuentibus, genuini vero morbi hystericī sedes est in vtero et partibus ad hunc pertinentibus. Describi potest spasmus hystericus, quod sit motus spasticus conuulsiuus, ex impedita excretionē variorum humorum, liquoris genitalis, menstruorum lochiorumque. Quum vero etiam in foeminis frequentiores causae et occasiones sint, quibus chylicatio turbatur, visceraque infirmantur, illae etiam ex hypochondriis laborant. Saepe vero duo hi grauissimi morbi praesente vtriusque causa iunguntur.

§. 456.

Foemina, cui morbus hic instat, pallida fit, ea sentit languorem, insolitam crurum imbecillitatem, cum sensuum externorum internorumque hebetudine, anxietate, inquietudine, sollicitudine, moerore. Vrinam mingit copiosam, aquae liquidae simillimam, quod urinae profluvium fere pathognomicum huius morbi symptoma est. Respiratio fit anhelosa, pulsus paruus et debilis, et perturbatur omnis vitalis, animalis et naturalis actio. Si vero ingrauescente morbo

S

morbo

morbo verus insultus sequitur, sentit foemina, cum magna cordis palpitatione, globum ex abdomine ad fauces adscendentem, seu spasnum musculorum abdominis et oesophagi. Constringuntur fauces cum summa anxietate et Cardialgia, praecluditur et spiritus et vocis usus; arteriae parum et inaequaliter attolluntur, muscoli abdominis, contracto etiam vmbilico, constringuntur. In aliis abdomen flatibus intentum et durum est, nullus tamen spiritus infra transmittitur. Alius adeo constricta est contractaque, vt nec commode fistulae, pro immittendis in eam lotionibus, inferi queant. Foemina plerumque rigida et gelida sine pulsu iacet, id quod maxime fieri consuevit, vbi hystericus spasmus vera syncope finitur. Nonnullae aliis spasimis, risu etiam Sardonio, commouentur. Plerumque grauior talis accessio soluitur emissio ructu, quo tempore etiam in ventre sonitus murmuraque audiuntur, et mox foemina leuamen sentit. Hoc vero accidit, si aer, qui in stomacho, spasmo constricto, eiusque suprema parte haeret, soluto illo musculorum pharyngis spasmo exploditur, vbi iterum restituitur sanguinis circuitus, attolluntur arteriae, omniaque pristinae tranquillitati redduntur. Interdum paroxysmus sternutamento, vomitu, deiectione, raro sudore soluitur. Vrina etiam mutatur in fuluam atque rufam, ex qua tandem crassa desidunt. Post decessionem languor, dolor rheumaticus lumborum, cephalaea et clauus hystericus interdum manent, et morbus leui data occasione reuertitur.

§. 457.

Accessio talis hysterici morbi differt a Syncope, in quam tamen saepe mutatur. Ante hysterici morbi accessiorem sentit aegra mentis languorem, corporis lassitudinem, cordis palpitationem, spirandi difficultatem, genua ei quasi fatigata sunt, spiritus magis et magis ad animae interclusionem angustior fit. In Syncope nihil horum, sed pulsus rarus est et intermittens, aliquando nullus, nulla respiratio, pallor, sudor frigidus. In hysterico morbo magis strangulantur

lantur fauces, et ideo longe maior est spirandi difficultas; arteriae etiam subeunt, non vero prorsus quiescunt, in facie non pallor, sed rubor est, nec umquam facile sudor frigidus. Si vero hysterica accessio in Syncopen mutatur, foemina veluti mortua iacet, ita, ut num vita superstes sit, dubitari possit. Nec omnis fides deneganda est iis, quae de foeminis circumferuntur, quae viuae ultimo officio mandatae fuerunt. Si experiri volumus, num vivant, naribus et ori admoueri potest speculum, vel flamma, vel plumula; pectori etiam imponi vasculum aqua plenum, in quibus vel minimum spiritus aut pectoris motum videmus. Si res adhuc dubia est, ferro candente adurantur plantae pedum et acriori sensu excitentur. In apoplexia pulsus magnus est et validus, cum magna et sonora respiratione. In Epilepsia vera, praeter neruorum distentionem et spasmus oris, est sensuum internorum atque externorum perfecta abolitio, ita, ut aegri omnia, quae ipsis acciderunt, ignorent. Hysterica plerumque audit et videt eos, qui circumstant, plurimarumque rerum, postquam ad integritatem venit, reminiscitur. Non raro tamen etiam hystericus morbus in epilepsiam degenerat, interdum in furorem vterinum, maniam, cachexiam, aliosque morbos.

§. 458.

In hunc morbum puellae vix umquam ante puberem aetatem, nec facile agrestes, et quae vitae suae cursum in quotidiano corporis labore conficiunt, delabuntur. Vergente etiam aetate, ut plurimum, non tamen semper, si catamenia et genitalis liquor deficiunt, leuatur et tollitur. Plurimum autem ei obnoxiae fiunt virgines, viduae, et omnes mediae aetatis foeminae, laute et opipare atque in otio viuentes, a parentibus imbecillis genitae, quae aliis et similibus morbis oppressae fuerunt. Frequens est iis, in quibus ex leui occasione concitatiores adfectus erumpunt, cum his etiam corpus non parum mutetur, nec non quae aliis morbis, chlorosi cacoehymiae implicatae sunt, quae

S 2

Vene-

Venerem frustra appetunt. Plurimum etiam thoraces seu capitia illa pectoris rigida conferunt, quibus musculorum abdominis et respirationis motus, et cum his omnium fere viscerum naturalis functio turbatur. Catameniorum lochiorumque suppressio, fluor etiam albus, interdum hunc morbum faciunt, non raro vero eas valetudines hoc profluvium consequitur. In demortuorum corporibus nonnumquam in ouariis, vteri ligamentis et aliis partibus, quae circa vterum sunt, reperti fuerunt tumores, sub quibus varia materia fuit. Vid. VESALIUS *de Humani corporis fabrica Lib. V.* DIEMERBROECK *Lib. I. Cap. XXIV. Ephem. Nat. Curios. Dec. I. An. I. Obseru. 32.* Ex retentione lochiorum foeminam hoc morbo implicari rarum non est, id quod quoque accidit, vel si ea magno sanguinis profluvio fuit eneruata, vel si sanguis coactus, secundae pars, mola in vtero relicta retentaque fuit, vel sub partu, si aër gelidus in vteri interiora penetrauit et ora venarum sanguinem fundentium praeclusit. Plurimum etiam ad hunc morbum gignendum vel exasperandum, atque ad novas accessiones concitandas, faciunt animi perturbationes, amor, *ἔλκυσις*, moeror, cupido, terror, gaudium, Venus vel nimia, vel denegata, eiusque immoderatum desiderium, et omnes odorum suauitates, quibus eiusmodi foeminae, vehementer et maligno quasi fidere percussae, non raro prosternuntur. Dulcia, si iis vescuntur, fere idem faciunt, quod suaueolentia.

§. 459.

Iam vero ex his omnibus haud difficile erit, veram, proximam, continentemque huius morbi causam reperire, de qua plures dissentiunt. Duo esse videntur, quae hunc morbum faciunt, imbecillitas mobilitasque generis nervosi, et humor circa vterum, maxime in ouaria ac spermatica vasa, contractus, atque in his vel nimium auctus, vel mora corruptus. Differt itaque a malo hypochondriaco, in quo viscera chylopoea prae ceteris laborant, quod tamen vitium

vitium etiam crebrius cum hysterico morbo esse atque huic multum exasperare solet. Nec hystericus morbus a solis mensium vitiis eorumque suppressione nascitur. Sunt enim plures hystericae, quibus menses recte fluunt, immo non paucae hoc morbo crebrius plurimumque vexantur, quibus suo tempore magna vis sanguinis in genitalia profunditur. Sanguis hystericarum ex vena missus non alius est, quam cuiuslibet corporis infirmi, videlicet rufus, nimium tenuis, qui non concrefcit, immo saepe pituita mixtus et varius. Sanguis tenuis illud boni habet, ut non facile sub illis anxietatibus impeditoque eius per cor et pulmones transitu, in polypum possit compingi. Si lochia repente fuerunt suppressa, res non sine periculo est. Foemina, quae alias huic morbo obnoxia non est, si eo tentatur, interdum se concepisse scire potest. Sunt aliae hac valetudine oppressae, quae tempore, quo grauidae sunt, leuantur, et gestationis tempus conditione tolerabiliori transigunt. Si vero grauidis frequentiores vehementesque accessiones sunt, abortus timor vanus non esse potest. Morbus, cuius causa tolli nequit, et qui a suppressis lochiis relictus est, qui iam cum cacochymia, chlorosi, fluore albo, vteri partiumque genitalium tumore, scirrho atque exulceratione est, nullam curationem recipit.

§. 460.

Foemina, quae ex supra dictis notis sentit accessionem sibi instare, debet abstinere ab omni cibo, protinus alius lotionem ducenda est, quae ex emollientibus, additis amaris, componitur. Sumat aegra Castoreum, vel, si deglutire potest, in puluere, vel, si fauces praeclosae sunt, in Effusentia cum Liquore anodyno. Immo morbi ipsiusque accessiones efficacia requirunt opiata. Nec contemnendi usus est Elixir vterinum Crollii. Cum his externa conferunt, Unguentum abdomini illiniendum, ex Unguento de Althaea Fernellii, cum Galbano in vitello oui soluto. Erecto capite debet decumbere aegra, cui fascia, qua praecordia con-

stringuntur, leuamen adfert. Vbi vero ingrauescente accessione foemina exanimata quasi iacet, adhiberi debent excitantia. Naribus admoueantur prae ceteris Mixtura ex Essentia Castorei et spiritu Salis ammoniaci cum calce viua. Cum hac alia foetidiora, Gummi Galbanum, Asa foetida, Corium Prussicum, Plumae accensae; de quibus tamen notandum est, nimium harum rerum vsum tandem vim inferre nervis cerebroque, et interdum aliquem stuporem relinquere. Vt specificum commendatur Tinctura Fuliginis cum Spiritu Salis ammoniaci praeparata; in haustu vini vulgo solet propinari. Optimum auxilium est frigidae perfusio. Conueniunt etiam fricationes crurum, titillatio in planta pedis, pilorum euulsio, praecipue e partibus, verendis. Illud tamen ignorari haud oportet, non omnia omnibus opitulari, sed ab auxilio, quod in nonnullis omnem spasmus soluit, in aliis eum magis intendi et omnia exasperari.

§. 461.

Vbi malum deserbuit, ante omnia expurgandae sunt primae viae, id quod optime fit Sale Thermarum, Sale cathartico, Pilulis Stahlî. Si foemina sanguine abundat, vena secanda est, ad hoc tamen auxilium non ita properandum, nisi id plethora postulat, ad minimum durante ipso insultu sanguis non facile mittendus est. Corpus debile requirit sanguinis detractionem, ne id huius mole opprimatur. Sed id semper tenendum est, sanguinis crebriori missione infirmitatem augeri. Dari possunt Infusa per epicrasin laxantia. Potari possunt Thermae, aquae minerales, cum quibus sumendae sunt illae Pilulae Becheri. Etiam continuus per aliquot hebdomadas vsus Pilularum ex Gummi Galbano, Asa foetida, Myrrha, Extracto Castorei et Croco cum Massa Pilularum Becheri, multum proficit, quibus decocta resoluentia superbibantur. Foeminis cholericis opportunum est serum lactis, vel lac ipsum cum aquis mineralibus. Dulcia ferre non possunt hystericae, quare etiam
his

his quandoque Apozemata cum Tamarindis et Manna graviores turbas excitant. Nonnumquam omnem morbum tollit matrimoniale coniugium, saepe ardentioribus votis exoptatum. Si huius nulla datur opportunitas, imperanda est, ab omni victu pleniori, iurulento et acri, abstinencia, et vitandae sunt omnes occasiones, quibus Venus incenditur. Qui his desideriis venericis mederi audent per deuorata refrigerantia, maxime Saturnina, Nitrum et alia, illi miseras non raro in alios grauiioresque morbos coniiciunt. Reliquis omnibus saepe frustra adhibitis, proficiunt Thermae Carolinae, quas quandoque per aliquot annos iterari oportet. Victus semper sit idoneus. Euitentur cruda, et inprimis dulcia. Potioni praestanda est aqua Selterana vel fontana. Vinum omne circumcidendum oraneque potus valentioris genus. Illud sciri oportet, in hoc morbo vix quidquam perpetuum esse, et eum atque eius symptomata ipsis foeminis, quod mutabile genus iure dicitur, esse mutabilia.



MALVM HYPOCHONDRIACVM.

§. 462.

Hypochondriaci Veteribus vocati sunt Lienosi, seu, qui magnos lienes habent, de quibus scripsit *Carolus DRELINCVRTIVS*. In malo hypochondriaco est concursus plurimorum et omnis generis symptomatum. Describi potest, quod sit morbus spasticus, qui oritur a corrupto sanguine alioque humore in viscera abdominis chylicationi inferuentia contracto, praecipue, si haec viscera imbecilliora officio suo non defunguntur, et crudos atque chyficationi non inferuentes succos conficiunt. Differt itaque sede a malo hysterico. Quibus hic morbus instat, illi sentiunt oppletionem et quasi quoddam pondus in hypochon-

chondriis. His inflatis spirandi oritur atque increbrescit difficultas cum cardialgia. Adpetitus est interdum nullus, interdum fames quasi canina vrget. In ventriculo adcumulantur cruditates, plerumque ex victu vegetabili, acidae, interdum ex animali rancidae, nidorosae, putrescentes. Alvus iunioribus adstricta et sicca est, aliis, vbi iam morbi vetustas et viscerum imbecillitas accessit, liquida est et fusa. Vrina, instante accessione, aquae similis est, pallida, in decessione crassa, ex qua alba vel alia desidunt. Nonnumquam fulua est, tenuis et cruda, semper mutabilis. Accedit capitis dolor, pedum refrigerium, totius corporis languor, frequens cordis palpitatio, pulsus nonnumquam inaequalis et intermittens, aurium susurrus, omnium sensuum internorum atque externorum hebetudo, oculorum mentisque quaedam caligo. Tandem homo de dolore conqueritur in hypochondrio sinistro, eo loco, vbi intus lien est. Dolor saepe in cardia sentitur, quamvis morbi sedes sit in hepate vel liene. Nam propter neruorum octauī paris insertionem in τὴν καρδίαν eorumque cum intercostalibus et plexibus abdominis nexum, dolor saepe sympathicus est. Id, quod hypochondriacis prae ceteris omnibus molestum esse solet, est ille ineuitabilis angor, quo conficiuntur et qui etiam suas accessiones remissionesque habet. Animus enim inconstans est, quem interdum summa incedit tristitia, magnum interdum et saepe inane gaudium. Omnes hypochondriaci praecipites in quacuis auxilia et medicamenta feruntur, mox tamen priorum pertaesi ad alia confugiunt. Semper extrema metuunt, et vel minima in se ipsis observant. Tandem morbus, cui vetustas accedit, et qui subinde se remittit, subinde aliis rebus non-naturalibus multum exasperatur, degenerat in scorbutum, viscerum scirrhum, nephritidem, epilepsiam. Saepe hypochondriaci vanas imagines accipiunt, quibus post, ingrauescente morbo, mens ita addicta est, vt ab iis abduci nequeat, et tandem vera melancholia atque insania oriatur. Et hic morbus

bus a parentibus traditur liberis, in quibus vix vnuquam penitus tollitur.

§. 463.

Multum de sede et causa huius morbi disputatum fuit. Veteres eam posuere in solo liene, alii ex recentioribus existimauere, primam sedem esse in colo, flatibus fecibusque distento. Propius a vero est, sedem principem esse in visceribus abdominis et hypochondriorum. Prima occasio nasci videtur ex concoctione laesa adsumtorum, si incofectus chylus sanguini adfunditur. Nam post et alii succi crudi manent, qui crudus plerumque terrestris, acidus, oleosus falsusque sanguis in venam portae, per viscera abdominis diuisam, contrahitur. Ab hoc sanguine concitantur spasmi, et a male affectis nervis impeditoque humorum circuitu oritur sensus ille molestus et magna anxietas. Lympha tandem fit corrupta, vnde Scorbutus. Propter sanguinis motum impeditum intumescunt arteriae venaeque, et sequitur sanguinis per haemorrhoides profluuium, interdum vomitus cruentus. Haemorrhoidum enim fluxus etiam in hoc morbo non semper salutaris, vel criticus est, sed interdum symptomaticus. Negandum tamen non est, magno vel continuo profluuiio hunc morbum non raro solui. Si humoris illius crudi metastasis sit ad cerebrum, vel si cerebrum ex male affectis nervis irritatur, dira oriuntur mala, mania et epilepsia. Si vero salutaris metastasis sit ad articulos, nascitur podagra. Nonnumquam per totum corpus diducta mala materia per sudores eiicitur. Nervorum maxima imbecillitas est hypochondriacis, quibus ob id summa est instantia mutabilitasque.

§. 464.

Origo itaque causarum, ex quibus hic morbus nascitur, ducenda est ex laesa viscerum actione et laesa concoctione adsumtorum. Igitur cibus nimius, crudus, austerrus, durus, omnis ingluuies, potio per fermentationem coacescens, cereuisiae minus valentes, vina oligophora,

opera sedentaria, litterarum studium, lucubratio, vigiliae, quaevis mentis agitatio, ex amore vel moerore, nimia Venus, nimia corporis exercitatio, praecipue in aëre sicco et feruido, deficiente potu diluente, morbi varii, febres vel diutius toleratae, vel adstringentibus praepostere curatae, abusus medicamentorum purgantium, emeticorum, nitrosorum, salium, opiatorum, nec non sumpta venena lenta, hunc morbum facere possunt. Sciendum vero, quum nihil omnino ob vnam causam fieri possit, id pro causa adprehendi, quod plurimum contulisse videtur. Non parum confert abdominis valentior compressio, qua sanguinis circuitus impeditur.

§. 465.

Morbus longus esse solet, quippe qui pedetentim ortus, difficillime tollitur, raro autem hominem praecipitat, vel si solus est, consumit. Mutatur in alios morbos, interdum mortiferos, scorbutum, cachexiam, melancholiam, apoplexiam, insaniam, nervorum distentionem, epilepsiam, id quod fit, si mala materia mobilis facta, in cerebrum aliasque partes conuertitur. Multum nocet aegrorum pusillanimitas, qui quotidie noua consilia amplectuntur, et medendi rationem mutant, deuoratisque omnis generis pharmacis, malum intendunt. Alui profluuium morbum ad breue tempus leuat, raro vero soluit, nisi insolita quaedam et ipsa atrabiliaris materia per eam descendat. Mala morbi symptomata sunt vertigo, quae nonnumquam epilepsiam, apoplexiam, coecitatem adfert, et si aeger inter verba desipit, vbi metus est verae insaniae. Non solum haemorrhoidibus, sed ortis etiam varicibus morbum solui, ex antiquissimis auctoribus constat. Saepe tamen frustra haec crisis speratur, et male faciunt, qui medendi rationem ei soli aptare volunt.

§. 466.

Si morbo medendum, non eadem omnibus conueniunt, nec in curatione properandum est. Maius fere auxilium

xilium est in victu et corporis exercitatione, quam in medicamentis. Exercitatio quotidiana aequalis, qua sanguis non nimium citatur, saluberrima est. Ceteris exercitationum modis praeferenda est equitatio. Potus sit diluens, non nimius, nec nimis parcus; nocet fermentescens, omnis cereuisia et vinum austerum, oligophorum. Pauperibus conuenit aqua fontana, aliis Ptisana ex radice Scorzonerae, Cornu Cerui vsto vel raspato. Proficit etiam aqua Selterana cum paucio vino, sed meraciori. Maximum praesidium est in aquis mineralibus, quas aegrorum viribus accommodari oportet. A diluentibus minusque valentibus transeundum ad euacuantes, veluti ad Thermas Carolinas. Si harum aquarum copia non datur, arte similes ad methodum HOFFMANNI parari possunt. Cibus accommodari debet illis cruditatibus, quae in ventriculo et visceribus sunt, quas ex ructu, deiectionibus aliisque signis cognoscere non adeo difficile est. Omnia nocent, quae ventriculum onerant, nimis falsa, pingua, olera et legumina flatulenta, carnes et iuscula pinguiora. Panis sit levis, candidus; caro, si haberi potest, ex ferarum generibus, vel gallinis pullisque. Inter olera Spinachium et Lactuca conueniunt. Aër temperatus sit, et plurimum confert, si aeger ruri esse potest. Nocet Venus et vigilia, prae ceteris negotiosa actio, litterarum studium, lucubratio, cura et sollicitudo. Nihil magis necessarium est, quam placidus somnus, qui, ubi malum ingrauescit, eripitur, ideo omni studio arcessendus.

§. 467.

De sanguinis missione compertum habemus, eam lenamen afferre aegris, praecipue ex plethora hypochondriacis. Malum vero non tollit, et frequentior corpus infirmat, morbumque pertinaciorem reddit. Idem fere dicendum de purgantibus. Aegri enim semper de aluo solliciti purgantia optant. Educenda est per aluum cruditas. Oportet etiam malam materiam, quae in primis viis haeret, atque, ut videtur, in ipsam venam portae contracta est, ubi mobilis

mobilis est, in intestina conuertere; sed hoc pedetentim fieri necesse est. Nam purgantibus tam resinosis et acrioribus, quam salinis, immo ipsis nitrosis, infirmantur viscera. Auxilia illi acrimoniae vel cruditati, qua laborat aeger, accommodanda sunt. Si acidum abundat, si color pallidus est, et aeger cacochymia sine aestu et febre laborat, vrina frequentius pallida est et aquosa, danda sunt resoluentia: Pilulae Stahlii, Sapo Venetus, ad drachmam j. per diem deglutendus, interpositis Salibus alcaliscentibus, voluti Sale Thermarum Carolinarum, Absynthii, Cardui benedicti. Salubria etiam sunt infusa per epicrasin laxantia, ex amarioribus composita. Plurimum extollunt radices herbaeque lacteo succo turgidas, quas recenset BOERHAAVIUS in *Mat. med. ad §. 614* Conf. *van SWIETEN ad eandem paragr.* Aestate herbae recentes, hyeme radices, quae arena obrutae adseruandae sint, in officinis coquantur ex aqua, et quotidie potentur. Omnibus tamen praeserunt decoctum radice Cichorei recentis; vid. *van SWIETEN l. c.* Cum eiusmodi decocto dari possunt Pilulae ex Gummi ammoniaco, Galbano, Asa foetida, Sapone Veneto, Terebinthina, ita, ut aeger his superbibat decoctum. Ceteroquin morbus, si non tollitur, plurimum is leuatur usu Thermarum et omnium aquarum mineralium, praecipue si cum his dantur Pilulae ex Becheri compositione, Sapone et similibus. Si vero signa certiora sunt, aegrum scirrhus vel ulcere visceris laborare; et si hunc febricula extorret, si color ei non pallidus, sed luridus, et anima foetida est, modo dicta auxilia aliena sunt, et plerumque morbus, qui tolli nequit, trahendus est. Conducit his serum lactis, ex quo herba Centaurii minoris coquatur. Interdum lac ebutyratum, serum lactis dulce Hoffmanni, et si lac ventriculo non graue est, lac asinum vel caprillum potari potest cum aquis Selteranis, vel cum decocto Scorzonerae, Cichorei, Taraxaci. Aluus ducatur Tamarindis, Manna, Cremore Tartari. Si post medicamentorum resolu-

soluentium diuturnum vsum aliquando varia symptomata, nausea, ructus, anxietas, pulsus celer, febrilis, inaequalis et intermittens oritur, scire licet, materiam mobilem esse, et naturam aliquam excretionem moliri. Tunc crebrius in aluum immittendae sunt emollientes lotiones, vt mala materia in eam conuertatur; abstinendum est ab omni efficaci medicatione, tanto magis ab euacuantibus, seruataque quiete, curiosiorique victus ratione, naturae motus obseruari debent, minime turbari.

§. 468.

Tandem vero, si mala materia per quaecumque viam, per haemorrhoides, aluum, sudorem, podagram, euacuat fuit, confirmanda iterum viscera sunt, id quod tamen exercitatione et victu magis, quam medicamentis, fieri potest. Salubriter tamen dari possunt cortex Peruvianus, vt et Martialia, Tincturae martiales, vinum, in quo candens ferum extinctum est, Crocus martis antimoniatus Stahlit. Conducit pulvis stomachicus Birkmanni, nec non Elixirium stomachicum ex Extractis amaris cum vino compositum. Aluus numquam adstricta sit, sed solvatur cibo magis ad id composito, quam medicamentis, etiam clysteribus. Si a nimia meditatione et litterarum studio morbus venenatus fuit, vel multum exasperatus, plurimum confert, si circumcisa negotiosa actione homo ruri per aliquod tempus esse potest, vel in amoeno mollique itinere, qua ratione etiam illae vanae imagines, si illis mens iam addicta est, tandem delentur. Homines autem, qui inertis otio languentes quae-ruli sunt, et omnium rerum diligentiores obseruatores, illi ad laborem atque ad negotiosam actionem compellendi sunt.

TVMOR



* * * * *

TVMOR ET SCIRRHVS LIENIS.

§. 469.

Atque in liene et hepate sanguis, bilis, aliaque humida, vel sincera, vel corrupta, subsistendo itinera claudunt, ita, vt haec viscera dura fiant, atque vel cum, vel sine dolore intumescant. Tumor vel ad inflammationem suppurationemque spectat, vel durus factus in verum scirrhum degenerat. Et hic ab initio haud dolet; vbi vero is magis nocenter adolescit, intus punctiones sentiuntur doloresque, qui veri carcinomatis metum faciunt. Lien intumescit, si haemorrhoides non proueniunt. Notus est nexus inter venam splenicam et haemorrhoidalem internam. Saepe etiam tumor cum duritie nascitur in hypochondriaco morbo, cui iam vetustas accessit. Raro ex ictu extrinsecus illato tumor in liene oritur, qui frequentius hac occasione ruptus, lethalem sanguinis profusionem excitat. Est inter hepar et lienem consensus, vt, si vnum viscus laborat, alterum etiam adficiatur.

§. 470.

Huius morbi instantis notae sunt, si homo, qui diu morbo hypochondriaco confictatus est, vel cui haemorrhoides suppressae fuerunt, de sensu quodam obscuro atque obtuso in regione hypochondrii sinistri, non procul a dorsi spina, conqueritur, qui dolor eo loco manet, vt, si exasperatur, ad superiora, ad pectus et iugula tendat; semper tamen sinistrum latus occupat. Dolor differt a nephritico, qui lumbos afficit, et qui vel cum inflammatione est, vel cum spasmis. Is enim, qui ab indurato liene oritur, vix non perpetuus est. Colicus dolor vrget maxime in illo coli sinu, qui sub liene est, quare is vt plurimum opinionem dolentis splenis adferre potest. Is vero perpetuus haud est, sed per intervalla intestina cum summa inflatione torquet et cruciat,

cruciat, ob id etiam sedem mutat. Lienosis est crebrior et difficilior spiritus, praecordiorum anxietas, tussis sicca, decubitus in dextrum latus molestus, in sinistrum iucundior, adpetitus quandoque caninus, quandoque nullus, celerior vero oppletio a cibo adsumto. Vbi morbus ingrauescit, et in carcinoma tendit, facies est lurida et liuida, vrina interdum nigricans, anima foetida, ptyalifinus perpetuus, languor et marcor tandemque hectica. Sub finem cachexia, maxime atrabilaria, accedit, et toto corporis habitu corrupto sunt vlcera cacoëthea in artubus. Ex genitalibus mulierum et haemorrhoidum venis, increfcente in dies imbecillitate, effertur sanguis nigricans, acris, lintea rodens, sub finem diarrhoea cruenta mortem infert. Aliquando tumor ita increfcit, vt extrinsecus etiam tactu cognosci possit. Post mortem tumores et carcinomata reperta fuere.

§. 471.

Morbus hic, prout dictum, saepe ex aliis morbis oritur, praecipue, si aduersus malum hypochondriacum mala medicatio per volatilia, absorbentia, martialia fuit adhibita, vel si febres volatilibus et adstringentibus, acutae refrigerantibus fuerunt curatae. Grauis hic morbus et cum summo periculo est, qui non nisi inter initia tollitur. Si enim verus scirrhus lienem occupat, is omni medicatione concitatur et in carcinoma vertitur. Interdum oborto vomitu cruento, vel si purulenta atque nigra per os atque aluum reiciuntur, increfcente imbecillitate, mors instat. Ex tumore vero, cui materia frigida et glutinosa subest, nascitur oedema et tandem vera ascites. Nam, dum venae, quae sanguinem ferunt, in his tumoribus praecluduntur, tumescunt venae lymphaticae, quarum plurimas humidum suum in venas sanguiferas infundere constat. Raro accidit, vt in liene suppuratio fiat, quae etiam vel gangraena finitur, vel tabe et hectica.

§. 472.


§. 472.

In curatione ab initio consideranda sunt communia haemorrhoidum, menstruorum vitia, malum hypochondriacum, quibus medendum est. Sanguinis missio quandoque leuamen affert, frequentius, nisi alia eam requirant, nocet. Praeter haec communia consideranda est hominis et morbi natura. Quibus, vt Veteres loquuti sunt, intemperies calida est, seu vbi tumor est cum febricula, iis dari possunt mitiora, Liqueor terrae foliatae Tartari, Acidulae temperatiores, serum lactis chalybeatum aliaque. Alius solui debet interdum Manna et Tamarindis. Quibus vero intemperies frigida est, et cachexia vel hydrops imminet, illis conducunt infusa per epicrasin laxantia, Pilulae ex Sapone Veneto atque extractis amaris, ex succo herbarum paratis, veluti Extractum Centaurii minoris, Cochleariae, Fumariae, Absynthii, addito etiam, si efficacioribus opus esse videtur, Gummi ammoniac. Eadem curatio adhibenda est in iis, quibus hic morbus a male curata febre ortus fuit. Cibis necessarius est boni succi, et qui facile concoquitur. Potioni praestanda est ptisana, praecipue decoctum Cichorei, cui Veteres specificam virtutem tribuerunt. Decoctum radice recentis succulentae, cum melle vel Symplico radicum aperientium, salubre est. Nec alieni sunt succi herbarum sic dictarum antiscorbuticarum, Nasturtiorum, Cochleariae, Acriuiolae, Acetosae, Acetosellae. Succus hi cum melle subigi et deglutiri possunt. Corpus exercendum est motu composito, sed quotidiano; tandem, vbi aliquid ex tumore minui coepit, confugiendum est ad martialia. De usu horum medicamentorum et aquarum mineralium tenendum est, haec omnia quandoque saluberrima esse et morbo idonea; si vero iam scirrhus verus est et durus, metum esse, ne ruptis lymphaticis vasis oriatur hydrops, qua re mors maturari potest. Si vero sanguis bile abundans tumori subest, is curatione quauis concitatus et acrior factus, lethalem putredinem et exulcerationem asferre solet.

§. 473.

§. 473.

Extrinfecus, si resolutio sperari potest, admoueri possunt fomenta calida et epithemata, ex decocto radicis Capparis, herbae Scolopendrii, Centaurii minoris, Absynthii. Experiri etiam licet vaporem ex aceto acerrimo, in quo flix ignitus exstinguitur, qui vapor per infundibulum admouetur. Specificam virtutem tribuunt oleo Capparum, quod cum aliis oleis misceri potest. Nec aliena sunt Emplastra, de Ammoniaco et de Cicuta, quae cum oleo Capparum malaxari queunt. Et haec, si morbus adoleuit, sine pernecie adhiberi nequeunt, quum scirrhum etiam concitare possint. Vbi morbus, qui curari nequit, trahendus est, consideranda sunt symptomata. Cibus sit modicus, a fame propior, alius interdum, sed rarius lenissimis ducenda. Reliqua omnia communia sunt.



TVMOR ET SCIRRHVS HEPATIS.

§. 474.

In multis cum tumore et scirrho lienis conuenit, eandem causam habet, nec alia ratione curatur. Sunt tamen quaedam discrimina. Hepar enim aliquando totum, aliquando eius tantum pars intumescit. Hoc accidit vel ex sanguine crasso, feculento seu atrabilario, vel ex humore lento, glutinoso et viscido. Alia differentia est. Plerumque, si infarctus vel scirrhus nascitur a mensium et haemorrhoidum impedito profluuiio, a febribus male curatis, is cum tumore esse solet, ut vel totum iecur, vel eius pars mole adaugeatur. Aliquando vero iecur scirrhusum fit per *νεκρωσιν* seu vasorum exinanitionem, dum minores arteriae venaeque post magnam euacuationem, veluti haemorrhagiam

T

rhagiam

rhagiam exinanitae et collapsae inter se concresecunt, vt sic vasa atque bilis itinera omnia praecludantur.

§. 475.

Signa huius morbi vix alia sunt, quam quae de Liene dixi. In non valde obesis tumor extrinsecus tactu percipitur, facies vel pallida, vel icterica est, spiritus propter maiorem molem, quae ex diaphragmate dependet, maior difficultas, decubitus in dextro latere iucundior, saliuu tenax, viscida, amaricans. Nonnumquam vomitus acidorum vel rancidorum. Accedit tandem macies, oedema et hydrops. Vrina ab initio pallida, mox cruda, tandem, praecipue accedente febricula, talis, qualis est hecticorum. Per aluum spumea crudaque descendunt. In colore faciei est quaedam differentia. Nam si obstructio a lento et viscido orta est, facies cum pallore inalbescit, qualis color esse solet hydropticis, qui tandem luridus et plumbeus fit. Si vero materia atrabilaria in iecur contracta in eo haeret, vel si tumor post icterum natus fuit, in oculis et cute id, quod album esse debet, luteum fit. Primum morbi genus est longum et tendit in hydropem, alteri febricula plerumque accedit, quae hominem celerius consumit.

§. 476.

Verus ac vetustate confirmatus hepatis scirrhus numquam tollitur; inter initia id auerti potest. Interdum tumor soluitur mensium et haemorrhoidum profluuium aucto et critico, interdum etiam superueniente febre intermittente, praecipue quartana. Si tumente iecinore purulenta cruentaque per aluum descendunt sine leuamine, oritur fluxus hepaticus, de quo deinde dicturi sumus. Hydrops ex hepatis scirrho ortus, tanto magis in iis, quibus ex spiritus ardentis crebriore potione hepar affectum fuit, funestus est. De calculis, qui quandoque in hepate nascuntur, occasione icteri dicendum.

§. 477.

§. 477.

Nec curatio huius tumoris alia esse solet, quam tumentis lienis. Sanguinis missio locum habere potest in plethoricis, si vitium a mensium et haemorrhoidum suppressione ortum fuit, atque inter prima eius initia. In aliis, videlicet, si morbus a male curata intermittente relictus fuit, vel si is adoleuit, eique vel hydrops, vel febricula accessit, sanguis sine perniciē haud mittitur. Si, id quod frequentissimum est, ex glutinoso, viscido, hepar intumuit, danda sunt saponacea: Pilulae Stahlī, Sales cathartici, et, quae ex his et Rhabarbaro ac foliis Sennae componuntur, Apozemata. Praestantiora sunt infusa per epicrasin laxantia, ex amarīs atque Rheo. Vbi vasa lymphatica nondum rupta sunt, egregiam opem praestant aquae minerales, adhibitis simul saponaccīs, Sapone Veneto, Pilulis Becheri et similibus. Proficit etiam multum Sapo Venetus quotidie et bis per diem ad drachmam semis, vel scrupulos ij. deglutendus, vel etiam Sapo Lentilii, cuius compositio legitur in *BIANCHI Historia hepatis Part. III. p. 320.* Omnia vero haec medicamenta morbum, si huic vetustas accessit, non leuant, sed exasperant, immo aegrum celerius praecipitant. Extrinsecus adhiberi possunt Emplastra vel Linimenta: Emplastrum de Cicuta, de Meliloto, cum Emplastro diaphoretico Mynsichti, quibus parum Croci admisceri debet. Cauendum tamen est, ne internis mouentibus, externis mollientibus, per materiam agitatam mobilemque factam, vasa lymphatica rumpantur, et oriatur vel suppuratio; vel malum vlcus, quod vltimum nullam, prius difficilem curationem recipit. Victus omnibus accommodandus est. Potioni praestari potest aqua, vel decoctum radicū aperientium, vel folius Cichorei, cui specificam virtutem tribuunt. Cum aqua aeger bibat vinum meracum paucum. Potissimum in iis casibus, vbi in visceribus imbecillitas est, laudem habet Vinum Gallicum Pontae, si id meracum est et sine acore. Si haec per tempus adhibita

fuerunt, et facta fuit quaedam resolutio, id quod ex deletionibus et vrina intelligitur, sub finem dari debent tonica, Tincturae martiales, Tinctura Martis Ludovici, nec non Tinctura Martis cum succo pomorum Borsdorfianorum, Infusum Corticis Peruvianum cum Limatura martis.

§. 478.

Vbi autem contabuit hepar cum duritie, et vbi iam vetustas accessit, vitium nullam curationem recipit. Vbi vero post magnam sanguinis profusionem huius rei timor est, mox danda sunt iuscula carniū iuniorum, ex quibus coqui possunt variae herbae: Acetosae, Acetosellae, Nasturtii hortensis, Petroselini, vel radices recentes Petroselini, Cichorei, Apii, Scorzonerae, adiectis Canceris fluuialibus, quae iuscula per plures dies sorberi debent. Nec alienum est lac asinum vel caprillum, quod aquae Selteranae, vel decocto radice Cichorei, Taraxici, Graminis, Polypodii, admisceri potest. Nec negligendus est victus corporisque exercitatio.



I C T E R V S.

§. 479.

Morbus hic, quem et regium vel arquatū vocant, a bile nascitur, si haec, sanguini et lymphae admixta, per totum corpus et minima vascula, tum sanguifera, tum lymphatica, diffunditur. Luteus color, dum id, quod album est in corpore, luteum fit, morbum detegit. Hic vero color primum conspicitur in partibus, ad quas teneiores succi perlabuntur, prae ceteris in tunica adnata oculorum. Ceteroquin, quibus hic morbus instat, ii sentiunt torporem; segnitiam, nauseam, oris amarorem, spiritus difficultatem, grauitatem praecordiorum, cardialgiam, vomitio-

mitionem, ructum acidum et nidorosum. De dolore quodam in hypochondrio dextro sub cordis scrobiculo, sub quo folliculus felleus et bilis itinera sita sunt, conqueruntur. Saepe febricula accedit, et tandem color ille primum oculis, post vniuerso corpori inducitur. Vrina lintea luteo colore inficit, est saepe cruda; saepe rufa, quae crassa trahit, et ex qua etiam talia desidunt. Aluus raro respondet, et quae descendunt colorem naturalem non habent, sed cinereum, et sunt argillae simillima. In cute; quae ad tactum arida est, aegri pruritum sentiunt, in ore amarorem. Et sudor interdum luteus profluit, quo lintea inficiuntur. Distinguunt icterum in flauum et nigrum. Veteres prioris sedem in hepate, alterius in liene posuerunt; sed vix aliter differunt, quam gradu. In ictero enim nigro tum sanguis, tum bilis, omnesque alii succi magis alienati corruptique sunt. Per icterum album nonnulli chlorosin intelligunt, de quo morbo suo loco. Icterus criticus dicitur, si alii morbi eo soluuntur.

§. 480.

Oritur hic morbus ex variis causis, ex quibus accidere potest, ut copiosior bilis sanguini admisceatur, vel ut nulla bilis per sua itinera in duodenum feratur. Sedes igitur morbi est vel in sanguine, si v. g. ab animali venenato celerius resoluitur corrumpiturque, vel in hepate et illis itineribus, quae bilem a sanguine secretam ab hepate excipiunt, vel, id quod rarius est, in ductu cholocho, vel in cystide, vel in duodeno. His enim omnibus efficitur, ut abundantior bilis cum sanguine ex hepate iterum in venam cauiam transfundatur, ex hac in cor, et tandem ex hoc per vniuersum corpus diuidatur. Frequentior causa est spasmus, si eo haec itinera grauiter commouentur coarctanturque. Inprimis hoc accedit, si homines vel mox ante, vel post cibum vinique potum irascuntur. Etiam spasmi concitantur drastico emetico, valentiori purgante, et colica spasmodica. Interdum id accedit a vermibus, a vene-

nis adsumtis, vel etiam a morſu alioque vulnere venenato. Huius rei notae ſunt, cauſſa praegreſſa, et in venenis, ſi morbus ſubito inuadit, cum animi affectione, cardialgia et aliis vehementioribus ſymptomatibus. Qui hepatitide laborarunt, icterici ſunt, quoniam in viſcere inflammato nulla ſit bilis ſecretio. Huius morbi notas ſcire licet ex febre inflammatoria, dolore inflammatorio, de quibus ſupra (de Hepatitide) dictum eſt. Si hepatitis ad ſuppurationem ſpeſtat, matureſcente materia, abſceſſus vel in gibba hepatis parte ſub peritonaeo rumpitur, vel purulenta, per bilis itinera in duodenum feruntur. Et tunc icteri genus naſcitur, quod inter alia peſſimum fere eſt. Illud intelligitur ex praegreſſa hepatitide, ſi haec ipſaque febris cum dolore ſepedetentim abſque coctionis ſignis in vrina, et ſine alia notabili excretionem remittit, febricula vero cum frequenti horrore et dolore obſcuro pulſante relinquitur. Vbi vero abſceſſus ruptus eſt, pus per aluum deſcendit, et homo tabe perit, vel in abdomen effuſum gangraenam concitat. Scirrhus etiam ex inflammatione manet, et icterum parit, ſi in hepatitide febris abſque reſolutione et ſuppuratione conquieſcit, relicto tumore magno duroque, qui extrinſecus tactu etiam ſentitur, cum ſenſu ponderis et difficultate ſpirandi. Icterus oritur etiam ex praecluſis itineribus per bilem viſcidam glutinoſam. Et hoc oſtendunt cauſſae, torpidum otium, victus glutinoſus, vegetabilis, crudus, faciei color magis, quam in ceteris, ex pallido flauus. Hoc vitium ſine febre ſitque eſt, maius vero pondus in hypocondriis cum maiori ſpirandi difficultate eſſe ſolet. Naſcitur icterus quandoque a flatibus et ſpaſmis inteſtinorum, quibus cholodochus conſtringitur. In hypocondriacis et hyſtericis frequens eſt. Atque ob id icterus interdum colicam ſpasmodicam ſequitur, interdum ſpaſmus a vermibus, inteſtina occupantibus, concitatur. Hoc genus ſubito inuadit aegrum, mox iterum euaneſcit. Cauſſa manifeſta eſt ex colica flatulenta, vel adſunt vermes, quorum alia ſigna ſunt ſuo loco exponenda. Tandem icterus oritur ex calculis,

culis, qui vel in hepate, vel in cystide, vel in bilis itineribus haerent, et haec praeccludunt. Qui tales cholelithos seu calculos habent, conqueruntur de spasimis acutisque doloribus in dextro hypochondrio cum summa anxietate. Hic dolor quandoque subito exoritur cum luteo colore per corpus diffuso, is vero non raro iterum desinit, evanescente etiam alieno colore. In his fex dura, subpallida, per aluum excernitur, et cum hac interdum, post atrocissimos sub scrobiculo cordis cruciatus, minores calculi. Non tamen omnes, qui calculis his felleis laborant, ictero laborant. Calculos etiam per aluum efferri rarum est. Etiam infantes aliquando in lucem eduntur cum ictero, vel dum lactantur, eo laborant. Id quod fit, si materia glutinosa duodenum occupat. Infantibus, qui lacte crudiori aluntur, hoc frequens est, si lactis coagulo duodenum impletur et praeccluditur cholodochus.

§. 481.

Icterus non semper mortiferus est, numquam vero sine omni periculo, praecipue in senibus, aliisque, quibus viscera infirmiora sunt. Qui ex ira ortus fuit, is facile soluitur, mox autem, data occasione, reuertitur. Si in ictero in dies et multum augetur spiritus difficultas, praecordiorum anxietas, et dextri praecipue hypochondrii tumor, et superuenit asthma spasticum, is tendit in hydropem. Si febricula accedit, ea metum hecticae facit. Si hydropem laborantes icterici fiunt, mors denunciatur. Raro accidit, ut ictericus febre ardente corripiatur, propter bilis in sanguine abundantiam, tunc vel homo, vel morbus tollitur. Si vero in alia febre acuta et biliosa aegri cum coctionis aliisque bonis signis icterici fiunt, icterus criticus est et salutarius. Si vero hoc accidit consistente auctaque febre, sine ullis coctionis signis, praecipue si haec in vrina desunt, aeger sanari nequit. Icterus soluitur vrina, quam crassam, rufam, flavescentem, et qua lintea croceo colore tinguntur, esse oportet. Vrina vero non biliosa sed *νεφρωδες*, seu

T 4

farinosa,

farinosa, pessima est, et significat materiam tenaciter inhaerentem, magnam cruditatem et pertinacem morbum. Icterus quartanae superueniens, vix non semper mortis indicium est. Si icterus ex mensium et haemorrhoidum suppressione oritur, his prouenientibus soluitur. Icterus niger raro, et non nisi interdum in iunioribus curatur. Sudor flauus, lintea tingens, bonus est. Icterus in decessione esse significat, cutis color pedetentim mutatus. Nam si hoc subito fit, in morbo, qui pedetentim adoleuit, nulla facta excretionem, interdum metus esse potest, ne in hepate scirrhus nascatur.

§. 482.

In curatione semper considerandae sunt causae, et si febris accedit, etiam huic accommodanda est curatio. Si icterus ortus fuit a spasmo, id quod frequentius ab ira, aliquando ab aliis causis incidere solet, vitanda sunt emetica, dari possunt absorbentia cum digestiuis, pulueres ex Cremore Tartari, Tartaro vitriolato, Terra foliata Tartari, Sale cathartico, additis Conchis, lapidibus Cancrorum, Magnesia alba et Nitro. Quibus praemissis, horis vespertinis dari potest Rhabarbarum cum Sale cathartico, Tartaro tartarifato, vel alio. Etiam proficit Liquor terrae foliatae Tartari. Nec aliena sunt decocta ex radice Glycyrrhizae, Polypodii, Cichorei, addito Cremore Tartari, Tamarindis, Passillis. Si vero spasmi non ab animi perturbatione, sed ab acrimonia quadam, adsumto veneno vel alio, quibus duodenum et itinera bilis constringuntur, orti fuerunt, sales alieni sunt, et danda sunt pinguis, oleosa, emollientia aliaque, quae aduersus cognitam acrimoniam maxime valent. Medicamenta calida et sanguinem cientia malum augere et febres accendere solent. Non alienum est, si cum his hypochondrio dextro et scrobiculo cordis fomenta, vel vesicae madentes et decocto emolliente plenae superhabentur. Ex lacte flores Chamomillae, Verbasci, cum herba Meliloti coqui possunt. Etiam multi vsus cum his esse possunt

possunt Enemata ex fero lactis, ex quo Cichoreum, Taraxacum cum Tamarindis coquantur. Si icterus post drasticum emeticum relictus fuit, danda sunt temperantia, lapides Cancrorum cum acido Citri, addito paucō Nitro, nec non Emulsionēs ex semine Papaueris, seminibus frigidis, addito Nitro. Ex his blandiora enemata multum profunt. Si vero icterus ab humore viscido et glutinoso ortus fuit, morbus, antequam tumor in verum scirrhum degenerauit, curationem recipit. Nec alia curatio est, quam qualem supra praecepimus. Si nulla febris adest, conducunt Sales neutrius generis, Liquor terrae foliatae Tartari, sal catharticus, sal mirabilis Glauberi, sal stipitum fabarum, Cremor Tartari, sal Cardui benedicti, Absynthii, et prae ceteris sal Thermarum Carolinarum. Multum etiam proficiunt Saponēs illi supra propositi. Efficaciores sunt Thermae Carolinae, inprimis, si cum his Sales, Pilulae Stahlianæ, Sapo aliaque resoluentia dantur. Nec aliena sunt infusa, ex vini et aquae aequis partibus cum radice Glycyrrhizae, Polypodii, Cichorei, Taraxaci, Vincetoxici; herba Centaurii minoris, Beccabungae, Nasturtii, semine Petroselinii, Foeniculi, Nasturtii aquatici, additis Rhabarbaro, Bryonia, sale Thermarum, vel sale Tartari. Etiam ex his commode fiant decocta, quae Pilulis Stahlianis et Saponi superbibantur. In omnibus his curationibus illud perpetuum est, a lenioribus et digerentibus transeundum esse ad efficaciora et euacuantia. Nam haec vltima, vbi materia nondum mobilis est, nocent. Nec magis sunt tuta emetica. Nam vbi iam vetustas accessit, viscera admodum infirma, et humida, quae in praelusis vasis haerent, alienata corruptaque sunt, metus est, ne illis receptaculis ruptis, mala viscera fiant, quae post nulla arte glutinantur. Bilis enim longe facilius, quam cetera humida, in viscere hoc molli atque friabili corrumpitur, quae res si accidit, iecioris exulcerationem et morbum hepaticum relinquit. Negandum tamen non est, si materia, quae sanguinis vasa et bilis itinera subsistendo claudit, adhuc mobilis est, eam vo-

mitu per emeticum moto aliquando feliciter expelli, id quod tamen nec perpetuum, nec sine omni periculo est. Sub finem non omittenda sunt roborantia, martialia, Tinctura Vitrioli Martis Ludouici cum Essentia Centaurii minoris, Crocus martis antimoniatus, qui Trageis admisceri potest.

§. 483.

Si vero ictero febris superuenit, et calor vrget, maxime in corpore vel senili, vel infirmo, vitari oportet efficaciora tum resoluentia, tum euacuantia. Dari potest Liqueor terrae foliatae Tartari, addito etiam Nitro, et proficit decoctum Auenae, quinque radicum aperientium cum Oxysaccharo, vel Oxymelle, vel Syrupo de Cichoreo cum Rhabbarbaro. Vbi maior aestus est, fieri potest decoctum ex pomis recentibus dulcibus, cum Oxymelle et Oxysaccharo; vel ex auena excorticata, hordeo mundato, oryza, quibus ad cohibendam putredinem oxymel, oxysaccharum, Pulpa Tamarindorum, nec non Liqueores illi acidi adiici possunt. Vbi tandem febris se paullulum remisit, adhiberi possunt efficaciora, et inter alia, aluum ducentia, ex Tamarindis, Passulis, Cremore Tartari et Rhabbarbaro. Icterus a colica flatulenta et refrigerio ortus, carminatiuis curatur. A calculo felleo requirit emollientia: Decoctum Althaeae, Glycyrrhizae, Maluae, florum Chamomillae, Verbasci, &c. Emulsiones, Serum lactis, cum quibus adhiberi possunt extrinsecus fomenta ex lacte, balnea et alia, quibus bilis itinera laxari possunt. Potioni praestandum est decoctum furfuris. Icterus ex abscessu hepatis relictus nullam curationem recipit. Danda sunt acidulata: Decoctum Auenae excorticatae cum Passulis, Decoctum Hordei cum succo Citri, vel addito Roob quodam acidulo, Cerasorum acidorum, ribesiorum, berberum &c. Decoctum Tamarindorum et Passularum, et his similia. Si icterus criticus alios morbos soluit, nihil agendum, vel ad minimum in curatione haud festinandum est: color enim ille fla-

uus

nus breui et sponte dissipatur. In infantibus, si icterici in lucem prodierunt, conducit Rhabarbarum, addito paucio Nitro. In aliis, quibus a lactis coagulo praecusum fuit choleodochus, illud optime soluitur Sapone. Curatio venenorum, tum intus sumtorum, tum vulnerum, morfu animalium telouue venenato illatorum curationes, ex alibi dictis de inflammato ventriculo et ex Chirurgia discuntur. Vermes anthelminticis expelluntur.

§. 484.

His accommodandus victus est. Noceant omnia cruda. In ictero ex humorum lentore, profunt iuscula carniū iuniorum cum herba et radice Petroselinī, Turionibus Asparagi, semine Foeniculi. Vitanda sunt glutinosa. Potioni praestanda est aqua cum vino austero, sed maturo, Pontac. Corporis exercitatio, somnus aliaque ad morbi naturam componenda sunt. Si cum febre icterus est, non aliū vitus imperandus est, quam qui in hepatitide vel hectica idoneus est. Plura ab auctoribus extolluntur specifica, veluti radix Curcumae et radix Chelidonii ad scrup. j. vel drachmam dimidiam pro dosi: Succus lumbricorum terrestrium, qui viui cum vino generoso terantur, et alia plura. Si aliquis horum efficaciam experiri velit, hoc fiat praemissis generalioribus.



FLVXVS HEPATICVS.

§. 485.

Fluxus hepaticus dicitur, quando in visceribus abdominis, praecipue in hepate, nonnumquam in pancreate et mesenterio, vitium et labes est, ut tum sanguis, tum cetera viscerum humida corrupta atque putrescentia per aluum eferantur, Morbus hic rarior est, et nascitur plerumque
ex

ex aliis vitis, crebrius ex scirrho viscerum, quacumque ratione, potissimum efficaciori et minus apta medicatione concitato. Nec raro hypochondriaci, si eorum morbo vetustas et mala curatio accessit, huic vitio obnoxii fiunt. Ab initio sunt deiectiones crebriores, sine torminibus, aquae similes, cum aliquo tamen acrimoniae sensu. Mox id, quod per aluum descendit, biliosum est, et aquae, in qua recens caro lota esse videtur, simile. Haec res cum virium imbecillitate increbrescit. Aegrum, qui faciem habet luridam, subliuidam, et increcente morbo cadauerosam, febricula extorret, quae quandoque quiescit, mox iterum intenditur. Aluus tolerabilior est varia liquida, quae strigmentum, vel viride aliquid et biliosum, vel cruentum repraesentat. Longe peior est pinguis, nigra, et cui magna foetiditas oris accessit. Pessima, si cum his sanguis copiosior effertur, praesertim si febris multum augetur. Aegro crebra est deiiciendi cupiditas, ceteroquin magnum fastidium, perpetuus languor, nonnumquam etiam vomitus. Corpus ad summam maciem adducitur, vrina biliosa est, ex qua crassa desiliunt, qualis esse solet tabidorum. Si deiectiones vel per se defierunt, vel si aluus ciborum medicamentorumque contrahentium usu adstricta est, magna oritur anxietas, asthma, orthopnoea, sensuum internorum externorumque hebetudo.

§. 486.

Morbus hic distinguendus est a dysenteria. In hac sunt vehementissima tormina, quae increbesciente deiectione exasperantur, et in ea sanguis paucus, non coactus, nec foetidus, sed sincerus etiam cum strigmentis effertur. In fluxu hepatico, praeter dolorem in ano et frequentem deiiciendi cupiditatem, aeger haud quidquam sentit, nec torminibus cruciatur, sanguis vero, qui descendit, numquam sincerus est, sed, ut dictum, aquae similis, in qua recens caro lota fuit, dilutior, multa bile remixtus, sub finem putris et foetidus erit. De haemorrhoidibus internis alibi dictum, sanguinem in iis copiosum, sincerum, post alui deiectione-

iectionem, et quidem cum leuamine, euanescentibus post excretionem torminibus, erumpere.

§. 487.

Huius morbi causa est vel imbecillitas, vel exulceratio viscerum in abdomine, pancreatis, mesenterii, et praecipue hepatis. Nam in his visceribus vel vlcus est atque verum carcinoma, ex inflammatione, suppuratione scirrhoue relictum, vel vasa et omnis generis receptacula atque ductus excretorii ita relaxati sunt, vt per eos varius humor et ipse sanguis efferatur. Omnia itaque, quibus viscera illa infirmantur et corrumpuntur, hunc morbum parere possunt. Is tendit in hecticam, in senibus in marasimum, nonnumquam in hydropem.

§. 488.

In iunioribus raro tollitur, numquam in senibus. Si sine febre est, experiri licet roborantia, martialia, decoctum Millefolii, praeparata ex Cydonio, aliaque. In victu cibis sit modicus, ex pane bis cocto, carnibus assis. Potioni praestandum est decoctum radice Chinae ponderosae, Graminis, addita pauca Cassia lignea. Experiri licet corticem Peruvianum, qui tamen alienus est, vbi morbus iam inueterauit. Si enim febricula aegrum extorret, oportet quietem imperare, dare medicamenta vel nulla, vel lenissima: Lapides cancrorum cum acido Citri, Corallia rubra praeparata, addito pauco nitro, Liquorem terrae foliae Tartari. Euitanda est ira cum omni, tum corporis, tum animi commotione. Victus sit levis, ex Cremore Hordei addito succo Citri, vel Aceto, ex Cremore Auenae excorticatae, additis Passulis. Nocent iurulenta. Coqui tamen potest radix Cichorei et Apii ex iure pulli, et huic admisceri succus Citri. Nec aliena sunt fructus horaei in aëre siccati, Cerafa, Poma dulcia. Carnes pinguiore nocentissimae sunt, iuraque pinguiora. Potioni praestari potest decoctum panis domestici, vel hordei cum oxysaccharo, quibus omnibus morbus trahitur, vix vniquam curatur.

CHO.



CHOLERA MORBUS.

§. 489.

Vel ἀπὸ τῆς χολῆς et ῥέω, atque sic a bilis profluuiō, vel ἀπὸ τῶν χελαδῶν, ab intestinis, nomen habet. Est morbus, in quo omnia, quae in ventriculo et intestinis sunt, cum impetu supra infraque erumpunt. Crebrior itaque vomitus ac deiectio est cum magna intestinorum inflatione atque torminibus. Id, quod reicitur, varium est, plerumque tamen biliosum. Quibus morbus imminet, nō ab initio dolorem in ventriculo et intestinis, atque tormina, quae per intervalla incurfant, sentiunt cum anxietate, sequitur vomitus, deiectiones. Quae vomuntur et per aluum efferuntur, ab initio subcruda sunt, aquae similia, mox biliosa, tandem obscura et coerulea cum nigrore. Accedunt vehementissimi dolores circa ventriculum, tormina circa umbilicum et lumbos, cum anxietate, inflatione et tenesmo. Subito plerumque abdomen occupat hic morbus, qui nonnumquam intra viginti quatuor horas morte finitur, aliquando tertio, raro septimo. Si vero febris accedit, nam saepe et ab initio sine febre esse solet, mutatur in ardentem, biliosam seu causum. De febre ardente supra diximus. Si morbus ingrauescit, pulsus prorsus deficit, aeger animo linquitur, accedit sudor frigidus, et infra supraque corrupta et cadaver olentia erumpunt. Raro soluitur post crebriorem vomitum et deiectiones, sudore critico, atque urinae acerrimae, vias rodentis, profluuiō. Distingunt Choleram in siccam et humidam. In sicca ἀνα καὶ κάτω flatūs et ructūs efferuntur, et hic morbus conuenit cum *morbo ructuoso* HIPPOCRATIS, de quo vide Dissert. GOELICKII. Differt a dysenteria, in qua non facile vomitus est, et saepius cruor ex intestinis exulceratis manans cum strigmentis excernitur.

§. 490.

§. 490.

Sedes huius morbi princeps est duodenum, quod in cadaueribus post mortem incisis gangraena affectum, cum ductibus choledochi et pancreatico Wirfungii relaxatis, repertum fuit. Nam humida omnium viscerum, quorum itinera vasaque ad intestina pertinent, hic confluere videntur, et per aluum efferri. Nota est duodeni inflexio, in qua flatus ut et mali acresque humores aliquamdiu morantur, humoribus vero acrioribus intestina et partes vicinae afficiuntur, nervi concitantur, ut motus peristalticus ad nervorum distentionem usque adaugeatur, quo tum flatus, tum humida illa per moram corrupta expelluntur. Morbum hunc facere potest bilis cystica acrior et copiosior, spasmo ex quacumque causa excitato in duodenum pressa, praecipue ab ira post cibum. Eundem etiam afferunt cibi pinguiore acioresque, veluti carnes subrancidae suillae, lardum, caseus rancidus, vel recens acidus, fructus horaei austeri, nondum maturi, cucumeres, melones, boleti, omnis generis dulcia, mustum, cerevisiae recentes, frigida cum aviditate calente corpore hausta, imprimis potio dulcis Limonade, potio niuata. Praeter haec cruditas, a longo tempore in ventriculo et duodeno haerens, quae accedente alia causa concitatur. Plurimum confert refrigerium post crapulam, vel si homines noctu aerae frigidae se exponunt, et expirationem insensibilem reprimunt. Idem accidit post sumpta medicamenta drastica emetica et purgantia. Iuniores crebrius hoc morbo afficiuntur, ex quo senes magis periclitantur. Frequentior esse solet autumnis, Raro admodum fuit epidemicus.

§. 491.

Morbus hic peracutus est, quamvis sine febre sit. Semper periculosior, ubi haec accessit. Facilius curatur, si ortus fuit ab adsumtis, et si horum natura medenti cognita fuit, et is huic accommodare potest auxilia. Melior est cholera humida, et cui mox ab initio crebrior vomitus atque

que deiectio accedit, quam cholera sicca, quia cum magna anxietate et dolore sine excretionem esse solet. Bonum est, si cum aluo spiritus infra emittitur. Adijcitur periculo, si venter suppressus est, si vehementiores spasmi, irriti conatus vomendi, vagi horrores superueniunt. Mali morbi testimonia sunt, extremorum frigus, singultus, conuulsio, lipothymia, syncope, et si per os aluumque redditur putris, aeruginosa et cadauer olens sanies, quae intestina inflammata corruptaque esse significant. Rarissime accedit, ut morbus salutaris sit, utque eo hypochondriacum malum viscerumque infarctus tollantur. Vt plurimum vel tollitur morbus, vel morte finitur. Interdum tamen, praecipue si copiosiora data fuerunt absorbentia, adstringentia et opiata, is mutatur in hecticam et lienteriam. Qui ex hoc morbo conualuerunt, iis metus est, ne is data occasione reuertatur.

§. 492.

Si ei medendum est, disputari de necessitate, utilitate et noxa emeticorum solet. Hoc certum est, plurimum nocere emetica acriora ex Antimonio parata, nec satis tutum esse etiam Tartarum emeticum. Nee benigniora facile danda sunt, si morbus a grauiori animi perturbatione et ira coepit. Si vero ab adsumentis contractaque cruditate ortus fuit, per Ipecacuanham fomes morbi optime excutitur, cui admisceri potest Rhabarbarum. Vbi emetica locum non inueniunt, protinus dari potest Rhabarbarum, addito absorbente. Si vero bilis acrior et copiosior, ab animi commotione concitata, morbum facit, potari potest copiosior aqua tepida, addito Oxy-melle simplici vel oleo amygdalarum dulcium recenti, quibus etiam vomitus ciendus est. Simul vero in aluum immitti debent lotiones lubricantes, ex decocto Althaeae, addito oleo recenti, nullo vero stimulo. Etiam utilis est aqua calida cum oleo vel butyro non salito in aluum immissa. Diluentia optima sunt, in quorum usu diu perseverandum est, ut eorum aeger plurimum bibat, atque etiam iterum

iterum euomat. Eum in finem danda sunt iuscula valde tenuia pullorum aut carnis vitulinae, cum acetosa decocta, aut cum succo Citri mista, quod optimum est. Sunt ex recentioribus, qui panem auenaceum sine fermento pistum coctumque, leniter tostum, atque ex aqua coctum, vt decoctum fabarum. Coffee repraesentet, extollunt. Vide *Tentamina Edinburg. Vol. V. p. 646.* Nec alienum est decoctum hordei, et si acrimonia acida est, huic admisceri potest gelatina eboris atque Cornu Cerui. Pauperibus conducit serum lactis, nec calidum, nec frigidum, maiori in copia epotum, vel ipsa aqua, quam Celsus iam proposuit. Vbi bilis abundat, serum lactis acidulum conducit. Veteres frigidam laudauerunt, quae quandoque proficere potest, nonnumquam autem excitare inflammationes. Si magna et crebrior desidendi cupiditas vel tenesmus est, et per aluum non nisi exiguum emittitur, id testimonium est magnae acrimoniae, cui opitulari possumus, immixtis in aluum lotionibus, quibus adiaci potest Terebinthina cum oui vitello soluta.

§. 493.

Vbi his omnibus malum non conquieuit, et vbi his purgatae sunt primae viae, vomitus autem ac deiectiones non finiuntur, confugiendum est ad sopientia. Dari potest Diascordium Fracastorii, ea[m]ethodo, quam alibi proposui. Theriaca coelestis ad gr. j. pro dosi in pulueribus, vel Theriaca Andromachi. Quamprimum vero vomitus et deiectiones conquiescunt, ab his desistendum est.

§. 494.

In cholera sicca conducunt clysteres emollientes, addito Nitro. Extrinsecus ventriculo admoueri possunt illa nota Balsama et scuta stomachalia, vel, si bilis acrior abundat, fermentum panis cum aceto acerrimo. Si syncope accedit, dari potest paucum vinum cum pane fermentato, proficit etiam frigida adpersio. Veteres in hoc morbo haud

V

praeter

praeter rationem laudauerunt brachiorum et crurum frictiones. Vbi frequenti deiectione corpus omni humore exhaustum est, ad illud reficiendum humectandumque proficiunt balnea ex aqua fluuiatili frigida. Dari etiam possunt carminatiua et roborantia. Victu curiosiori opus est conualescentibus. Abstinendum est ab omnibus acribus et fermentescentibus.



DIARRHOEA.

§. 495.

Est alui profluuium vel frequentior secum liquidarum copiosiorumque deiectione, sine vomitu et sine vehementioribus torminibus. In intestina confluunt varii humores, veluti ex membrana pituitaria, faucibus, oesophago, ventriculo, duodeno, hepate, pancreate, glandulis **BRUNNERI**, **PEYERI**, arteriis mesaraicis, et praeter hos omnes, alii, qui per metastasin aliquando ex locis dissitis et vniuerso etiam corpore in intestina conuertuntur. Ob hoc vltimum diarrhoea oritur ex cohibita insensibili expiratione et sudore, vel si lymphæ per vniuersum corpus Mercurio liquata per aluum excernitur. Rarum admodum est, pus ex empyemate, vel alio in qua parte delitescente abscessu, per aluum educi. Coagulum inflammatorium saepe diarrhoea critica euacuatur, qua in febribus catarrhalibus etiam mucus et pituita expelluntur.

§. 496.

Diarrhoea differt a dysenteria, in qua et tormina sunt atrociora, et cruenta purulentaque descendunt. In Cholera magnus dolor esse solet cum vomitu et tenesmo, et cruda, maxime biliosa, supra infraque erumpunt. In coeliaca, in qua ventriculus quidem integer est, intestina vero vitio

vitio laborant, chymus non mutatus in imum deferitur. In hienteria, seu intestinorum laeuitate, haud concocta, sed cruda per aluum deuoluuntur.

§. 497.

Morbus hic proficiscitur ab intestinorum motu peristaltico, eoque per causas contrarias alienato. Nam ille motus concitior et quasi conuulsius fit a quacunque acrimonia, qua intestina afficiuntur. Eadem enim acrimonia, veluti hoc a purgantibus fieri consuevit, aliunde euocantur in intestina varii humores, non alia ratione, ac in oculis fieri solet, ex quibus, a quacunque re exagitatis, copiosiores lacrymae exprimuntur. Diarrhoeam diuturnam et nullis auxiliis obedientem, a vermibus profectam, anthelminticis curatam nouimus. Sed talis etiam ab atonia nascitur, quoniam intestina, vel vitali, vel naturali suo robore destituta, non recte faciunt adsumta subiguntque. Nec in resolutis intestinis fluida satis in oscula lacteorum propelluntur. Quare infirmis aluus semper fusior est. Diarrhoeas criticas a vi vitae vel natura fieri, ex alibi dictis notum est. Pessima est diarrhoea colliquatiua hecticorum, in qua summa resolutio sanguinis et omnium succorum raritas ac corruptio est, cum arteriarum etiam illarum, quarum extrema ad tunicam villosam et glandulas intestinorum pertinent, atonia.

§. 498.

Non omnis diarrhoea perniciofa est, sed saepe critica et salutaris. Haec nonnullis hominibus certo tempore, vere vel autumno, reuertitur, quae tolerari, seruato regimine, debet. De critica in febribus catarrhalibus, variolis confluentibus, febribus inflammatoriis, nec non alia, quae symptomatica in petechizantibus esse solet, alibi dictum fuit. Critica cognoscitur ex cognita morbi natura et historia, ex tempore morbi, concurrentibus aliis, praecipue coctionis signis, et si sequitur leuamen criticum, quam ne-

mo prudens cohibet; iuuare autem illam licet, quandoque immixtis in aluum clysteribus. Non sine periculo est diarrhoea, in qua multa biliosa corruptaque descendunt, et quae ideo propius a cholera abest. Nec bona est, cui nausea summaque imbecillitas cum vehementioribus torminibus accedunt. Pessimi morbi testimonium est alui profluuium, quod hæcticae et marasmo senili superuenit, et quod colliquatium vulgo appellatur. Nam hoc, ad vltima ventum esse, testatur. Interdum soluitur diarrhoea sudore et vrinæ profluuium. Diarrhoea diuturna mutatur in alios morbos. Ex ea nascitur inflammatio, si, eductis fluidioribus, crassiora in vasis relinquuntur, quibus illa, praesertim minora, tandem praecluduntur. Ex tali diuturno alui profluuium sub finem leucophlegmatia, oedema, hydrops, nascuntur. Nam humida nimis resoluta, et propter viscerum atoniam non recte confecta coactaque, propelluntur in vasa secundi generis, quae iisdem exanitis maioribus, praecluduntur. Quare hos homines tandem aqua inter cutim male habet, quibus pedes intumescunt, et reliquum corpus emaciatur, tandemque consumitur.

§. 499.

In curatione diarrhoeae considerandae sunt causae. Nulla vero diarrhoea facile et repente atque quadam vi adhibita, datis vel adstringentibus, vel sopientibus, cohiberi debet, ex quibus curationibus alii et saepe grauiores morbi nascuntur. Si diarrhoea orta fuit a refrigerio, vel potu frigido, mox ab initio locum habere possunt carminatiua, cyathus vini generosi, aromate conditi; vini adusti; Essentiae Absynthii, Corticum aurantium, Cascarillae et similia. Regimen simul obseruandum est, et plantis pedum, ipsique abdomini admouenda tegula calida. Ex aromatibus conuenit Cinnamomum, nux Myristica, Macis, Piper, Zingiber, Cardamomum. Haec omnia vero perniciosissima sunt, vbi deiectio biliosa cum febricula est. Nam in quavis acrimonia, intestina afficiente, praemittenda sunt abstergentia

gentia et euacuantia. Aduersus omnem fere acrimoniam proficit Rhabarbarum in puluere, addito, si febricula ad-est, paucis Nitro. Vbi acrimonia acida est, conducit, cum Salibus neutrius generis, Magnesia. Quandoque expedit, data Ipecacuanha, protinus et ab initio acrimoniam ex ventriculo excutere. Dari etiam possunt Pilulae Becheri, quae commode ad scrupulum j. vel drachmam dimidiam cum aqua Melissae sine vino soluantur et aegro exhibentur. Si vero acrimonia est ex viscere putri, qualis esse solet in fluxu hepatico, nihil mouendum, et nec alius ducenda, nec facile cohibenda est.

§. 500.

Vbi vero praemissa fuerunt abstergentia et euacuantia, vel vbi morbus ab atonia proficiscitur, danda sunt roborantia, vinum rubrum, Cinnamomum, omnia ex Cydonio parata, maxime Miua cydoniorum cum aromate. Conducit Cascarilla in puluere vel in Essentia. Dari potest Conserva visceralis cum cortice Cascarillae, et in atonia chronica cortex Peruvianus. Cum his proficiunt clysteres carminativi dicti. Ventriculo admoueri possunt epithemata ex pane tosto, cum spiritu ardente subacto, addita nuce myristica.

§. 501.

Si vero diarrhoea pertinacior est, et, accedente magna imbecillitate, ex toto corpore humida in intestina confluere videntur, confugiendum est ad sopientia. Et in hoc casu conducit Diascordium Fracastorii, vel Theriaca Andromachi. Id vero, quod supra de his sopientibus dictum, iis non diutius insistendum esse, et hic repetendum videtur. Victus semper causae accommodandus est. Multum proficit moderata exercitatio, nocentissima est Venus. Cibus sit ex pane bis cocto, semine Carui, Anisi, Foeniculi condito. Potioni praestandum est decoctum radices Chinae et Graminis cum vino Gallico Pontac, illo tamen meraciori. De deiectionibus biliosis occasione Cholerae dictum est. Si

diarrhoea oritur a vermibus, danda sunt ante omnia anthelmintica, de quibus suo loco. Nota huius rei est, si quandoque vel vermes, vel ascarides, vel pituita tenacior albicans, per diarrhoeam excernitur. De diarrhoea, quae a visceris exulceratione oritur, vide supra, ubi de Fluxu hepatico diximus. Leuamen afferunt clysteres ex lacte cum Terebinthina vitello oui soluta. In pertinacissima diarrhoea, a cruditatibus nata, saepe, omnibus frustra adhibitis, nisi alia sint, quae id prohibent, plurimum profuit emesis per Ipecacuanham.



LIENTERIA ET COELIACA.

§. 502.

Lienteria, seu intestinorum laenitas, dicitur, quando alimenta cruda haud mutata, sed qualia deuorata masticataque vel epota fuerunt, per aluum excernuntur. Huius morbi sedes est tum in ventriculo, tum in intestinis, quorum motus peristalticus vitiatum est. In coeliaca deiectiones chylosae sunt, cuius valetudinis sedes non tam in ventriculo, quam in intestinis et mesenterio est. Morbi infantibus et senibus frequentiores sunt, quam adultis. Oriuntur a causis variis sibi quae contrariis. Lienteria a ventriculo resoluta, praecipue si pylorus, omni robore destitutus, inconfectos cibos transmittit, a liquore gastrico deficiente vel inertī, id quod fit ex variis causis, si tunicae interiores ventriculi male adhaerent et scirrhosae factae sunt. Id frequens est vini adusti potatoribus, nec non qui aquam niuatam saepe multumque bibunt. Sed lienteria quoque nascitur a motu peristaltico concitatiori, quare lienteriae et coeliacae frequentius obnoxii sunt infantes, quibus dentes nascuntur, in quibus hi morbi non raro in nervorum distentionem atque epilepsiam tendunt. Alia causa coeliacae est in pueris rachiticis.

chiticis. Nam in his chyli itinera seu vasa lactea ab induratis mesenterii glandulis praeclusa sunt. Quandoque multa et viscida pituita, tum ventriculo, tum intestinis tenaciter inhaeret, quae motum peristalticum fieri et chylum in lactea vasa propelli prohibet. Pessima est Coeliaca ex graui dysenteria relicta, quae significat interiorem tunicam intestinorum erosam fuisse et iam occalluisse. Oritur coeliaca non raro a vermibus.

§. 503.

Causarum istarum quaedam notae sunt. Si morbus ab atonia est, tunc praecessit vel apoplexia, vel colica spasmodica et conuulsiva. Aeger multum dolorem sentit, fastidio laborat, et imminet tandem cachexia. Si vero ab irritatione motuque peristaltico concitatori morbus natus fuit, est aliquid in corpore, veluti denticientes gingivae, vel acrimonia ab adsumentis, vel alia etiam in alia qua parte delitescens, quae morbum parit. Tunc accedit dolor, tensus, et vitium facile degenerat in vehementiorem diarrhoeam vel dysenteriam. Si a pituita viscida est, esse solet cum magna inflatione abdominis, anxietate, et pituita crebrius per aluum reiecitur. In rhachiticis alia principis morbi signa sunt, et inter haec, abdomen durum, glandularum fere omnium, praecipue illarum, quae in mesenterio sunt, tumor, summa macies cum voracitate.

§. 504.

Morbi hi semper periculosi sunt, causarum tamen aestimatio necessaria est. Ex Lienteria et Coeliaca, si post alios graues morbos, apoplexiam, dysenteriam, diarrhoeam diuturnam, colicam conuulsivam, post usum drasticorum purgantium, vel etiam abusum lenientium, oriuntur, tendunt in tabem, atque in senibus in marasimum; et raro curantur. Res non ita periculosa est in infantibus. Si haec symptomata sunt a denticentibus gingivis, metuenda est nervorum distentio. Quae vero lienteria et coeliaca a mucro tenaciori

nascitur, vel a vermibus, tolli potest. Quo frequentiores in utroque morbo sunt deiectiones, quo magis increbrescit fastidium, imbecillitas, febricula et sitis, erumpentibus etiam in ore aphthiis, quo peior est faciei color, eo maius esse solet periculum.


§. 505.

Aduersus lienteriam, quae a pituita, ventriculo et intestinis inhaerente, nata fuit, quandoque promptum auxilium est in emesi. Haec vero in paucis, et non nisi in robustis, atque si morbus a pituita ortus fuit, si aeger multa nausea ac vomendi conatu vexatur, is vero ceteroquin vomitum bene tolerat, locum habere potest. Praemitti tamen debent per aliquot dies digestiua ex Salibus aliunde cognitis. Post emeticum nihil praestantius est, quam Rhabbarbarum, addito sale Thermarum Carolinarum, Tartaro tartarifato, vel alio quodam sale neutrius generis. Vbi tamen his magna vis pituitae resoluta per aluum deuoluta fuit, conducunt medicamenta resoluentia paullo acriora: Pulueres vel Trageae ex radice Ari, Pimpinellae, Acori, Costi dulcis, Zedoariae, Zingiberis, baccis Lauri, Iuniperi, cum Saccharo componi possunt. Nec condita aliena sunt, Calami aromatici, Zingiberis, Nucis myristicae, &c. Si malum pertinacius est, et nec illis auxiliis obedit, dari possunt infusa per epicrasin laxantia, ex vegetabilibus acrioribus, radice Ari, Pimpinellae albae, Bryoniae, herba Fumariae, Cortice Winterano, addita Mechoacanna, Rhabbarbaro, et foliis Sennae. Interdum Thermae Carolinae, vel aliae aquae minerales, necessariae sunt, et illae potari debent, datis simul Pilulis Becheri. Sub finem conueniunt, quibus intestina firmari oportet, Martialia, praecipue Croci Martis, qui pulueribus illis et compositioni Birkmanni admiscendi sunt. Nec aliena sunt, quae alibi laudauimus, ex Cydonio parata, Conferua visceralis cum Cortice Peruiano, &c. Etiam ventriculo extrinsecus admoueri possunt scuta et Balsama stomachica.

§. 506.

§. 506.

Cum his aliae quaedam observationes necessariae sunt. Plurimum conducit inedia, si hanc per vnum alterumque diem interdum tolerare potest aeger. Non negligenda est corporis exercitatio quotidiana, et pro modo virium paullulum vehementior. Aër siccus sit, purus, montanus, minime paludosus. Cibus ex pane bis cocto cum aromate, Nuce myristica, Cumino, Aniso, Caruo, Foeniculo. Conueniunt carnes assae, si haberi possunt, ferarum, pisces vel nulli, vel saxatiles. Nocet victus iurulentus, panis calidus, omnis cibus glutinosus. Potioni praestanda est aqua fontana, vel cereuisia valentior cum lupulo; vinum paucum, generosum, meracius. Plurimum nocet somnus et nimius et nimis paucus, Venus et quaecumque negotiosa atque cum cura et sollicitudine suscepta actio. Si morbus non tam a relaxatis, quam conuulsis intestinis et motu peristaltico aucto, veluti in pueris, dentientibus gingiuis, constitatus fuit, tollenda est causa, quae varia esse potest. Nec facile et non nisi urgente necessitate, praemissis aliis, quae e re sunt, ad opiata properandum est, inter quae eminet Diaseordium Fracastorii. Si Lienteria orta fuit a potu glaciali, corrigi potest aromate, condito Zingiberis, radice Ari, aliisque, quae carminatiua vocantur.



D Y S E N T E R I A.

§. 507.

Est frequens cruenta purulentaque alui deiectio, cum atrocioribus in abdomine torminibus, tenesmo, accedente frequentius febre. Quibus imminet, illi ab initio sentiunt nauseam, flatum, borborygmos, insolitum alui fluxum et frequentem desidendi cupiditatem. Quandoque, si morbus vel ab assumis, vel a contagio cum saluta degre-

V 5

tito

tito ortus fuit, praecedit vomitus, qui vero non ita frequens, ac in Cholera, esse solet. Mox increbrescentibus deiectionibus intenduntur tormina, quibus homo cruciatur, interpellato etiam somno. Nulla, vel exigua requies, vehementisque et continuus dolor in ano est. Inter haec tormina exiguum plerumque emittitur, et quo crebrior deiectio est, eo magis illa exasperantur. Quae per aluum descendunt, ab initio aquae similia sunt, mox biliosa, quibus strigmenta cruenta, a principio pauca, mox copiosiora, atque interdum sanguis purus admiscetur. Tandem si profundiori exulceratione exesa sunt intestina, profluunt mucosa, purulenta, atque quaedam carnosae, quae carunculae vocantur. Mucosa si descendunt, vulgus tunc morbum vocat *die weisse Ruhr*, qui etiam nouit, has deiectiones longe periculosiores esse, quam quae cum sanguineis strigmentis fiunt. Illa mucosa proueniunt ab intestinorum tenuiorum tunica villosa, si illa exulcerata atque crosa est; carnosae vero exulcerati plenioris intestini testimonia sunt. Inter haec aegrum sitis torret, qui, si hanc depulsurus bibit, praecipue frigidam vel quamuis potionem fermentescentem, tormina cum deiiciendi cupiditate intenduntur. Pestilens est omnis cereuisia; non raro autem aegri, nisi cum morbo febris et inflammatio sit, optime ferunt vinum modice sumtum. Differentia tamen est inter dysenteriam sine febre, quam benignam vocant, et aliam cum febre, quae praecipue, si epidemica et contagiosa, maligna dicitur. In hac vltima vitari oportet omne, maxime per latrinas, nec non fistulas, per quas lotiones in aluum immittuntur, contagium. Ceteroquin hic morbus numquam a sola natura depellitur, sed is vel maxime artis auxilia requirit. Nihilominus in HIPPOCRATE prostant exempla et Aphorismi, de dysenteria critica insanos lienososque curante. Vide *Aphorism. 5. Sect. VII. et Aphor. 48. Sect. VI.* qui etiam dysenteriam in morbis acutis interdum salutarem fuisse in *Libris de Morbis epidemicis* passim tradidit. Haec crisis apud nos rara esse videtur.

§. 508.

Aliud discrimen est inter intestina, quae laborant. Si exulceratio tenuiora occupat, dolores vehementesque cruciatus sentiuntur in medio abdomine circa umbilicum, accedit nausea, vomitus, non raro animi deliquium, et mucosa copiosiora excernuntur. In intestinorum pleniorum exulceratione dolor non ita acutus est, qui praecordia, colon et rectum infestat. Quando rectum afficitur, frequentior desidendi cupiditas est, et carnosae etiam excernuntur.

§. 509.

Causa huius morbi singularis esse videtur acrimonia, in ventriculum, duodenum, omniaque intestina contracta, quae ex varii generis humidis fermentescentibus, ex saliva vitata, fero et sudore represso, bile flava, acri succo pancreatico, pituita salsa, enata esse videtur. Illa acrimonia talis est, ut ea per moram caloremque intendatur, nocentior fiat, atque etiam serpat, donec tandem ab ea intestina roduntur exulceranturque. Haec enim causa esse videtur, cur illa contagione nocent. Nascitur ex variis occasionibus. Autumno ex cerevisia vappida et acescente, non recte per fermentationem defecata, musto, fructibus horaeis, austerris, nondum maturis, vel rore maligno infectis corruptisque. Eo corripiantur, qui corpus per diem multum exercent, vel si vino se ingurgitant, noctu autem se frigori sub somno exponunt. Plurimum conferunt tempestatum vicissitudines, aer paludosus, impurus et putri halitu foedus, qualis in castris saepe esse solet. Dysenteriam, quae nec epidemica est, nec contagiosa, aliquando faciunt drastica purgantia ex colocynthide, ex antimonio vel Mercurio, Esula, et similibus. Interdum oritur a vermibus et ab adsumtis venenis, raro a pustulis vlceribusque cutim exasperantibus, si haec fuere reprimantibus curata. In hoc morbo defunctis gangraena affecta reperiuntur intestina.

§. 510.

§. 510.

Plures etiam in hoc morbo sunt notae, quae vel spem, vel periculum ostendunt. Dysenteria epidemica, etiam ea, quae cum febre est, interdum solet esse benignior, interdum periculosior. Illa tamen, quae mox cum febre incipit, maligna dicitur, quae maiorem metum facit. Haec tamen longe peior illa est, quae ab initio sine vlla febre est; et cui haec post aliquot dies cum aliis malis signis superuenit, quum haec inflammationis ortae indicium sit. Quae cum febre est, maius habet contagium. Peior dysenteria est ab aëre paludoso, aquis impuris et contagio orta, quam quae ab adsumtis et inglutie fuit contracta. Pessimus morbus est ex nausea et timore ortus, praecipue in hominibus imbecillis et meticulosis; phthificis, hecticis, senibus ex morbo conualescentibus, saepe funestus est, ex quo etiam plethorici periclitantur. Quo vehementius vrgent symptomata, aestus, tormina, vomitus, tenesmus, sitis, animi deliquium, anxietas, debilitas, delirium, eo maius periculum imminet. Vomitus spontanei in morbo, qui a cruditatibus fuerunt orti, ab initio salutares sunt; sed in morbo epidemico et contagioso vomitus biliosi, qui etiam a primis initiis fiunt cum summa anxietate et repentina imbecillitate, magnum metum faciunt, maiorem, si cruenta vomitu reiciuntur. Si aucto consistenteque vel ad *ακμήν* perducto morbo, maxime, si is cum febre est, tormina subito conquiescunt, ita, vt aeger se melius habere videatur, is verò de summa imbecillitate conqueritur; si nigra magnum foetorem halantia sine voluntate per aluum denoluuntur; si superueniunt sudores frigidi; si arteriarum ictus debiles fiunt et inaequales; si intenti tendines sub digitis tangentis Medici mouentur, mors in propinquo est. Hanc etiam denunciant aphthae, faucium inflammatio, deglutitio sonora, singultus, petechiae erumpentes, et si membra inhorrescant. Alius bona, si stercoreus descendit, vel proluuius cum stercore remixta; pessima, pallida, pinguis, et si mucosa vel
carnosa

carnosa excernuntur. Crebrior deiiciendi cupiditas mali morbi testimonium est, et magnam humorum acrimoniam esse significat, qua morbus multum intenditur. Ruetus et flatus sine fecibus erumpentes, boni sunt. Interdum morbus in hydropem vertitur, id quod iis accidit, qui eo oppressi nimium aquae vel ptisanæ potauerunt.

§. 511.

Mature auxilia aduersus hunc morbum capienda sunt, et protinus expellenda est mala materia. Quamuis inflammatio intestinorum omnibus, qui in hunc morbum incidunt, immineat, nihilominus tamen raro sanguinem mittere oportet, id quod in plenioribus vel plethoricis interdum fieri potest. Sed educenda est illa mala materia per accommodata emetica et purgantia. Inter priora eminet Ipecacuanha, quae vel sola dari potest ad scrup. j. vel drachmam dimidiam, vel addito protinus Rhabarbaro. Hoc mox ab initio fieri oportet. Efficax est haec radix non solum iis, quibus morbus ab adsumtis ortus fuit, sed etiam in aliis, qui per contagionem eo sunt impliciti. Nam contagium in alia corpora penetrat per salivam, quae per noxios aegrotantium halitus infecta corruptaque in ventriculum deferatur, atque hunc mouet et nauseam facit. Confert hunc malum humorem protinus per emeticum expellere, et sic, quo minus ultra serpat, prohibere. Etiam secta cadavera demortuorum ostendunt, fellis receptaculum tumore et multa acerrimaeque bile plenum esse, quae vomitu ex eo excutitur, ut illa post vel supra, vel infra possit efferri. Vomitionem necessariam esse ostendunt nausea, et si acris materia supra erumpit. Emetica aliena sunt, ubi morbus iam adoleuit, praecipue si is cum febre et inflammatione est. In eo morbo, ubi protinus cum torminibus febris incurSAT, non nisi a primis initiis vomitus salutaris est. Qui puluerem Ipecacuanhae auersantur, quem optimum esse comperimus, iis dari potest infusum cum aqua, quod etiam diuisum, interpositis aliquot horis, potest offerri. Super-
bibat

bibat aeger multam calidam, adiecto oleo amygdalarum dulcium recenti, butyro sine sale, vel adipe quadam dulci. Cum his vero in aluum immitti debent lotiones emollientes, quae tanto magis necessariae sunt, si ex supra dictis notis intelligitur, intestina crassa potissimum adfecta esse. Praemisso emetico, mox dari debet Rhabarbarum, purum, tritum, optimum. Adijci possunt absorbentia. Quales pulueres tertia quartaque hora dari possunt. Plures etiam laudant Pilulas Beckeri, aqua Melissae vel etiam Vino Rheno solutas. Sed illae efficaciores visae sunt ad morbum auertendum, quam ad eum, si hominem iam tenet, depellendum. Potioni praestanda est ptisana ex hordeo, hordeo excorticato, radice Scorzonerae, addito Cornu cerui. His admisceri etiam potest gelatina Cornu cerui. Bene ferunt aegri vinum, etiam pauperes, non valde meracum, quod, ubi aestus vrget, alienum est. De omnibus vero, maxime de vino, illud tenendum, morbos epidemicos, quoad symptomata et ipsa etiam auxilia, multum inter se differre, ut id, quod olim profuit, alio tempore, et si similis morbus iterum incescit, noceat. Victus optimus est ex aena excorticata et hordeo excorticato.

§. 512.

Si his symptomata aliquantum leuantur, tormina non nihil quiescunt, et aegro non tam frequens delidendi cupiditas necessitasque est, oportet dari quaedam, quibus intestina firmanantur atque venter parum adstringitur. Inter haec Cortex Casearillae vel in puluere ad gr. x-xij. vel in Essentia reliquis praeferrri debet. Conducit etiam infusum aquosum ex semine Carui et Foeniculi. Si dolor in ano et tensus diu manet, quod intus mucus intestini abrasus fuit, leuamen adferunt lotiones ex lacte pingui, quod cum Oryza vel emollientibus coqui, et, addito oleo dulci, in aluum immitti potest. Si nihilominus dolor in ano et tensus perseverant, experiri licet Diascordium Fracastorii. Ad tormina lenienda proficit oleum amygdalarum dulcium, cuius

cuius aliquot cochlearia cum calida deglutiri possunt. Videndum tamen, ne illud eodem tempore cum Rhabbarbaro detur, cui id contrarium est. Nocent doloresque intendunt omnia dulcia ex saccharo vel melle parata. In victu oua recentia forbilia concedi possunt, si morbus a cruditate acida ortus fuit; nocent, si morbus epidemicus, contagiosus, et cum magna febre est. Aeger vitet nimium calorem et omne frigus; quem semper bene vestitum et stragulis operatum esse iuvat. Vtile est decoctum herbarum emollientium calidum, quod aegro, fellae familiaricae insidenti, supponatur.

§. 513.

Haud ita pridem repertum est nouum medicamentum aduersus dysenteriam, Cortex ex America adlatus, *Sima rouba* dictus. Est Cortex albicans, asperior, qui masticatus amaricantis saporis est. Si ex aqua coquitur, decoctum spumofum quasi lactescit. Huius et puluerem ad gr. xij. vel scrup. j. et decoctum valde laudant. Miris laudibus hunc corticem efferunt, omnes tamen consentiunt, praemittenda esse euacuantia, inprimis Rhabbarbarum, immo DEGNERVS decocto adiecit Tincturam Rhabbarbari. Aliud specificum extollunt, *radicem Salab.* De *Sima rouba* vide Obseru. IVSSIEV in *Commentar. Acad. Reg. Scient.* 1729. p. 42. et in *Quaestione medica* anno 1730. ab eodem Pariliis proposita. *Voyage du Cheualier de MARCHAIR en Guinée, par le Pere l'ABAT, Tom. II. p. 154.* et ex hoc *Commerc. litterar. Norimb.* 1731. 32. 33. inprimis, DEGNERI *Historium medicam de Dysenteria biliosa contagiosa* et ex recentissimis GEOFFROI Tr. de *Mater. medica Tom. II. p. 211.* De Radice Salab, quae Orchidis genus est, vid. SEBA in *The-sauro Tom. II. Tab. 83.*

§. 514.

In dysenteria, quae cum febre confert, caute agendum. A primis mox initiis Ipecacuanha et Rhabbarbarum dari

dari possunt, quae, ubi febris iam adoleuit, aliena sunt. Vbi tormina aliaque symptomata vehementer vrgent, vtilia sunt diluentia, et inprimis serum lactis copiosum, tum ore sumtum, tum in aluum immissum. Cum hoc proficiunt Emulsionem dilutiores ex semine Cardui Mariae, Papaveris, Amygdalis, additis terreis, Matre perlarum, Cryftallo montana. Haec dysenteria nec tonica patitur, nec opiata. Lenamen adferunt Clysteres cum Terebinthina. Aeger se contineat, cui paucus, non alius cibus detur, quam tenuis maxime et lenis, ex auena, hordeo et similibus. Si necessarium videtur intestina firmari, praebetur serum lactis, in quo ferrum candens iterum atque iterum fuit extinctum.



COLICA.

§. 515.

Est spasmus vehementior fibrarum carnosarum in intestinis, a quibus motus peristalticus proficiscitur. Quamuis nomen habet a colo, non tamen in hoc solo morbi sedes est, sed in tenuioribus etiam intestinis, cum quibus partes propinquae, Mesenterium atque Mesocolon, afficiuntur. Differt Colica a morbo iliaco, quod in hoc vera inflammatio est cum febre, vomitu, quo etiam stercus per os redditur, et dolore, qui eadem sede manet. In Colica vero dolor se per breue tempus remittit, mox repetit atque iterum intenditur, vagus est, mox hanc, mox aliam partem cruciat. Colica ingrauescens in Iliacum morbum vertitur. Differt a nephritide, quae cum Colica esse solet, quod in ea dolor lumbos prae ceteris premit, accedente testiculo, rum contractione molesta atque pedis stupore. Vrina in nephritide ab initio vel suppressa, vel aquae similis, leuato dolore, arenosa est. In colica vrina pauca, crassa, ex qua causa etiam desidunt. Nulla colica sine periculo, haecque

que maius est, si hominem acerbior dolor repente inuadit, eique accedit frequens vomitus, singultus, horror. Si acerbiores dolores se subito sine praeuia excretionem remittunt, grauitatis autem sensus in abdomine remanet, si cum his vires magis et magis decedunt, et extremae partes frigescent, mors instat.

§. 516.

Varia sunt Colicae genera. Distinguitur vulgo in nephriticam, biliosam, sanguineam, spasticam seu conuulsivam, et illam colicam Pictonum: de quibus seorsim. De nephritica olim retulimus. Biliosa conuenit cum Cholera, nec aliam curationem postulat. In flatulenta est magna inflatio ventris, in quo sonitus hinc inde deuoluti audiuntur; dolor acerbus circa vmbilicum mouetur, qui semper cum grauitatis sensu est, interdum intenditur, et sic cruciat hominem, vt grauiora symptomata metuenda sint. Infra nec aluus, nec spiritus transmittitur, et non raro fistula, per quam lotiones in aluum immittuntur, aegre ei inferitur. Magna anxietas est, cum pallore, nausea, vomitu, et ab omni cibo vel potu dolor intenditur. Soluitur, si aluus coacta duraque vel spiritum reddit, vel si cruda ante morbum assumpta euomuntur. Morbus hic in plerisque post frigora oritur cruditatesque, ab adiunctis videlicet alimentis duris, oleribus, leguminibus, carnibus subrancidis, suillis, veruecinis, praecipue si superbibitur frigida vel potio feculenta. Multum confert, si cibi non recte fuerunt masticati. Inter rariores causas sunt vermes in infantibus, aliquando aliena per errorem deglutita. Malum asperius fit, si intestina imbecilla resolutaque sunt. His enim prae ceteris accidit, vt ab intus haerente spiritu, qua parte inflata, altera parte concitatis spasmis constricta torqueantur. Nulla colica sine periculo est. Si enim haec inflammationi non superuenit, intestina, quae doloribus vexantur, facile inflammantur. In his vero inflammatis inclusus aer rarior fit, quo inflatio, et ex hac periculum augetur. Si colica, cui a
X flatibus

flatibus nomen est, diu manet atque ingrauescit, illa sub finem in conuulsuam degenerat. Tandem intestina prorsus resoluta aluum spiritumque non exprimunt, sed non sentiente id aegro transmittunt, quibus vero morbus haud leuatur, sed vitam finitam esse denunciatur. Hoc etiam in ileo morbo, et si in hoc inflammatum intestinum gangraena afficitur, fieri, supra retulimus.

§. 517.

Curationis initium faciendum est cum clystere emolliente. Ab initio decoctum emolliens, idque paucum, iterando tamen, in aluum dari oportet. Id maxime requiritur, si stercore duro atque copioso colon praeccluditur. Si his aluus non soluitur, emollitis durioribus, in eam infundenda sunt paullo acriora: Sal Gemmae aqua solutum, Petum, quod cum aliis emollientibus coquitur, Elixir Proprietatis, Electuarium de Hierapicra. Inter efficaciora est fumus Peti, qui etiam in aluum datus spasmos concitat vehementiores, quibus contenta eiiciuntur. Cum his ore summat aeger leniora aperientia. Multi vsus sunt Pilulae Becheri, si soluuntur vino Rhenano, vel aqua Melissae sine vino. Si vero lubricantia desiderantur, dari potest oleum amygdalarum dulcium cum Manna, vel Apozema ex Manna, Cremore Tartari, Passulis. Omnia acriora purgantia aliena sunt, quibus facile Colica conuulsua et inflammatio excitatur. Abdomini illinienda sunt olea cocta, Anethi, Chamomillae, Castorei, admixtis oleis destillatis carminativis. Vitandum est omne frigus, et multum proficiunt fomenta, ex decocto herbarum emollientium, quae in sella familiarica subiiciantur. Veteres, ut urgentes dolores discernerent, et ab intestinis auerterent, cucurbitulas abdomini et huius variis sedibus admouerunt. Iapanenses plantas pedum ferro candente, vel abdomen imposita Moxa adurunt et colicae dolorem leuant. Si aluus aperta fuit, plerumque omnis dolor conquiescit. Si vero nihilominus dolor manet et vrget, danda sunt alia, quibus aluus sine molestia ducitur:

tur: Pilulae Becheri, Cremor Tartari ex iusculo calido ad drachmam j. vel vnā cum dimidia, Rhabarbarum cum Tartaro tartarifato. Nec aliena sunt abstergentia, praecipue Liquor terrae foliatae Tartari cum spiritu Nitri dulci. Tandem vero confugiendum est ad carminatiua: Essentiam Absynthii, Gentianae rubrae, Corticum aurantium, addito Liquore anodyno. Raro opus est, vt aduersus dolorem dentur sopientia, de quibus alibi dixi. Superato morbo, vtilia sunt Tonica martialia. Imperanda est abstinencia, et potissimum omnis repletio omneque crudum, et illud, quod morbum fecit, vitandum est.

§. 518.

Si colica flatulenta cum intestinorum resolutione et atonia est, id quod scire possumus ex cognita aegri natura, maiori inflatione et pertinaciori alui obstructione, nimium emollientia nocere possunt. Alienum est oleum amygdalarum dulcium; meliores sunt Pilulae Stahlī, quibus superbibatur infusum atque decoctum seminis Carui, vel ex aqua, vel ex cereuisia. Nec alienum est infusum florum Chamomillae. Clysteribus vtendum est, quibus adiecta sunt carminatiua. Multum iuuat, si abdomen fascia constringitur, et quantum res permittit, ei fricatio adhibetur.

§. 519.

Colica sanguinea est, quae alioquin in viris *haemorrhoidalis* dicitur. Oritur plerumque in foeminis, quibus catamenia, et in viris, quibus haemorrhoides non proueniunt, si has excretiones molitur natura, vel si aliud quid est, quod vitalem sanguinis motum in abdomine turbat. Cognoscitur ex aegri natura, aetate, morbis praegressis, et si menstruorum et haemorrhoidum profluuium suppressum est. Spasmi sunt vehementissimi, quibus vero prae ceteris lumbi coxaeque cruciantur. Facies rubet, alius adstricta est, abdomen mox inflatum, mox magis contractum. Soluitur factō ex qua parte sanguinis profluuiō, si res bene cedit,

dit, prouenientibus haemorrhoidibus vel menstuis. Aliquando eam vomitus cruentus, in senibus mictus cruentus, consequitur.

§. 520.

In curatione huius Colicae omnia calida et carminatiua pestifera sunt. Aluus soluenda est lotionibus emollientibus, addito oleo, melle atque Nitro. Ore fumi debent aperientia ex Manna, Cremore Tartari, Tamarindis. Vbi aluus respondit, nihilominus dolores nonnumquam remanent. Igitur dari debent, nitrum cum Arcano duplicato, Liquor terrae foliatae Tartari cum Liquore anodyno. Si vero his omnibus dolores non leuantur, recurrendum est ad sanguinis missionem, ad quam non nimis festinandum est, praecipue, si Colica ex mensium et haemorrhoidum suppressione orta fuit. Si tamen dolorum spasmodorumque acerbitas hoc auxilium requirit, sanguis ex talo detrahendus. Leuato tandem morbo, et facta vel per artem, vel per naturam sanguinis excretionem, aeger sorbeat subinde infusum ex floribus Chamomillae, herba Adianthi albi, semine Carui, Corticibus aurantiorum. Malum ne reuertatur, auertitur corporis exercitatione, victu idoneo et aliis, quae communia sunt et saepe a nobis relata. Curiosior harum rerum obseruatio necessaria est eo tempore, quo haemorrhoides vel menstrua proueniunt.

§. 521.

Supereft colica spasmodica vel conuulsiva dicta, quae gradu a prioribus differt, et ab his, si vehementer spasmi et dolores intenduntur, nascitur. Sedem non in folis intestinis habet, sed etiam in musculis abdominis, potissimum rectis, qui spasmis maiori vi adducuntur. Abdomen tactu inaequale est, semper durum, umbilicus interdum prominet, longe frequentius contractus est; dolores intolerabiles sunt, et non sentiente aegro saepe vrina atque ipsum sperma exprimitur, tandem totum corpus conuellitur. In corporibus

bus defunctorum quandoque repertum fuit coli, omenti, immo pancreatis aliquam partem per diaphragmatis foramen vel hiatus, per quae nervus intercostalis descendit, in pectus vsque fuisse pressam. Vid. *Transact. Anglic. Compend. Tom. V. p. 266.* Et aliud exemplum, ubi per illud diaphragmatis foramen, per quod oesophagus descendit, portio ventriculi et duodeni irrepsit *c. l. p. 265.* Infantibus hoc Colicae genus frequens est, in quibus oritur a meconio non recte expurgato, a lacte coacto, a vermibus, potu nocturno acescente, pultibus spissioribus, nec non a dentitione, et dicitur nostratibus: *das innerliche böse Wesen.* In infantibus tantum metum haud facit, quam in adultis. In his quandoque nascitur a podagra, a scabie aliisque pustulis et viceribus repressis. Tendit in paralyin vel gangraenam. Hoc vltimum indicia aliunde cognita ostendunt. In aliqua spe est homo, si dolor non continuus est, sed se quandoque remittit, si is locum mutat, et si alius respondet.

§. 522.

Non alia curatio est huius morbi, quam priorum. Considerari debet causa et ex quonam colicae genere hic morbus coeperit. Nocent et quae a pluribus laudantur Opiata et vehementiora purgantia. Aluus soluenda est tum per lotiones, tum per alia medicamenta iam proposita. Massa Pilularum Becheri solui potest ad drachm. dimid. cum vino vel aqua Melissae, idque tertia quartaue hora repeti. Nec omittenda sunt fomenta et olea abdomini admouenda, quibus superdari debet tegula calida. Si aeger plethora laborat, optime proficit, si sanguinis plurimum atque etiam iterum detrahitur. Omne refrigerium et omne acre vitare debet. Si medicamenta ore sumpta vomitu reiiciuntur, id quod vix non semper accidit, illa debent iterari. Supra morbo firmanda sunt viscera.

§. 523.

Non admodum frequens est apud nos Colica Pictonum, quam in India orientali *Berberi* vocant. Dolor est fixus, cum sensu grauitatis circa vmbilicum, et in toto mesenterio fere continuus est, accedit frequens vomitus, cum pertinacissima alui et vrinae suppressione. Si quae per aluum excernuntur, sunt coacta valdeque dura. Aeger conqueritur de torpore et magna imbecillitate. Ille in dies magis emacrescit, vt tandem summa macie tenuatus vix musculos mouere possit, quorum tendines vaginis suis, omni tunica cellulosa defectis, adglutinantur. Morbo ingrauescente, resoluantur brachia, non vero aequae crura, id quod huic morbo proprium est. In cadaueribus, teste BONETO, intestina integra reperta fuerunt, et in iis nihil alieni. Morbus endemius est in locis paludosis, si in his homines otio dediti et ingluuiei se vino ingurgitant. Quare ex obseruatione *Caroli PISONIS de Morbis Ierosolis Sect. IV. Cap. II.* hic morbus obseruatus fuit in monasteriis sub eiusmodi coelo sitis, et quorum incolae vitam luxuriosam vixerunt. In nostris terris morbus quandoque obseruatur in metallicis hominibus, si plumbum tractant, nec non in figulis ollas lithargyrio incrustantibus. Vid. *G. W. WEDEL* in *Dissert. de Colica Saturnina*. Quandoque eo laborant homines, qui ex metallicis, minio, auripigmento, arsenico et similibus pigmenta faciunt. In Belgio iis frequens est, qui Cerussam ex plumbo conficiunt. Etiam is oriri potest ex vino lithargyrio mangonifato, de quo *Dissertationem* scripsit *ZELLERVS*. In India non solum aer paludosus, sed etiam vinum adustum seu Arak plurimum confert.

§. 524.

Sedes huius morbi princeps esse videtur in mesenterii nervis. Vix probabile est, neruorum minimas fistulas a tali materia praeccludi posse, sed id incidere videtur minoribus vasculis membranarum, quibus nerui comprehenduntur. Cur vero brachia et non aequae aliae partes resoluantur,

tur, non ita facile intelligitur. Hoc certum est, frigus nocturnum, Veneris abusum, plurimum conferre. Morbus valde periculosus est, et nisi protinus auxilia adhibeantur, curata etiam colica manet paralytis. Etiam in ea curanda nocet sanguinis missio, omnis vehemens purgatio, nec non Opium, quod pestiferum est. Feces aluinae, induratae protinus per lotiones et medicamenta leniora eccoprotica educi debent. Dari potest, postquam aluus aperta fuit, Sapo Venetus cum multo lacte, et tandem lac asininum cum aquis mineralibus per multum tempus potandum. Si anni tempus id permittit, herbae recentes: Fumaria, Cochlearia, Nasturtium, Chaerephyllum, contundi possunt, et ex fero lactis coqui. Pilulae ex Gummi ammoniaco, Sapone et ex compositione Becheri cum lacte dari possunt. Admodum vtilia sunt olea emollientia, additis destillatis carminativis, abdomini illita.



T E N E S M V S.

§. 525.

Est frequens desidendi cupiditas cum dolore in ano, qui increbrescit, ubi aliquid, quod plerumque exiguum est, excernitur. Plures huius rei causae sunt. Si materia acris per intestina descendit, veluti in dysenteria, cholera, stranguria, leuamen afferunt clysteres emollientes cum lacte et oleo. Si acrimonia tanta est, ut ea interiorum tunicam intestini erodat, vtilis sunt clysteres cum Terebinthina. Dolores ex haemorrhoidibus, praecipue si cum his etiam acrior materia intestina offendit, requirunt olea lenientia, Verbasci, Liliorum alborum, quibus sexta quartaque pars vnguenti de Linaria adiicitur, quae in aluum dari debent. Saepe pruritus excitant ascarides, de quibus protinus dicam. In gravidis tenesmus oritur, si foetus mole

X 4

sua

sua intestinum premit, et si intestinum rectum fecibus induratis vel acrioribus repletum est. Tenesmus in his quandoque sequitur abortus. Auerti potest iisdem auxiliis, lotionibus emollientibus, quas minus calidas esse oportet, et datis medicamentis eccoproticis. Si post euocatam malam materiam spasmi illi non conquiescant, dari potest Theriaca vel Diascordium. Interdum Tenesmus mortis indicium est.



VERMES.

§. 526.

Tria horum genera sunt in homine, lumbrici teretes, infantibus frequentiores; cucurbitini, ex quibus inter se cohaerentibus formantur sic dictae catenae et lumbrici lati. His addunt ascarides, quae sunt minores vermiculi, ex quibus adolescentibus priores oriuntur. Hae adultis frequentiores esse videntur, et vix non semper cum ceteris. A lumbrico lato distinguunt nonnulli taeniam seu fasciam. Haec vero nulla esse videtur, et si fascia a lumbrico lato differt, illa, notante VALLISNIERIO, nihil aliud est, quam coagulum tenax ex pituita et aliis intestinorum humoribus concretum, quod cucurbitinorum nidus fuit. De vermium originae disputant rerum naturalium curiosi. Videntur esse sui generis, et qui in homine, ut in aliis animalibus, alii, ex semine suo nascuntur.

§. 527.

Non raro difficile est scire, num in homine, praeter ceteris in puero, vermes sint. Infantes frequentius et quandoque subito sine causa plorant, repente ex somno excitantur, et sic expergefacti paudent et trepidant. Illis copiosior saliva ex ore effluit, aluus soluta est et magna eius inflatio, quae

quae tamen omnia etiam dentientibus gingivis fiunt. Paullo certiores notae sunt vrina cruda, crassa, pallida; venter durus ac tumidus, quod vltimum etiam rhachiticis incidit. Adultiores pallidi fiunt, conqueruntur de morficante dolore in abdomine, qui ieiuno ventriculo exacerbatur, post sumtum cibum se remittit, mox famem explere non possunt, mox omnia fastidiunt cum foetore oris, et irritò vomendi conatu. Narium etiam pruritus sentiunt, vt videtur propter consensum cum ventriculo. Novi aliquot aegros, quibus alius per multum tempus fusior fuit, quae, nisi datis anthelminticis, supprimi haud potuit. Certissimum signum est, si olim vermes excreti fuerunt. A vermibus grauissima mala interdum proueniunt, agrypnia, atrophia, tabes, omnia et horrenda conuulsionum genera, atque ipsa epilepsia et mania, quam HIPPOCRATES iam obseruauit post lumbricum excretum sedatam, *Epid. Lib. IV. No. 29.* Syncope, alui fluxus pertinacior, cardialgia. Nec haec symptomata, praesertim neruorum distentiones, si vetustas et consuetudo accessit, semper post exturbatos vermes cedunt, quae ceteroquin in hominibus adultis semper maiorem metum faciunt, quam in pueris. Etiam alii morbi a vermibus exasperantur, praecipue si infantibus dentes signuntur. In morbis acutis ex iis magnum periculum est, et si sponte, vel per aluum, vel per os efferuntur, mors plerumque in propinquo est.

§. 528.

Aluntur, vt videtur, vermes dulcibus, et nidulantur in viscido, quare semper cum iisdem magna vis pituitae esse solet, quae datis anthelminticis quandoque sola exturbatur. Frequentes sunt pueris, qui mellitis et saccharo abutantur. Necantur amaris et ex Mercurio paratis, suffocantur etiam oleo. Si vermes mortui in intestino relinquuntur, putrescentes magnos quandoque morbos mouere possunt. Tolerabiliores sunt lumbrici teretes, qui facile expelluntur; aegre obediunt lumbrici lati, vel illi sic dicti cucurbitini.

X 5

Prostant

Prostant obseruationes, vbi vermes, ex ventriculo per stomachum ascendentes, in faucibus suffocationis periculum attulerunt.

§. 529.

Medicamenta, quibus vermes tolluntur, dicuntur anthelmintica. Horum varia genera sunt. Nonnulli huc referunt lac, mel, saccharum, quae vero vermibus minime nocent, sed potius, dum illos nutriunt, aliquod leuamen adferunt. Oleum necare potest ascarides, si vel ore sumitur, vel in aluum immittitur, et in ea diutius continetur. Sunt alia anthelmintica amara, quae vel vermibus inimica sunt, vel motum intestinum augent, vt eo facilius vermes excuti possint, quo etiam referri debet *Limatura Martis*, et, quod recentiores Britannici scriptores extollunt, *Stannum in puluerem tritum*, *Cornu Cerui vsum*, *Ossa Sepiae*. Ex mercurialibus et ipsum decoctum *Mercurii crudi*, *Mercurius dulcis*, *Aethiops mineralis* cum saccharo remixtus, vel *Mercurius crudus* cum pauca *Terebinthina tritus* et cum saccharo remixtus. Inter medicamenta vulgo specifica dicta fere optimum est *Semen Santonici* seu *Cinae*, modo illud recens, non cariosum sit, cuius gr. X-XV infantibus, scrup. j. ad drachmam dimidiam adultis dari potest. Extollunt etiam *Muscum Corallinum*. *Asa foetida* et *Galbanum* etiam aliquam efficaciam habent. Anthelminticis adnumerant plura, quae longe frequentius fallunt. Ex his sunt *radix Angelicae*, *Aristolochiae*, *Carlinae*, *Allii*, *Cepae*, *Distamni albi* ac *Cretici*, *Galangae*, *Gentianae rubrae*, *Rhei*, *Squillae*, *Zedoariae*; herba *Abrotani*, *Absynthii*, *Agrimoniae*, *Centaurii minoris*, *Rutae*, *Scordii*, *Trifolii fibrini*, *Tanacetii*; semen *Aurantiorum*, *Sinapi*; *Aloë*, *Myrrha*, *Galbanum*, *Sagapenum*, *Opoponax*, *Asa foetida*, *cortex Peruvianus*. Ex animalibus *Cornu Cerui vsum*, ipsi *lumbri siccati* et in puluerem redacti. Nec minus *acidulae*, *thermae*, *Sal communis*, *aqua marina*, *Aurum fulminans*, *Camphora*, *Amygdalae amarae* et alia huc referri solent.

§. 530.

§. 530.

Si anthelmintica dare animus est, videndum est, ne homo eo tempore febre vel alio morbo laboret. Imperanda est per aliquot dies abstinencia, et non nisi cibus minus valentis materiae et cuilibet aetati accommodatus, isque paucus dari debet. Expurgandae sunt ante omnia primae viae alio conueniente cathartico, in infantibus Rhabbarbō. Si Mercurium dare volumus, necesse est, vt aeger per aliquot dies ab omni acido et falso abstineat, et vt nec vinum, nec cereuisiam bibat. Post danda sunt anthelmintica semper ieiuno ventriculo. Aeger etiam post ea adsumta per aliquot horas abstinere debet ab omni cibo potuque. Cum infantibus caute agendum est. Praestat anthelminticum diuidere, et vnā partem vespertinis, alterā altero die, horis matutinis dare. Fere efficacissimum est, si datur Mercurius dulcis rite paratus cum triplo sacchari tritus. Fere magis tutus est Aethiops, non vero ita efficax. Semen Santonici tritum cum melle vel cum Conserua et Syrupō florum Persicorum in bolum formari potest in adultis. Post adsumtum Mercurium superbibatur aqua, quā etiam eluendum est os faucesque. Protinus et si altera dosi horis matutinis data fuit, vesperti dari debet medicamentum catharticum, quod vero, si Mercurius datus fuit, nullam sedem habere debet. Fere optimum est Massa pilularum Becheri vel puluis ex radice Ialappae cum Diagrydio sulphurato. Prostant etiam medicamenta, quae, extrinsecus abdomini illita, vermes extirpare dicuntur: Fel Tauri, Vnguentum Agrippae, quae vero non ita tuta sunt. Etiam clysteres componuntur, qui, si ascarides in intestino recto haerent, optime proficiunt. Non imitari debemus circulatores, qui ad expellendos viuos lumbricos aliis siccatis vtuntur.



* * * * *

DE

VRINAE EXCERNENDAE DIFFICULTATIBVS.

STRANGVRIA, DYSVRIA, ISCHVRIA.

§. 531.

Gradu fere differunt hi morbi. In Stranguria vrina cum magno dolore et cruciatu et quasi guttatim excernitur. Homo, inter mingendum, in vrinae itinere sentit aliquem refrigerii sensum, quem mox ardor insolitus insequitur. Valentius stringitur sphincter vesicae, et vrinae crebra cupiditas, sed magna difficultas est, ac perpetuus tenesmus sphincteris. Huius vitii plures causae sunt; vrina crassior salibus turgida, vel ab adsumtis et acidis acrimoniam habens. Frequentius igitur Stranguria oritur a reuulsa non defecata, vel iam acescente et vappida, ab adsumtis fructibus austeris, ab adsumtis frigidis, a refrigerio abdominis et pedum, quo spasmi excitantur, ab haemorrhoidibus, ab ulcere vesicae, et ulcere ac fistula ani. In senibus, quibus hoc malum frequens est, id saepe a contrariis causis nascitur. His enim nimium relaxati sunt muscoli acceleratores, quibus non omnis vrina ex vrethra exprimitur, quare pauciores guttae, quae in illa relinquuntur, acrimoniam contrahunt, partes rodunt et spasmus excitant. Tales sibi leuamen afferre possunt, si, ubi vrinam excreuerunt, perinaeum et bulbum vrethrae fortiter digitis comprimunt, et illud, quod vrinae reliquum fuit, sic exprimunt.

§. 532.

§. 532.

Morbus hic, si curatus fuit, facile reuertitur, praecipue, si a refrigerio ortus fuit. Ex vrina, si illa diutius vrethrae inhaerescit, quandoque minores calculi nascuntur, vel calculi, ex vesica eo deuoluti illisque partibus inhaerentes, increscunt, ita, vt malum in dies adaugeatur, tandemque vera Ischuria oriatur. Curatio caussis accommodanda est. Etiam in hoc morbo ante omnia alius soluenda est, vel lenioribus eccoproticis, vel lenioribus mollientibus, nullo adiecto stimulo. Si vitium ortum fuit a sordibus et acrimonia primarum viarum, remedia illi acrimoniae accommodata, Magnesia, Rhabarbarum, decoctum Rhabarbari cum Tamarindis et Passulis, proficiunt. Distinguendum tamen est acrimoniae varium genus.

§. 533.

Si Stranguria orta fuit a refrigerio, alius ante omnia soluenda est vel clysteribus, vel Rhabarbaro, optime Pilulis Becheri, aqua Corticum aurantium solutis. Cum his etiam conducunt lotiones lenientes in aluum dandae. Post aluum solutam danda sunt carminatiua, Essentia Absynthii, Gentianae, Corticum aurantium, Elixir viscerale Hoffmanni, Liquor anodynus, Essentia Castorei. Commode talia vel cum vino meraco, vel cum sorbitione ex floribus Chamomillae, radice Foeniculi, Althaeae, Scorzonerae, semine Foeniculi et Anisi, Cortice ligni Sassafras dantur. Pluribus proficit vinum feruidum cum aromate. Extrinsecus abdomini et perinaeo admoueri possunt cataplasmata ex emollientibus et carminatiuis, adiectis cepis vstulatis, vel panis mellitus vino subactus calidus. Illiniri abdomini potest oleum Anethi, additis aliquot guttulis olei cuiusdam destillati carminatiui. Superimponi debet tegula calida. Si morbus his non cedit, aeger demittendus est in balneum calidum cum lacte vel decocto emollientium. Si in vrina sales abundant, danda sunt diluentia: decoctum Furfuris, Aue-

Auenae excorticatae, Hordei excorticati, aqua Selterana cum lacte, serum lactis, decoctum antinephriticum Foresti, Emulsio dilutior, quae omnia copiosiora sumenda sunt. Si Stranguria oritur a calculo, vel vesicae, vel vrethrae inhaerente, is eximendus est. Leuamen affert, praeter iam dicta, oleum Amygdalarum dulcium. Si a gonorrhoea proficiscitur, huic medendum est; si vero post curatam vel potius cohibitam gonorrhoeam vitium manet, illa reuocari debet, id quod data emulsione fieri potest, de qua suo loco dicendum. De Senum curatione iam dixi. Semper videntum est, ut alius sit aperta, et primae viae a fordibus repurgatae.

§. 534.

Dysuria est vrinae difficultas, si vrina cum multo labore atque cruciatu, maxime cum aliquo ardoris sensu exprimitur, in qua tamen spasmus vel tenesmus non ita vehemens est ac in Stranguria. Causa huius vitii plerumque est in ipsis vrinae itineribus. Accusari vulgo solet sic dicta caruncula, quae intus se vrinae et quoque fistulae seu catheteri, si haec immittitur, opponit. Opinio enim fuit, in vrethra ex malis vlceribus, praecipue a gonorrhoea relictis, nasci ex putri carne tubercula seu carunculas. Quare etiam huc vsque plures variis adhibitis machinis adnisi sunt, ut has carunculas exedentibus rodentibusque tollerent. Sectio vero cadauerum docuit, has carunculas vel nullas esse, vel oppido raras; vrinae autem iter praeccludi vel a cicatrice post gonorrhoeam relictâ, vel ab intumesciente illa vrethrae parte, quae caput gallinaginis dicitur, iuxta quod tum glandulae prostaticae, tum vesicularum feminalium itinera exitum habent. Interdum et aliarum glandularum, a COWPERO descriptarum, ductus excretorii intumescunt, et vrinae iter intercludunt. In senibus, praecipue mictu cruento laborantibus, id accidere potest, si vrethrae interior tunica relaxata collabatur, vel si venae varicosae intumescunt, atque vrinae iter claudunt. Nonnumquam ta-

men

men dysuria per consensum fit ex abscessu aliove tumore in perinaeo vel circa anum orto, nec non ex omnibus, quibus intestinum rectum irritatur, ab haemorrhoidibus coecis, vlcere et fistula ani, materia acri per intestina descendente, ab ascaridibus. Si vlcus in vesica est, difficulter vrina redditur.

§. 535.

Malum hoc saepe pertinax est, et raro in senibus tollitur. Maior metus est, si id ab vlcere vesicae et huius ceruicis natum fuit. Id terminatur quandoque in hydropem. Curatio caussis accommodanda est. Si vesica vlcere laborat, danda sunt lenientia: decoctum Althaeae, Scorzonerae, Glycyrrhizae, Eryngii. Si in vesicae ceruice, vel etiam in vrinae itinere mala vlcera ac fistulae haerent, quae alia ratione tolli nequeunt, recentiores laudant sectionem perinaei, quae vero non sine periculo est. Vid. *color de la Taille*. Si vitium ortum fuit a cicatrice, vel a colapso atque coarctato vrinae itinere, ductibus etiam glandularum excretoriis materia turgidis, nec non a venis varicosis, vix in vlla re maius auxilium esse solet, quam in illis cereis minoribus, ex carbaso incerato certa ratione confectis, qui bacilli in vrinae iter demitti et per plures dies contineri debent, quibus itinera pedetentim ampliantur. Hi bacilli ab aliis ex emplastris compositis, adiecto etiam Mercurio, struuntur, et variis etiam vnguentis, anteq. in demittantur, illiniuntur. In vlceribus his curandis non fidentum est Balsamis, quae vulgo laudantur, sed saepe fallunt, et maiores inflammationes concitant. Senibus proficiunt epithemata roborantia, ex herba Maioranae, Melissae, Betonicae, Rosmarini, Serpilli, quae perinaeo admoueri possunt. Reliquae curationes per se patent.

§. 536.

Ischuria tandem dicitur, quando nulla prorsus vrina excernitur. Huius rei causa vel in renibus est, vel in vesica.

336 STRANGVRIA, DYSVRIA, ISCHVRIA.

sica. Renes adfectos esse, significat dolor lumborum, stupor femoris et crurum, testis retractio, vomitus biliosus. Si vero vitium est in vesica, aeger conqueritur de pondere et dolore in hypogastrio, frequens est mingendi cupiditas, nihil tamen excernitur. Super pectinis ossa tumor digito occurrit, si hic in anum demittitur. Causae praegressae notitia diagnosin clariorem reddit.

§. 537.

Morbus periculosus, et de renibus, observatione HOLLERII aliorumque, compertum est, affecto vno rene secretionem quoque in altero cohiberi. Desinit saepe in vesicae inflammationem. Tandem si aegro occurri non potest, is delirio, morbo soporoso, et sub finem nervorum distentione exstinguitur.

§. 538.

In renibus nascitur ex plethora, si sanguis abundat crassiorque est, ut serum non commode secerni possit. His medemur sanguinis missione, fricatione artuum, corporis exercitatione, dato potu diluente, ipsis etiam acidulis. Rarius hoc fit a lentore sanguinis seu superabundante viscido. In quo casu, purgatis prius primis viis, danda sunt resolutiva: Gummi ammoniacum cum Oxymelle squillitico, aquae diureticae, succus Millepedatum viuarum cum vino contrarium ad num. xv. - xx. Aquae diureticae, Petroselini, Fragorum, praecipue vero aquae minerales. Si renes spasmis afficiuntur, ex variis causis utrumque accidere solet, ut quandoque parcior vel nulla, quandoque copiosior urina secernatur, quod vitium deprehenditur in hystericis. His spasmis medetur Nitrum, decoctum emolliens, compositio FORESTI, Emulso cum semine Papaveris et paucio nitro. Ischuria etiam oritur a paralyti vesicae, si, fractis lumborum vertebra, spinalis medulla laesa, et vesica se contrahere nequit, quae res nullum auxilium habet. Ex hoc plerumque contrarium vitium nascitur, et sub finem urina sine voluntate

tate destillat. Si Ischuria orta fuit a sanguinis coagulo in vesicam contracto, is concretus quandoque spasmis per vrethram exprimitur, et dicitur Mictus vermiformis. Quandoque purulenta ex renibus destillant et in vesicam contrahuntur, quae omnia remoueri debent cathetere immisso. Ischuria oritur a valde distenta et dilatata vesica, si vrina diu retenta fuit, immo inde quandoque, quamuis rarius, oritur hernia vesicae, de qua in Chirurgia dictum fuit. Huic incommodo mederi possumus leni compressione et fricatione tumoris, si nempe is super pectinis ossa atque inguine conspicitur, vel tactu sentitur. Magis tamen securum est auxilium per catheterem. Si id, quod in senibus et post frequentiore partum in foeminis quandoque fieri solet, vitium oritur a relaxatis et infirmatis musculis abdominis, proficit compressio per fasciam, fricatio, et admoueri possunt extrinsecus cucurbitulae, atque imponi epithemata roborantia. De caruncula supra dictum fuit. Si penis non perforatus est, in infantibus quandoque is aperiri potest. Semper vbi res vrget, properandum est ad auxilium per catheterem, et si catheter demitti non potest, adhibenda est paracentesis vesicae, de qua videnda est Chirurgia.



DIABETES.

§. 539.

Est humorum crudorum, non satis subaëtorum, transitus per renes, cum imbecillitate, siti, siccitate totius cutis atque faucium, lumborum et capitis dolore, superueniente tandem marcere, hectica et oedemate. Aegri super potionum modum mingunt, vrina autem cruda est, cum qua sub finem vel chylosa, vel alia non mutata assumpta effertur. Nam hoc discrimen est, vt ab initio illa aquosa sit, post fiat dulcis et chylosa, tandem vero, increbrescente

Y

malo,

malo, cereuisia aliaque potulenta parum vel nihil mutata exeunt. Morbus Veteribus cognitus, sed rarus fuit; iam fere paullo frequentior, vt videtur, ex nimio calidae potu.

§. 540.

Vrinae nimiae profusio non semper Diabetem significat, sed ex variis aliis causis incidere potest, veluti si humor per alias vias excerni solitus, prae ceteris sudor, insensibilis exspiratio, frigore aliisque occasionibus repressi ad renes feruntur. Idem accidit foeminis post partum, dum uterus se contrahit. Etiam nonnumquam in morbis spasticis humores tenues, aquosi, relictis crassioribus, ad renes feruntur. Quare hypochondriaci, et praecipue hystericae, sub exacerbatione magnam vim vrinae tenuis et aquosae reddunt. Aliquando profluuium criticum est, si quiescentes corruptique humores in hydropis variis generibus, praecipue Anasarca, per has vias eiiciuntur. In febribus acutis et inflammatoriis illud coagulum phlogisticum sponte sua, sumtis medicamentis diluentibus et saponaceis auctoque calore, resolutum, vi vitae plerumque per sudorem, nonnumquam per criticum vrinae profluuium excernitur. Etiam vrina copiosior mingitur ab assumtis non solum aquosis diluentibus, sed etiam diureticis, veluti Asparago, Terebinthina aliisque. Hoc tamen tenendum est, in hominibus infirmis copiosiore vrinae tenuis et aquosae excretionem, si nulla alia eius causa est, saepe significare magnam infirmitatem viscerum, visciditatem humorum et futuram cachexiam.

§. 541.

Vbi vero Diabetes imminet, ab initio in vrina saepius albicantia et farinosa conspiciuntur, quae humores et assumpta non recte subacta esse significant. Accedit lumborum dolor, siccitas oris et totius corporis. Quae omnia pedetentim increseunt, vt tandem macies et hecticæ sequantur.

§. 542.

§. 542.

Causa huius morbi est vel atonia viscerum et cruditates primarum viarum, vel, ubi morbus adolevit, summa atonia tubulorum BELLINI, qui relaxati humorem non fecernunt, sed crudum transmittunt. Occasionem dare possunt varia, quibus chylicatio laeditur; otium et torpor, assumpta viscida; glutinosa, potus nimius, praecipue diluens, tenuis, fermentescens, abusus medicamentorum, immo Thermarum et Acidularum. Vino adusto diu multoque potu, tandem fibrae rigidae fiunt, atque ad motum idoneum praestandum ineptae, quare et hinc Diabetes et Cachexia non raro sequitur. Morbus periculosus est, qui hectica finitur. Opitulandum est mox ab initio, et antequam tubuli BELLINI laxiores fiunt. Si in visceribus labes est et febris accedit, homo in praecipiti esse solet.

§. 543.

In Curatione, si primae viae laborant, illis succurrendum est; si viscidum occupat ventriculum et duodenum, id quod ex signis suis intelligitur, ab initio, si id per vires aliaque licet, non alienum est emeticum. Cum hoc, vel huius loco, iteratis vicibus dari debet Rhabarbarum, vel in pulvere, vel in infuso vinoso, cui ultimo adijci possunt resolventia minus acria, radix Polypodii, Glycyrrhizae, Cichorei, Scorzonerae, Vincetoxici, herba Agrimoniae, Melissa, quale infusum parari potest ex aquae et vini non admodum meraci aequis portionibus. Vistus his accomodandus est. Euitetur omne iurulentum, omnis potio ex frumento, omnisque sorbitio calidae. Aeger bibat aquam fontanam, et hanc, quantum fieri potest, paucam, cum vino gallico Pontac, vel potioni praestari potest decoctum meracius radice Chinae, Graminis, cum Cassia lignea. Si nondum febricula aegrum tenet, magnae efficaciae sunt balnea frigida, saepius iteranda, adhibita post haec diuturna et multa totius corporis fricatione. Quamvis balnea,

frigida roborando proficere possint, alienum tamen est omne, praesertim repente admissum, refrigerium, prae ceteris pedum. Cibus sit ex alimentis siccis, pane bis cocto, carnibus assis, ex Cydonio aliisque roborantibus. Maximum praesidium est in abstinentia et multa diuturnaque corporis exercitatione in aëre libero. Aeger, quantum potest, parum bibat, corpus vero per plures menses valde exerceat. Legitur exemplum apud CORNELIUM *van TRINEN*, ubi homo abstinentia seueriori, assumpto videlicet intra viginti quatuor horas vno halece, et epotis duabus libris vini Rhenani, sicque siti ferina tolerata, sibi mederi potuit. Britannici etiam in hoc morbo extollunt corticem Peruvianum. Praemissis abstergentibus, maxime Rhabarbaro et infusis per epicrasin purgantibus, vtile deprehendimus illud corticis Peruviani infusum cum Limatura martis. Alia ab aliis extolluntur, veluti infusa Malicorii, corticum Aurantiorum, seminis Foeniculi, herbae Millefolii, &c. Non prorsus alienum est, si sacculi, ex herbis roborantibus compositi, ex vino rubro adstringente, vel aceto expressi, frigidi lumbis imponuntur. Vbi morbus adoleuit, omnia frustra fiunt.



VRINAE INCONTINENTIA.

§. 544.

Nonnumquam homines, frequentius pueri atque puellae, ut et senes, vesicae imperare nequeunt et vrinam continere. In infantibus hoc plerumque dependet a mala consuetudine, quae non medicamentis, sed per alia auxilia adimenda est. Etiam incidere potest a corrupta phantasia sub somno, ubi videndum est, ut somnus non turbatus, sed placidus sit. Infantes, quibus hoc incidit, a potu aquoso nimio prohibendi sunt. Interdum vrina acrimoniam habet,

qua

qua interiores vesicae tunicae afficiuntur et ad contractionem excitantur. Huic medentur potus diluens, ipsa aqua copiosior, emulsiones, decoctum emollientium, oleum amygdalarum dulcium, tum ore sumtum, tum mediante siphone per catheterem in vesicam datum, id quod etiam leuamen adfert calculosis. Si vitium est a gonorrhoea maligna, huic medendum; leuamen afferunt emulsiones. Si vero, id quod senibus nec non apoplecticis frequens est, sphincter resolutus fuit, vitium difficulter tollitur. In hoc casu, si malum recens est, extrinsecus adhiberi possunt balnea ex roborantibus, et perinaeo admoueri possunt epithemata, vel in balneo sacculi ex herba Betonicae, Rorismarini, Menthae, Serpilli, Marrubii. Profunt quandoque Thermae. Admoueri etiam possunt spirituosae, vel, qui fere meliores sunt, suffitus ex Mastiche, Benzoë, Succino, Olibano, Storace, quorum fumus linteis excipitur, quibus perinaeum fricatur. Noctu superdari possunt emplastra de Tacamahaca et Oxyroceum, vel neruinum, quae oleis destillatis conspergantur. Si haec omnia nihil proficiunt, in viris adhibenda est machina, qua meatus vrinarius comprimitur. In foeminis vero, quibus hoc non solum ex paralyti incidit, sed etiam post calculi euulsionem, vel post partum difficilem, dilacerato vrinae itinere, leuamen afferunt globuli lignei cera obducti in vaginam immittendi, quibus meatus vrinarius comprimitur, de quibus vide *HILSCHERI Dissertationem*. Nonnumquam hoc, ut vrina praeter voluntatem exprimatur, epilepticis accidit, in quibus nulla curatio, nisi superato morbo, sperari potest. In grauidis, praecipue primiparis, hoc frequens est, id quod non alia ratione, quam partu curatur. Specifica, quae vulgo laudantur, cineres bufonis, erinaceus vstus, vulua suilla, &c. spem omnem eludunt. Si fistula in perinaeo est, quae interdum vel a calculi sectione, vel a malo ulcere ibi nato relinquitur, videndum est, num illa manu Chirurgi curari possit, de qua re legatur *COLOT*. Si vero curatio haec locum non habet, admouenda est fascia cum pila, qua illud foramen comprimitur.



FLVOR ALBVS BENIGNVS.

§. 545.

Est excretio humoris ferofi corruptique ex genitalibus mulierum. Foeminis, quae hoc morbo laborant, plerumque catamenia proueniunt vel nulla, vel vitata. Corpus debile habent; si morbus inualefcit, fudor foetorem fpirat et facies pallida fit, vrina turbida eft, accedit, praecipue tempore menftruorum, languor, naufea, lumborum dolor, anxietas. Humor, qui ex genitalibus fluit, interdum albidus eft; quandoque flauescens, nonnumquam glutinofus, nonnumquam acris et rodens. Morbus frequens eft foeminis, praecipue post frequentem partum, rarus virginibus. Quandoque tamen his euenire folet, fi catamenia non proueniunt, fi illae munditiem negligunt, vel fi tempore catameniorum omnis generis alimento fe implent, vel fi lafciuiores et tribades funt. In grauidis, huic vitio ceteroquin haud obnoxii, interdum humor eo tempore, quo catamenia finire folita erant, erumpit. Morbus etiam haereditarius eft. Relinquitur ex partu, fi vterus non fatis fuit repurgatus et in eo relictae funt fecundinarum frufta. Multum confert frigus extremorum, nec non fumus carbonum genitalibus admiffus. Plurimum tamen etiam ad hunc morbum facit totius corporis imbecillitas, et fi foeminae natura infirmae funt, rhachiticae, aliis morbis obnoxiae, fi frequenti vel magna vteri haemorrhagia laborauerunt. Aliquid confert aer humidus, paludofus, cibus crudus ex pifcibus, fructibus horaeis aliisque vegetabilibus, abufus medicamentorum purgantium, nec non vita mollis, otium nimium, defideria venerea. Inter cauffas etiam funt thoraces feu vefimenta ex balanaria virga confuta, quibus abdomen comprimitur, et quo minus fanguis per venas remeare poffit, prohibetur. Pefsimum genus eft, quod a malo vlcere in vtero, vel carcinomate nafcitur.

§. 546.

§. 546.

Sedes huius morbi esse videtur tum ipse vterus, tum eius vagina. Primum ex eo cognoscitur, quod fluor albus quandoque loco menstruorum prouenire solet, et quod is saepe in iis deprehenditur, quibus aliena quaedam in vtero fuerunt relicta. Menstruorum enim fontes tum in vtero, tum in vagina esse, alibi ostendimus. Fluorem album vero etiam ex vagina prouenire, docent grauidae, quae ei non raro obnoxiae fiunt. Igitur si in vtraque parte vasa excretoria, vel sic dictae lacinae vel glandulae excretoriae, fuerunt relaxatae vel aliter affectae, hoc profluuium nascitur.

§. 547.

Distingui debet ab aliis morbis, praecipue a fluore albo maligno seu venereo, id quod quandoque difficile est, quod foeminae plerumque tergiuersari solent. Si vitium aliquod in vesica urinaria est, ex hac naturaliter nullus humor, nisi cum vrina, exit. Si vero gonorrhoea venerea est, plerumque humor differt, qui in hac paucus esse solet, sed rodens et cum dysuria. Humor est mox ab initio crassior atque pinguis, immo viridescens; is omni tempore fluentibus catameniis excernitur, et a sanguine distingui potest. In fluore albo benigno humor dilutior et ptisanæ fere similis, nisi in iis, quae magna atque inueterata atonia laborant, in quibus glutinosior esse solet. Molestiam et pruritus maiorem crassioresque experiuntur, dum ambulant, quam priori vitio laborantes sentiunt inter mingendum. Praeterea in iis, quibus morbi nulla adhuc vetustas accessit, plerumque humoris benigni profluuium, prouenientibus menstruis et quamdiu sanguis sincerus effertur, prorsus conquiescit, quandoque menstrua finiuntur. Negandum tamen non est, haec non ita perpetua esse.

§. 548.

Morbus hic valde pertinax est, praecipue si vetustas accessit. Sunt tamen foeminae, quae per totam vitam sine

noxa hoc profluuium laborant. In aliis vero nonnumquam alios grauissimos morbos, in corporibus adstrictis et macilentis hecticam ac tabem, in obesis cachexiam adfert; id quod frequentius incidit, si morbus variis remediis, praecipue adstringentibus internis et externis, tentatus fuit. Nonnumquam etiam ex tali curatione nascuntur vehementissimae commotiones hystericae, scabies, purpura chronica, aliaque mala. Optime curari potest fluor iunioribus, si is ex menstruis vitiat, ex alienis in utero relictis ortus fuit; non facile vero in vetulis et quarum partes atonia laborant.

§. 549.

Si igitur a menstruorum vitio defectuque ortus est morbus, proficiunt omnia, quae de catameniorum vitiis praecipimus: Infusa per epicrasin laxantia, Pilulae Becheri, Thermae atque Acidulae epotae, et cum his Pilulae Becheri, quae omnia tamen catameniorum periodo accommodanda sunt. Singularem usum praestant infusa modo dicta, quae reliquis omnibus anteferenda, nec non Thermae Carolinae. In his casibus non negligendae sunt communes observationes. Si plethora urget, mitti debet sanguis. Si primae viae glutinoso laborant, proficit Ipecacuanha et Rhabbarum. Si puellae Venerem expetunt, suadendum est matrimonium, et quae sunt alia. Plurimum conferunt balnea ex emollientibus, vel etiam fatus genitalibus admissi, quibus catameniorum legitimum profluuium quandoque obtinetur. Si morbus relictus fuit a gonorrhoea virulenta non recte curata, dari debet decoctum ligni Guaiaci vel alia compositio, quae aduersus morbum venereum potest, cum Pilulis ex Mercurio, cum his Tinctura Antimonii cum Essentia Suecini, quibus per multum tempus praemissis tandem adiacienda sunt roborantia. Si malus corporis habitus et caechymia adest, remedia prosunt, quae maxime aduersus hanc possunt. Si ex atonia genitalium post nimium coitum vel nimis frequentem partum abortumque vitium oritur, praemissis vniuersalibus, maxime per epicrasin laxantibus, adhi-

adhibenda sunt balnea ex Melissa, Mentha, Matricaria, Maiorana, Hyssopo, Origano, &c. ex quibus etiam sacculi parari possunt, qui in balneo genitalibus et abdomini admoventur. Plurimum proficiunt Thermae Carolinae, earumque vsus etiam externus, si illum foeminae debiliores ferre possunt. Valde debilibus conueniunt Toeplicenses, quibus vltimis vero per aliquot septimanas vtendum est. Experiri etiam possumus suffitus ex Tacamahaca, Benzoë, Thure, Mastiche, in pauperculis ex baccis Iuniperi genitalibus admissos. Tandem etiam fumi possunt roborantia interna: Crocus Martis, Succinum praeparatum, Cortex Cascarillae et alia. Nimium adstringentia metum faciunt, ne vteri scirrhus et alia grauiora mala sequantur. Cum his foeminae a Venere prohibendae sunt. Nocent omnia glutinosa, nimius potus Caffee. Potioni praestanda est aqua fontana cum paucio vino rubro Pontac, vel decoctum radicis Chinae, Santali rubri, cum pauca Cassia lignea. Nota sunt exempla foeminarum, quae ex partu vel abortu maturo ab hoc morbo fuerunt liberatae. Plurimum ad eundem curandum proficit mundities, et si genitalia, praecipue menstruorum tempore, saepius eluuntur.



CHLOROSIS ET FVROR VTERINVS.

§. 550.

Chlorosis nomen habet ἀπὸ τῆς χλωρῆς, seu a viridescente colore, quem foeminae hoc morbo laborantes habere plerumque solent. Dicitur aliis pallor, morbus virginum, febris alba, icterus albus. Est cachexiae genus, sexui sequiori proprium, quo tamen non nisi post pubertatis annos affliguntur. Frequentius eo laborant virgines, vel viduae iuniores; nonnumquam in matrimonio viuentes.

Y 5

Esse

Esse solet cum mensium vitiis, quae quandoque morbum faciunt, quandoque a morbo aliunde orto nascuntur. Quibus ille imminet, illis ab initio labra et hypophthalmia pallida fiunt et surida, post tota facies, et tandem vniuersum corpus, tali colore deprauatum, paullulum intumescit. Foemina conqueritur de insolita lassitudine, respirationis difficultate, cordis palpitatione. Appetitus vel nullus est, vel vitiatus; saepe malacia, quandoque pica superuenit. Pulsus est languidus, vrina pauca, ab initio aquosa, ingrauescente morbo pallida et crassa. Vix non semper fluor albus accedit. Tales non raro Venerem valde adpetunt, quae desideria quandoque morbum pariunt, quandoque ingrauescente morbo ab acri humore magis excitantur et increbrescunt. Hic morbus differt a Leucophlegmatia, in qua tumor corporis maior est. In anasarca cum maiori tumore maior est durities. In ictero color luteus est. Proxime conuenit Chlorosis cum Cachexia, cuius genus est et id foeminis proprium.

§. 551.

Hic morbus frequens esse solet foeminis, quae corpus rarum habent, ab imbecillioribus etiam sic genitis natisque, et quae otio deditae molliter viuunt, corpus haud exercent. Causa continens esse videtur humor alias excerni solitus in vtero et genitalibus retentus, ibique corruptus, qui post aliis humidis admiscetur, vitium etiam sic contrahunt, vt tandem totus corporis habitus deprauetur. Immo hic humor corruptus tandem genus neruosum cerebrumque afficit, sensus internos turbat, mentemque mouet, quare nonnumquam ex ingrauescente morbo oritur maniae genus, quod Nymphomaniam vel Furorem vterinum vocant. Sunt vero plures causae, quae varias se- et excretionem turbant, et hoc cachexiae genus pariunt. Inter has sunt principes omnia, quae chyli sanguinisque et reliquorum bonorum succorum confectionem in corpore impediunt, catameniorum suppressio, viscerum omniumque fibrarum in corpore imbecillitas

cillitas a quacumque causa orta, victus vel crudus atque durus, vel varius ac opiparus, calidus, multo aromate vel cepis conditus, nimiae calidae, praecipue infusi Thée et Cofée potus, potus etiam valentior, et vinum adustum, panis acidus, maxime glutinosus, calidus. Magnam vim habent animi pathemata, praecipue amor moerorque. Inter causas referri debet sanguinis rubicundi defectus, vel propter viscerum et pulmonum imprimis imbecillitatem, vel sanguinis crebriores missiones. Nec minus etiam haec vitia a plethora oriri possunt, si hac humorum circuitus tardatur et se-atque excretiones sufflaminantur. Plurimum prae ceteris conferunt Veneris desideria, praecipue si haec per phantasmiam excitantur augenturque. De philtis, quantum valeant, res dubia videtur. Inter causas etiam est palloris studium, quem sibi quandoque deuoratis variis heterogeneis epotoque aceto consciscere solent.

§. 552.

Morbus hic inter initia et si causa tolli potest, sine negotio curatur; ubi vero vetustas accessit, vel si causae non tolluntur, victusque non mutatur, corpus non exercetur, saepe curari nequit. Desinit tandem in corporibus raris in hydropem, in aliis in hecticam. In ipsa curatione, sublatis prius causis cognitis, ante omnia videndum est, ut se-et excretio humorum vterinorum recte fieri possit. Quare saepe optimum auxilium est in matrimonio. Eritendum etiam est, ut menstrua recte fluant, de quibus alibi dictum. Sanguinis missio, nisi plethora adsit, nocet. Necessaria tamen est, si in corporibus frigidis medicamentis calidioribus uti volumus. Causae sedulo distinguendae sunt. Si igitur morbus ortus fuit a viscerum imbecillitate, adhibenda sunt omnia, quibus his nouum robur additur. Primum est corporis exercitatio, victus siccior, panis bis coctus cum aromate, carnes siccae, macriores, cereuisia meracior, pauca, cum lupulo, et cum hac aqua fontana saliens vel Selterana. Vinum paucum, sed meracum, praecipue Gal-
lis

lis Pontac dictum. Cum his dari debent medicamenta mucum et glutinosum attenuantia, amara, nec non sales. Ab initio experiri possumus Sales Cardui benedicti, Thermarum Carolinarum, aliosque neutrius generis et Pilulas Stahlian. Proficiunt etiam infusa cum vino et aqua ex radice Helenii, Gentianae rubrae, Aristolochiae rotundae, Vincetoxici, Costi dulcis; herba Artemisiae, Fumariae, Marrubii, Melissae, addito Rhabbarbaro, radice Bryoniae, Sale cathartico, Fibris Hellebori nigri. His tamen non ita facile vtendum, si, id quod saepe accidere solet, morbo nervorum distentio accedit, vel ad minimum vehementiores hysterici motus interdum superueniunt. His mitiora, et praecipue Rhabbarbarum solum conducit, et Pilulae ex Gummi Ammoniaco, Galbano, Asa foetida, addito Croco, Myrrha et extracto Cichorei. Prae reliquis autem his proficiunt Acidulae, et inter has praeceteris Pyrmontanae, nec non in corporibus frigidioribus Thermae Carolinae. Prouide enim agendum est in corporibus imbecillioribus, cum calidiora medicamenta in his facile haemoptysin, vomitum cruentum, et alias sanguinis profusiones mouere possunt, quae non raro funestae fiunt. Quo maior huic morbo vetustas accessit, eo mitioribus etiam aquis mineralibus, sed his diu, et saepe per plures menses, est vtendum. His tunc proficiunt plurimum Spadanae, per duos tresque menses potae. Cum aquis mineralibus dari possunt Pilulae Becheri, vel his similes, Sapo Venetus, vel alia cognita resoluentia. Laudant in iis corporibus, in quibus bilis deficit, vnum alterumque granum bilis siccatae Lucii piscis vel anguillae. Haec bilis mica panis potest inuolui, auro etiam obduci et deglutiri potest. Cum prandio dari possunt Elixiria stomachica alibi laudata.


§. 553.

Si mediantibus his primae viae purgatae fuerint, et corpus laxum est, adhibenda sunt roborantia. Plurimum Practicorum obseruatione praeceteris proficiunt martialia, quae

quae vero magnam Medici diligentiam postulant. Nocent enim in corpore adstricto, maxime in plethora, si sanguis nimis mobilis, ater atque crassus est, et vbi primae viae fordibus prae ceteris glutinosis laborant. Quare praecipue conducunt post adhibita infusa vel post epotas aquas minerales, quae etiam plurimum de Marte participant. Limatura Martis dari potest cum Pilulis supra laudatis, vel cum Traagea, si illa radicibus acrioribus, veluti Pimpinellae, Ari, Zingiberis, Corticibus aurantiorum recentibus, Cortici Winterano, vel compositioni Birkmanni adiicitur. Ceteris omnibus praeferri debet infusum ex Limatura Martis et Cortice Peruuiano cum vino meraco Rhenano paratum. In corporibus raris et sic dictis phlegmaticis adijci potest Cortex Winteranus. Limatura Martis etiam, ex consilio SYDENHAMII, ab aliis cum vino Rhenano coquitur, et decoctum addito Saccharo in Syrupum vertitur. Martialia interdum ab initio symptomata exasperare videntur. Non tamen propterea vsus eorum protinus intermittendus est. Cum his valde necessaria est corporis exercitatio et diligentior observatio omnium rerum non-naturalium. In exercitatione a lenioribus, et si res postulat, ad vehementiorem corporis motum progrediendum est. Plurimum profunt fricationes non solum abdominis, sed artuum et totius corporis, cum his fascia roborans, vel thorax, quibus partes solidae constringuntur. Inter remedia externa sunt balnea et thermae, quibus et menstrua euocantur, et vitiatum humor magis emollitur. Balneorum itaque vsus, repurgato prius corpore, egregius est, praecipue, si illa cum aquis mineralibus adhibentur. Apud nos magnam celebritatem habent Thermae Toeplicenses. Balneis domesticis adijci potest decoctum herbae Petroselinii, Artemisiae, Rutae, Chamomillae romanae, summitatum Iuniperi. Cauendum, ne balnea nimis calida sint.

§. 554.

Furor vterinus tandem oritur a corrupto liquore genitali, quo etiam mentis, quae vanas imagines accipit, functiones perturbantur. Atrox morbus est, praecipue si aegrae omnem pudorem exuunt. In his, si malum recens est, quandoque proficit matrimonium. Obseruanda sunt simul communia praecepta. Inprimis salubritatem afferre possunt abstinencia a fame propior, cum aquae solius potu, aquae minerales et serum lactis, quae diu multumque potari debent. Omnibus adiici potest plurimum Nitri. Adhibenda sunt auxilia, quibus phantasia corrupta ab inhaerente idea auocatur. De venae sectione notandum, illam ab ipitio et plethoricis prodesse, malo confirmato vero nocere.



SATYRIASIS ET PRIAPISMVS.


§. 555.

Morbi sunt spasmodici, viris proprii, qui perpetua fere membri genitalis tenuigine laborant. Est tamen quaedam differentia. In Priapismo tentigo est cum dolore, et quasi Tetani quoddam genus, sine magno Veneris desiderio. In Satyriasi vero maxima est salacitas, et homines coeco impetu in Venerem ruunt. Sedes horum morborum est in musculis erectilibus, qui spasmis adducuntur. Quare hi morbi frequentes sunt iis, qui spasticis morbis, arthritide, nephritide et similibus, conflantur. Priapismus tamen frequentior esse solet corporibus imbecillis, cachecticis, quibus genus nervosum valde imbecillum est. Priapismus gonorrhoeae cum magno dolore accedit, quod a materia acri vrethrae membrana interior inflammatur, qua inflammatione in consensum trahuntur et corpora cauernosa et musculi erectores. Idem oritur in calculosis, praecipue si calculus asperior vesicae ceruicem exagitat. In Satyriasi cum tentigine

gine humores spermatici vel copia, vel acrimonia peccant, et idem efficiunt. Priapismus, qui etiam frequens est iis, qui pueri vel iuvenes Venere abusi sunt, saepe degenerat in morbos conuulsivos, ipsamque epilepsiam; Satyriasis vero in veram maniam.

§. 556.

In curatione horum morborum causae considerandae sunt, illaeque, quantum fieri potest, tollendae. De cachecticorum curatione protinus dicam, nec non de gonorrhoea, in qua malum medicamentis calidis et diureticis plurimum augetur, emulsionibus aliisque lenioribus leuatur. Calculosis leuamen afferunt emollientia, praecipue oleum cum balneis emollientibus. In Satyriasi quandoque morbum tollit coitus, quandoque, si phantasia iam multum corrupta est, morbus magis eo accenditur. His vita debilis seruanda est, sanguis crebrius mitti debet, et aluus mitioribus, satis tamen valentibus, ducenda. Imperanda est abstinencia a fame propior, et potus aquosus. Vitanda est omnis occasio, quae Venerem accendere potest, etiam decubitus supinus, somnus matutinus protractior. Nulla fides habenda est specificis, quae vulgo laudantur.



CACOCHYMIA ET CACHEXIA.

§. 557.

Gradu inter se differunt. In priori corrupta sunt sola humida, in altera cum his etiam solida atonia vel alio vitio laborant, et cachexia proprie est corruptus totius corporis habitus. Quibus hi morbi imminet, illi ab initio obesi sunt, mox pallidi, tandem liuidi et luridi. Vitiatus color oritur a non recte subactis et per quietem quasi corruptis humoribus, praecipue lymphis. Deficit enim in his corporibus

poribus assumptorum concoctio et assimilatio. De colore tamen notandum, pallidum et alienum colorem non semper horum morborum indicium esse, qui quoque post terrorem ac timorem, suppressam iracundiam, post magnam euacuationem, Venerem aliasque occasiones oritur, quare necesse est, ut vitiatum color maneat et adaugeatur. Praeter ea aegri conqueruntur de cita defatigatione, lassitudine, et ad quamvis tum ingenium, tum corporis exercitationem subeundam ineptitudine. Pulsus est languidus, frequens palpitatione et anxietas, maxime post pastum, cum flatulentia et ruetu. Urina plerumque alba est et multa, tandem etiam crassa et cruda. Sub finem mentis torpor accedit, vertigo, sensuum obnubilatio, immo vertigo caduca, etiam pedes intumescunt, et totum corpus tumidum fit et imminet hydrops. Sunt tamen, qui atrophiam hecticamque etiam ad cachexiam referunt, ideoque distinguunt inter aridam et humidam.

§. 558.

Causa proxima huius morbi est, uti dixi, humorum cruditas et partium solidarum atonia, hinc laeduntur omnes functiones naturales, tandemque etiam animales, praecipue turbantur se- et excretiones. Maxime laeditur nutritio. Occasionem dare solent omnes illae causae iam alibi expositae, variarum se- et excretionum, praecipue mensium et haemorrhoidum, sudorum nocturnorum suppressio, plethora, solidarum laxitas et viscerum atonia. Quare etiam corpora rara his morbis longe facilius obnoxia fiunt, et ad eos plurimum faciunt nimia quies, litterarum nimium studium, mperor, amor et omnes animi perturbationes, intemperantia in victu, errores in potu. Etiam nascuntur hi morbi post magnas euacuationes, dysenteriam, haemorrhagiam, nimiam venaesecutionem in febribus aliisque morbis, diuturnum lactatum matris imbecillioris, post ptyalismum Mercurio concitatum nimium, alui fluxum nimium, diabetem, Veneris abusum, gonorrhoeam diuturnam, praecipue benignam,

nignam, post alios grauiore morbos non recte curatos, veluti si in febris acutis et ardentibus sanguinis missiones nimis frequentes fuerunt, si febres intermittentes curatae fuerunt vel per nimios sales, vel per corticem Peruvianum intempestiue datum, vel per alia sic dicta specifica, post haemorrhagias adstringentibus suppressas, post morbos arthriticos et varii generis dolores mediantibus opiatis curatos, post abusum vel intempestiuum usum Martialis, et si his aliisque quaecumque excretio, veluti fluor albus, sudor pedum, fuit impedita, post scabiem repressam, post magnas suppurationes, etiam a suppuratione cohibita, a potus spirituosus abusu. Maxime hoc accidit, si homines, ex febris aliisque morbis conualescentes, se protinus aëri exponunt, et sibi in aliis rebus indulgent. Aër etiam paludosus non parum confert.

§. 559.

Quantum hi morbi ab aliis differant, supra dictum fuit occasione eorum, quae de Chlorosi fuere praecepta. In Atrophia corpus non tumidum, sed macilentum est. In Scorbuto cachexia est, sed alia, et plerumque cum oris aliarumque partium foeda exulceratione. Curatur cacochymia in iunioribus, praecipue ea, quae relinquitur ab errore in victu, non ita facile, si viscera atonia laborant. Nullam curationem recipit cachexia, si labes est in viscere, vel alia corporis parte, quae tolli nequit. Inter mala signa sunt color valde luridus et viridescens, praecipue accedente nigrore, magna spirandi difficultas, hypochondriorum duritia, animi crebrior defectio et syncope. Mutatur facile in anasarcam, quandoque in tabem seu hecticam. Si cacochymicis et cachecticis vrina multa et viscida exit, cum euphoria, bonum signum est.

§. 560.

In curatione attenuandi corrigendi et educendi sunt vitiosi humores, solidis vero, si fieri potest, nouum robur

Z

con-

conciliandum, in omnibus vero sedulo considerandae sunt causae. In Cachexia igitur, quae a prauo victu, nimia quiete, et similibus ortum cepit, dari debent Sales: Sal catharticus, Sal Thermarum Carolinarum, Sal Cardui benedicti, Tinctura Tartari. Praecipue ubi ex acrimonia acida, victu crudo, vegetabili, orta fuit Cachexia, proficit Tinctura Antimonii acris, nec non, quam BOERHAAVIUS inprimis extollit, Tinctura Salis Tartari Harueana. Vid. *eius Chemiam Tom. II. Process. 79.* ubi agit de vegetabilibus. Huius Tincturae drachma j. ad ij. misceri possunt cum vncia vna Syrupi quinque radicum aperientium, adiecta aqua Foeniculi. Vbi viscidum exsuperat, proficit Gummi ammoniacum, vel vitello oui solutum, vel cum pilulis Becheri. Haec et similia per plures dies dari possunt. Hoc vero de Salibus aequae ac purgantibus, nec non de aliis stimulantibus tenendum est, prouide agendum esse, et semper a lenioribus incipiendum. Nam si impetu agitur, vasa, vitiata humore iam distenta, rumpuntur, et oritur lethalis hydrops, id quod etiam in ipsius hydropis curatione obseruandum est. Praemissis digestiuis, dari possunt laxantia, praecipue infusa per epicrasin laxantia, ex Pimpinella alba, Helenio, Cichoreo, Centaurio, Fumaria, Cortice Aurantiorum flauo, foliis Sennae, radice Bryoniae, Agarico in petia ligato. Vel dari potest Puluis radicis Ialapae iteratis vicibus. Prosunt etiam Pilulae Stahlianæ, aliaque. In corporibus infirmis idonea sunt Apozemata ex Sena et Rhabarbaro. Praestantissimum auxilium afferunt aquae minerales, praecipue Thermae Carolinae, et cum his datae Pilulae Becheri vel aliae his similes. Reliqua, quae ad roborantia attinent, ad usum Corticis Chinae, Martialium, corporis exercitationem, abstinentiam ab omnibus, quibus corpus infirmari solet, ea seruanda sunt, quae alibi, et praecipue de Chlorosi praecepimus. Limatura Martis commodè cum Pilulis Becheri datur, quibus etiam admisceri potest Sapo Venetus.

§. 561.

Haec vero medendi methodus, per euacuantia, pestifera foret in Cachexia post grauem haemorrhagiam vel aliam magnam euacuationem relicta, in qua conducunt iuscula diluentia cum radicibus aperientibus, Petroselini, Cichorei, Apii, herbis recentibus Nasturtii, Cardui benedicti, &c. Multum prodest lac asininum diu potandum, serum lactis, in quo ferrum candens extinctum fuit, quod conducit praemissis prioribus. Antequam vero haec dantur, immo cum his ipsis, sedulo expurgandae sunt primae viae laxantibus mitioribus, praecipue Rhabbarbaro. Adiaci interdum potest stimulus salinus ex Tinctura Tartari aliisque. Conducunt etiam infusa aquosa ex Sassaaparilla, Scorzonera, Cichoreo, ligno Sassafras, quae, horis matutinis epota in lectulo, lenem expirationem mouent. Si morbus ortus fuit a male curata suppressaque febre, illa reuocari debet methodo, quam alibi proposui. Si a pure represso, danda sunt decocta sanguinem purgantia. Si cachexia orta fuit ab abusu vini adusti, conducit serum lactis, lac asininum, potus diluens, iuscula illa et similia; raro haec curatur. Si a moerore, plurimum conducit corporis exercitatio, iter et aliae etiam ludicrae grataeque exercitationes. In omnibus seruanda est alio libertas, et ventriculo prospiciendum est, non solum abstinencia, sed datis interdum etiam medicamentis stomachicis. Nisi morbi tum caussis, tum eius naturae et symptomatis aptetur victus aliarumque rerum non-naturalium vsus, parum proficiunt medicamenta.

H Y D R O P S.

§. 562.

Huius diuersa genera et diuersi gradus sunt. Oedema est tumor mollis, frigidus, impressi digiti vestigium retinens, praecipue in pedibus, aliquando etiam in manibus

Z 2

et

et quandoque in palpebris. Leucophlegmatia dicitur, si vasa, praecipue venae lymphaticae laxatae, pituita albida distenduntur. Si humor vero magis viscidus est, tumorque magis durus, isque, ut etiam in leucophlegmatia esse solet, per totum corpus diffusus est, dicitur Anasarca. In hac cutis digito pressa non tam facile cedit, fovea vero diutius manet. Ceteroquin sunt plura hydropis genera, quae certas corporis sedes infestant. Nam humor contrahitur nonnumquam in tunicam cellulosa Peritonaei, quod hydropis genus fere Ascitem repraesentat. Ascites dicitur, si humor in abdomen effusus est. Si autem vapor, non vero aqua, abdomen distendit, dicitur Hydrops siccus vel Tympanites. In pectore est hydrops pectoris, pericardii, pulmonum. In capite Hydrocephalum internum et externum; praeter ea est Hydrops scroti, Hydrocele, Hydrops ovarii, Hydrops uteri et tubarum uteri. Quandoque in visceribus fiunt Hydatides, quae ad hydropem etiam referri debent, quum nihil aliud sint, quam lymphatica vasa a quiescente humore corrupta et quoad molem aucta lymphae.

§. 563.

Haec omnia genera inter se differunt, aliquando tamen difficilius dignoscuntur. Leucophlegmatiam et Anasarcam duritiae potissimum et tumore differre diximus. In Ascite abdomen tumet, accedit sub finem pedum oedema cum hydropse scroti, marcescentibus partibus superioribus. Aqua in ventrem contracta, moto corpore, ita movetur, ut eius motus digitis percipi et oculis etiam conspici possit. Urina pauca est, rubicunda, crassa. Sudor nullus, spirandi difficultas, sitis magna, sub finem tussis sicca et febricula lenta. Si aqua in tunicam cellulosa Peritonaei contracta est, tumor durior, cutis magis intenta est, nullus percipitur intus aquarum motus, nec pedes facile intumescent. In Tympanite tumor abdominis durus est, et si manu feritur, quasi sonorus, is pressio digito non cedit, aeger sentit tormina circa umbilicum et lumbos, anxietatem

tem praecordiorum, vrina pauca est, rubra et rodens. In hydrope pectoris dyspnoea est, quae vesperi multum exacerbatur, tussis sicca, sensus refrigerii in pectore, lassitudo, praecipue artuum superiorum, anorexia. Fere eadem symptomata sunt in Empyemate, sed hoc ex morbo inflammatorio relinquitur; Hydrops pectoris ab aliis causis oritur. Discrimen inter hydropem scroti et hydrocelem exponit Chirurgia. In Hydrocele scrotum rugas habet, et penis inflatus haud est. Tumor etiam, si vnum latus Hydrocele laborat, inaequalis est, ut scroti sutura non in medio sit, penis vero inflatus non est. Secus se omnia habent in Hydrope scroti, in quo scrotum erugatum, sutura in medio est, et integumenta penis, ipsumque praeputium valde aquis intentum. Ovarii hydrops, cui sub finem plerumque Ascites accedit, difficulter dignoscitur. Interdum hoc genus oritur in sterilibus, et plerumque menstruum obstructio accedit. Foemina molem aliquam in abdomine sentit, quae moto corpore ita mouetur, ut aegra etiam motum sentiat. Tumor abdominis inaequalis est. Hydrops vteri opinionem graviditatis facere potest; nam eo etiam catamenia supprimuntur. Certissimum fere signum in mammis est, quae gravidis durae et tumidae fiunt, quippe in quas lac contrahitur. Cachexia vero et Hydrope laborantium mammae molles ac pensiles nullum lac habent. Hydrope vteri aegris saepe humor ex genitalibus effertur, id quod raro incidit gravidis. Ab Ascite hydrops vteri distinguitur, quod in hoc tumor magis inferiorem partem abdominis et pelvum, in Ascite totum abdomen occupat. Ascites etiam opinionem graviditatis saepe facit, immo incidit, ut grvida hydropica fiat. Ut hoc etiam dignoscamus, considerari debent causae praegressae, mammarum et totius corporis habitus, appetitus, qui in gravidis in primis temporibus lacus, post medium gestationis tempus plerumque melior est. Certissimum vero signum est in orificio vteri interno, quod in gravidis mutatum, versus inferiora et intestinum rectum inclinaturn et quasi depressum, in Ascite laborantibus naturale

rale est. Cauendum est Medico, ne ab astutioribus foeminis decipiatur.

§. 564.

Si vero symptomatum, quae in hydropis pathologia occurrunt, ratio reddenda est, tumor in omni hydropse ab humoris abundantia nascitur, qui vero in varias sedes contractus est. Tumor hic, quamdiu humor in distentis vasis lymphaticis haeret, durus est, elasticus; si vero hic iisdem ruptis in cellulas tunicae adiposae emittitur, tumor mollior fit, et qui digito ita cedit, vt huius etiam impressi vestigium diutius maneat. Dyspnœa oritur vel ab impedito motu diaphragmatis, vel a compresso pulmone, in hydropse pectoris, vel si humor in pulmonum vesiculas contractus est. Febris nascitur ab acri corruptoque per quietem humore. Sitis a deficiente humido blando in faucibus. Nam et aliae partes marcidæ fiunt et siccae. Humida enim per alias vias efferuntur, ob quam causam etiam vrina pauca esse solet, sudorque nullus, intolerabilis sitis, ubi sub finem quiescentes humores corrumpuntur, putrescunt, et alcaliscentes fitim in faucibus excitant. Pulsus paucus est, propter minus mobilem sanguinem et deficientes vires. Tussis sicca oritur ab acri humore bronchia vellicante.

§. 565.

Causa varia est. Nam hydrops nascitur vel vitio lymphæ glutinosæ atque corruptæ, quare cachectici hydropici fiunt, vel a laxitate solidorum, qua lymphæ circuitus impeditur, quæ sic quiescit, et quiete corrumpitur, denique ab obstructione venarum absorbentium in variis cauis et receptaculis, nec non ab impedito lymphæ circuitu in suis receptaculis. Hoc incidit iterum ex variis causis. Si vasa lymphatica vel venæ sanguinem ferentes a quacunque causa premuntur arctanturque, et si viscera, glandulae, aliaeque partes, ad quas illae pertinent, indurantur et scirrhusæ fiunt. Pessima hydropis causa est, si vasa lymphatica rumpuntur. Occasiones vero, ex quibus hæc hydropis causæ

caussae nascuntur, supra, vbi de Cachexiae origine diximus, relatae fuerunt.

§. 566.

Hydrops morbus periculosus est, et qui difficulter tollitur. Nullam curationem recipit, si a scirrho et labe in visceribus incepit. Igitur a causa petenda est prognosis, et videndum, num morbus pedetentim adoleuerit, vel num tumor repente increuerit, quod vltimum plerumque accidit, vbi vasa rupta sunt, quod genus deterius esse dixi. Melior est Anasarca quam Ascites, hac vero peior Tympanites. Spem faciunt morbus, cui nondum vetustas accessit, virium integritas, aetas iuuenilis, mens composita, et si aeger abstinentiam sitimque tolerare potest, hypochondriorum mollitia, respiratio liberior, vrina aquosa et copiosa, pulsus magnus et tardus. Quo paucior vrina, eo peior; pessima vero crassa et lixiuiosa est. Saliua spissa, tenax, viscida, linguae et dentibus inhaerens, oris foetor cum tussi, mali morbi indicia sunt; significant enim humorem quiescentem corruptum esse, putrescendo acrem fieri et volatilem. Quo vehementior sitis, eo citius morbus morte finitur. Haemorrhagia narium in hydropicis mortem instare significat, quae ideo frequens est, quod vasa sanguifera mole aquarum compressa ea parte, qua libera sunt, rumpuntur. Si in pedibus cutis exulceratur, quandoque aeger seruatur, si per vlcera copiosior humor fertur. In vlceribus tamen hydropicorum metuenda est gangraena. Hydrops interdum, sed raro, naturae beneficio soluitur, per copiosas aquarum deiectiones, vel si plus humoris per vrethram excernitur, quam bibitur. Superueniens vero diarrhoea, cum maiori imbecillitate, saepe pessima, et mortis instantis nota est.

§. 567.

In Curatione enitendum, vt lymphæ attenuetur, quiescens humor euocetur, et vt partes ad debitum robur perducantur. In dandis autem varii generis medicamentis semper a mitioribus incipiendum et pedetentim ad valentiora proceden-

dendum. Inprimis respiciendum est ad aegrum. Si hic enim febre laborat, et totus corporis habitus iam corruptus est, lenioribus medicamentis, minime acris et calidis, res agenda est, quum alias facile vasa rumpantur et aeger praecipitetur. Vbi vero corpus frigidum est, et sine febre, efficacioribus utendum. Lympham attenuant atque resolvunt ex vegetabilibus acriora: radix Pimpinellae, Aristolochiae, Valerianae, Bryoniae, Imperatoriae, Ireos Florentinae, Petasitidis, Helenii, Gentianae rubrae; herba Cochleariae, Fumariae, Beccabungae, Absynthii, Centaurii minoris, Marrubii, Abrotani, Scordii, Rorismarini, Cuscutae; Cortex medius Sambuci, Cortex Winteranus, Cortex flavus Aurantium amarorum; baccae Lauri, Juniperi, ex quibus parari possunt varii generis infusa, vel sine purgantibus, id quod ab initio melius est, vel additis etiam efficacioribus euacuantibus. Inter resoluentia sunt etiam alia vegetabilia, Allium et radix Armoraciae; haec ex lacte coquuntur, cuius decocti libra ad minimum vna per diem epotatur. Efficacior fere est Cortex medius Sambuci ex sero lactis coquendus. Ab *Edimburgensibus* in *Tentamin. Vol. V. Art. 7.* extollitur Succus radicis Ireos palustris, cuius guttulae 80. dantur altera quaque hora. Admiscet huic succo quartam circiter partem Syrupi domestici, quem alias Syrupum Rhamni cathartici, vel de Spinae cervina vocamus. Dosis post aucta fuit, et hoc medicamento omnis aqua ex corpore fuit euocata. Sub finem autem homo apoplecticus obiit. Magnam efficaciam habet Squilla, quae varia ratione exhiberi potest. Ab initio experiendum est Acetum squilliticum ad unciam j, vnam cum dimidia, vel duas datum. Extractum Squillae ad gr. v. - viij admisceri potest pilulis Stahlî, addito paucio Nitro. Prostat etiam pulvis Squillae compositus Stahlî; longe efficacius est decoctum cum vino meraco Rhenano. De his omnibus medicamentis illud dicendum, in iis exhibendis magna diligentia medentis opus esse. Nam non raro nocent, et aegrum, qui adhuc per tempus servari potuisset, praecipitant, id quod metuen-

metuendum est in maiori solidorum atonia, vel si vlcus, scirrhus, aliudue vitium in quo viscere latet, ex quo morbus ortus fuit. Etiam experientia docuit, saepe aegros, qui, eductis omnibus per cathartica aliaque euacuantia aquis, conualuisse videbantur, breui post apoplecticos obiisse.

§. 568.

Haec omnia, quae in frigidis corporibus, quae sine febre sunt, conveniunt, aliena sunt in iis, quae iam febri-cula tenet. His dandi sunt sales, Cremor Tartari, Terra foliata Tartari, Extracta radicum aperientium. Vrgente aestu experiri licet Acetum squilliticum ad unciam dimidiam vel integram; plerumque tales servari non possunt.

§. 569.

Inter aperientia et resolventia etiam sunt Sales fixi maiori in quantitate exhibendi, Sal Thermarum ad unciam unam et dimidiam, Sal Cardui benedicti vel Absynthii; Tinctura Antimonii acris vel tartarifata, prae ceteris vero Sal stipitum fabarum. Sales, si eorum usum sequitur copiosioris urinae profluvium, spem faciunt. Videndum vero, quoniam haec omnia sitim movent, ne aeger ad satietatem bibat. In abstinentia enim a potu maximum remedium positum esse, iam CELSVS prodidit *Lib. III. Cap. 21*. His vero praemissis, adhibenda sunt euacuantia. Mitiora sunt infusa per epicrasin laxantia, quibus illa resolventia adijci possunt. Aquas etiam educunt phlegmagoga et hydragoga, quorum magnus numerus in officinis est. Efficaciora vero non semper tuta sunt. Inter mitiora est radix Isalappae ad scrup. j. vel drachmam dimidiam, Diagrydium ad gr. iv-vj. Novi exemplum, ubi illud genus, quod Anasarcam vocamus, Magnesia alba cum Sale cathartico, addito auro fulminante, curatum fuit. Exhiberi potest pulvis Mechoacan-nae albae ad drachm. j. vel unam et dimidiam pro dosi. Succus Ireos nostratis ad scrup. ij. vel drachmam unam. Efficaciora sunt Elaterium seu Succus Cucumeris

asinini; Extractum Esulae, quod ad gr. iij - iv - vj datur. Haec tamen in corporibus imbecillis facile inflammationem concitant. Sedulo illud obseruandum in exhibendis illis efficacioribus purgantibus, a mitioribus et a minori dosi ordiendum esse. Vbi vero febris vrget, haec efficaciora purgantia aliena sunt. His dari potest Rhabarbarum cum Sale, vel Tinctura Rhabarbari cum Liquore terrae foliatae Tartari parata, Anima Rhabarbari vel decoctum Mannae cum foliis Sennae. Nec alieni sunt clysteres, quibus vero etiam efficaciora, et praecipue Tartarus emeticus ad gr. iv - v. admisceri potest.

§. 570.

Si his euacuantibus tumor desidit, et corpus extenuatur, oportet partem flaccidam fascia infirmitatem adiuuante deligari, quae non solum post paracentesin abdominis, sed etiam post dissipata oedemata crurum necessaria est; sanguis enim per nimis laxata vasa moueri nequit, atque facile subsistit, qui, si hoc per paracentesin in vena caua accidit, lethalem syncopem, in pedibus vero oedemate liberatis obstructionem, abscessus aliosque nouos morbos parit. Dari praeterea etiam debent roborantia, et fere optimum est vinum generosum, in quo ferrum candens exstinctum fuit, et illud ante notum infusum Limaturae Martis cum Cortice Peruuiano. Quoniam illa euacuantia, tum purgantia, tum diuretica, non quotidie exhiberi possunt, diebus mediis danda sunt stomachica, Elixiria ex Extractis amaris cum Tinctura salis Tartari parata. Vomitus interdum salutaris est, qui vero non nimis frequens esse debet. Respicendum sedulo est ad vires. Sanguinis missio plerumque aliena est et noxia, nisi plethora manifesta sit et a menstruorum et haemorrhoidum obstructione, vel ab asthma sanguineo ortum habuerit morbus.

§. 571.

Vitus etiam curationi accommodandus est. De abstinentia a potu iam supra dixi, illam valde necessariam esse.

fe. Potioni praestanda est cereuisia meracior, vinum generosum, vinum cum Absynthio. Sitis fallitur, si saepius os eluitur aqua cum parte sexta succi Citri vel aceti. Vbi sitis vrget, aqua dari potest cum vino, vel etiam admixto spiritu ardente. Cibus sit ex materia leui, quae facile subigitur, ex pane cum aromate, carnibus assis meracioribus; nocent iura, legumina, aliaque flatulenta. In aëre aeger viuat siccio, montano, non paludoso. Plurimum conferunt exercitationes apricante Sole. Veteribus maximum auxilium fuit in arena. Arena enim sole percalefacta obtruebant aegros, quos sic quasi torrefactos extenuabant. Nocet somnus nimius. Stragula veteribus in vsu fuere ex herbis fragrantioribus. Praestant stragula duriora praemolibus. De frictione alibi retuli, in ea ad roborandas partes maximum auxilium esse.

§. 572.

Oedema, si a compressione venarum oritur, veluti in grauidis, facile curatur. Si a laxitate, adhibenda est fascia seu tibialis genus (*ein Schnürstrumpf*), quod auxilium vero perniciosum est, si oedema ab Ascite vel hydropse pectoris ortum fuit. Nec non aliam curationem poscit, quam hydrops. De remediis externis vide Chirurgiam.

§. 573.

Anasarca magis resoluentibus et diureticis, quam purgantibus curatur, praecipue multum proficit Sal stipitum fabarum. In hoc genere, si viscera nullo vitio laborant, salubres esse possunt Thermae. Non negligenda sunt roborantia et vinclurae externae. Anasarca a solis causis externis, veluti a vehementiori frigore orta, si viscera sine labe sunt, non aliam curationem desiderat, quam externam. Prius licet experiri fricationes in laconico, et si hae non proficiunt, in artubus inferioribus concidenda cutis est, ut aquae efferantur. Non ita tutum est vlcera admotis cantharidibus excitare.

§. 574.

§. 574.

Hydrops pectoris ab initio difficilior dignoscitur. Aeger conqueritur de praecordiorum angustia, quae vesperi potissimum increbrescit. Frequentes sunt cordis palpitaciones, pulsus inaequalis est, sub finem intermittens, accedit tussicula sicca. Corpus intabescit, facies lurida fit, et tandem aeger fluctuantem humorem in pectore sentit. Sub finem brachia imbecilla fiunt, immo extenuata, pedes ex oedemate intumescunt. Morbus chronicus est, qui saepe pedetentim ingrauescit, ut homo tandem vel suffocetur, vel apoplecticus moriatur. Ab asthma humido differt, in quo tussis humida est, non sicca, qualis est hydropicis. Hic morbus saepe ex communibus hydropis causis nascitur, saepe ab asthma spastico relinquitur, nec non a morbis inflammatoriis pectoris, et si ex his in pulmonibus scirrhii relictii fuerunt. Plurimum confert violenta pulmonum inflatio; quare tibicines et cantores huic morbo saepe obnoxii fiunt. Multum conferunt mala pectoris conformatio et cordis polypus ex aliis causis ortus. Quo maior est orthopnoea, eo maior spes est. Curandi methodus non alia est, quam communis. Ab initio dari debet crebrius Oxymel squilliticum cum Syrupo de Althaea vel Capillorum Veneris. Cauendum tamen est a nimio usu bechicorum, quibus pulmones aliaeque partes magis infirmantur. Plurimum confert a primis initiis equitatio. Vbi febricula vrget et tussis arida, quandoque dari possunt emulsiones dilutiores; praestat Oxymel squilliticum. Experiri licet Gummi ammoniacum. Veteres ferrum candens hinc inde pectori admouerunt, et excitatis magnis ulceribus et suppurationibus quandoque desperatum hunc morbum curarunt. Vix tentanda est paracentesis thoracis, quae mortem accelerat.

§. 575.

Ascites etiam pedetentim aut plurimum ingruit. Aegri ab initio conqueruntur de insueta lassitudine et corporis grauitate, spirandi difficultate, hypochondriorum tensione, tandem

tandem intumescunt pedes, in viris scrotum, in mulieribus pudendorum labra, cum tabe superiorum partium. Reliqua symptomata communia sunt, et multum intenditur abdomen. Sub finem, si causa morbi in hepate vel liene est, quandoque accedit icterus, etiam niger, mortis prodromus. In sectis cadaveribus polypus in corde, tumor et durities glandularum et viscerum, praecipue hepatis, omentum corruptum, bilis in cystide pauca et glutinosa reperiri solet. Humor vero, cuius quandoque magna vis esse solet, quandoque limpidus, quandoque corruptus, gelatinosus, immo, si ex ruptis vasis lacteis emissus fuit, lacteus et chylosus reperiri solet. Curatur morbus, si ortus fuit ab obstructione venarum absorbentium, et proficiunt hic prae ceteris purgantia. Haec si non proficiunt, omne praesidium a Chirurgia et Paracentesi sperandum, de qua vide Chirurgiam. Haec mortem accelerat, si rupta sunt vasa lymphatica, et si viscera corrupta sunt. Vbi vrina lixiviola sit, nulla spes est. Si Ascites in foeminis cum ovarii tumore est, omnia frustra fiunt.

§. 575.

Hydrops vteri plerumque nascitur a coagulo, mola, vel parte placentae, in vtero relictis, praecipue si in vasa lymphatica obstructa, tum etiam placentae, humor contrahitur, ex quibus dilatatis hydatides nascuntur. Saepe hoc hydropis genus in gravidis esse solet, vbi omnis vehementior curatio aliena est. Considerare debemus signa supra data. Indicium fere certius partus in vtero haerentis est eius motus vitalis. Nihilominus tamen etiam falluntur foeminae, quae sibi aliisque persuadent, se sentire hunc motum gesticulantis infantis, qui a spasmodicis et flatibus descendentibus concitatus fuerat. Ex vtero, si in eo moles aquarum est, quandoque effluit copiosior humor; hoc vero etiam gravidis interdum accidere solet, si aquae, quas spurias adpellant, ex genitalibus efferuntur. Hoc enim accidere solet, si duo ovula impraegnata in centrum descenderunt,

runt, alterius vero foetu quacumque ratione suffocato vel corrupto, humor ex ruptis velamentis effertur. In curatione plurimum proficiunt infusa vinosa per epicrasin laxantia, Pilulae Becheri, obseruatis communibus praeceptis reliquis. Profunt quoque foci ex herbis roborantibus genitalibus admissi.



T Y M P A N I T I S.

§. 577.

Spurium quasi hydropis genus est, et dicitur hydrops siccus vel flatulentus, in quo non tam humor, quam aër statusque in abdomen et intestina contrahuntur. De diagnosi supra diximus. In Tympanite venter est tympani instar intentus inflatusque. Tumor est durior, ab initio crebriores sunt ructus et flatus, post intenditur dolor sub cordis scrobiculo cum multa anxietate. Pulsus est inaequalis, plerumque durus et celerior, accedit sitis, alius contracta, dura, et deiectio rara scybalorum. Aliquando, sed parum, leuatur homo explosis ructibus et flatibus. Urina rubra, crassa, ex qua, inualecente morbo, multa crassaque defidunt. Color faciei luridus, accedit sub finem oedema. Ascite laborantibus pedes mox ab initio intumescunt; in Tympanite sub finem, et ubi prius magna ventris facta fuit inflatio. In Ascite digito sentiri potest intus aquarum motus; in Tympanite maior inflatio et crebriores intus a flatibus sonitus audiuntur. Tympanitis tamen saepe in Ascitem mutatur, et ideo haec duo interdum inter se iunguntur. Differt ab Emphysemate, quod plerumque cum vulneribus esse solet; a Cholera sicca seu morbo ructuoso HIPPOCRATIS. Nam in Tympanite confirmata raro αἶμα καὶ καίτω exploditur aër, et si hoc accidit, aliquale, quamuis breue, leuamen sentit aeger; in Cholera eiusmodi sonitus vix

vix non perpetuo efferuntur, sine villo leuamine. Sedes morbi est in intestinis, quae post mortem saepe mirum in modum flatibus intenta reperiuntur. Aër vero, isque a quiescentibus humidis ortus, nonnumquam etiam in abdomine est inter viscera et Peritonaeum, ita vt inciso corpore post mortem putris halitus cum impetu expiret.

§. 578.

Causa huius morbi est resolutio intestinorum, et si motus peristalticus quacumque ratione laesus deficit, materia etiam mucida, fermentescens assumtorum, si a visceribus abdominis et a bile aliisque succis chylicationi inservientibus non fuit subacta, sed motu intestino et calore rarior facta, in halitus resolvitur. Notabilis est illa observatio in *Transactionibus Britannicis no. 414. Vol. VII. p. 572.* ubi ex vulnere minori folliculi fellei magna inflatio abdominis, eaque funesta, orta fuit, ita, vt nec *ἄνω* nec *κάτω* sonitus ab aegro emitti potuerit. Ex qua re clarum est, bilem ad peristalticum motum plurimum facere, et eam debilem, qua mucus et tenacior pituita resolui nequit, tympaniti occasionem dare. Forte etiam in altero genere, ubi aër in abdomen contractus est, accedit atonia Peritonaei et musculorum abdominis.

§. 579.

Huic morbo foeminae frequentius obnoxiae sunt, et ex viris infirmiores. Plerumque enim his etiam viscera imbecilliora sunt, in quibus humores non recte conficiuntur. Observatione compertum est, eos, qui de doloribus colicis, umbilici regionem infestantibus iisque pertinacioribus, et qui nullis remediis obediunt, conqueruntur, huic morbo obnoxios fieri. Oritur Tympanitis a refrigerio abdominis, a potu frigido, a potu fermentescente, cerevisia tenui, prae ceteris ab aqua niuata, et ab abusu spiritus ardentis. Praeter ea multum ad hunc morbum conferre potest cibus crudus, glutinosus, inflans, animi crebrior commotio per iram,

iram, passio hysterica, alii morbi spastici, colica flatulenta, spasmodica; dysenteria, vomitoriorum et purgantium abusus, mala materia a malignis variolis in viscera abdominis inclinata, glandularum in mesenterio, nec non pancreatis et hepatis scirrhus, anodynorum et opiatorum in morbis spasticis abusus, nimis frequentes sanguinis missiones et aliae profusiones. Interdum morbus ab assumtis venenis relictus fuit.

§. 580.

Morbus periculosissimus est, qui, si inueterauit, raro curatur, et numquam si partes glandulosae scirrhosaeque factae fuerunt. Sperari potest, si homini nulla febris est, nulla vel non admodum magna spirandi difficultas, appetitus bonus, et si morbus a malo victu et non a peioribus causis ortus fuit.


§. 581.

Curatio absoluitur remediis carminatiuis et aluum decentibus. Ab initio dari possunt Pilulae Becheri, insasa ex carminatiuis et Rhabarbaro cum vino parata, enemata ex herbis et seminibus carminatiuis cum iure carnum decocta, addito oleo et sale, praecipue sale Ammoniaco ad drachm. j. vel ij. Semper cum laxantibus dari debent carminatiua. Conducit etiam Liquor anodynus Hoffmanni, cum quarta parte Balsami vitae. Frequentius iterari debent enemata. Extrinsecus abdomini admoueri possunt sacculi ex herbis fragrantioribus, et praecipue Balsama alibi laudata. Extollunt fomenta ex Sulphure, quod cum vrina sani hominis decoctum fuit. Imponi etiam a nonnullis abdomini solent sacculi auena cruda vel arena pleni. Cum his necessaria sunt enemata, quae etiam ex vrina sani hominis cum Terebinthina, vitello oui subacta, fiunt. Victus omnibus accommodandus est, et vinum dandum paucum meracum, vel vinum cum Absynthio fermentatum. Sub finem pulvis ille Birkmanni cum Croco Martis et alia subinde laudata martialia.

§. 582.

§. 582.

Vbi vero iam febricula aegrum tenet, eumque fitis vexat, et vrina lixiuiosa est, periculum certum esse solet, et tunc medicamenta iam memorata aliena sunt. Alius duci potest Rhabarbaro. Dandae sunt aquae Sedlicenses cum Liquore anodyno. Adhibenda sunt enemata, et si res bene cedit, pedetentim ad efficaciora procedendum.



S C A B I E S.

§. 583.

Est minimarum fistularum, quae copiosiores in cute sunt, exulceratio, ab humore, qui per eas naturaliter effertur, si is vitio sui generis, eoque contagioso, corruptus est. Incipit scabies plerumque in artubus, sed post, vbi inueterauit, ea totum corpus, excepta facie, occupat. Frequens est iunioribus, in quorum corporibus maior raritas et vasorum omnis generis maior numerus est. Pertinacior esse solet in senibus. Distinguitur in benignam et malignam. Ultima aliis morbis accedit, scorbuto, lvi venereae. Vel cum illa est visceris cuiusdam, praecipue ex iis, quae chylificationi inseruiunt, vitium. Magnum discrimen est inter humidam et siccam. Humida habet pustulas maiores elatioresque, multo humore, eoque pinguiori, turgidas, quae ruptae vertuntur in crustam spissam, pinguem, quae per cutim diffunditur. In sicca pustulae minores sunt, sero acriori turgidae, cum qua esse solet intolerabilis pruritus et vix superabile scalpendi desiderium. Haec posterior senibus et corporibus siccis adstrictisque; prior iunioribus et corporibus raris frequentior est. Circulus rubicundus, quo pustulae comprehenduntur, maiorem inflammationem significat.

Aa

§. 584.

§. 584.

Sedes huius morbi esse videtur tum in fero, quod per cutim excernitur, tum etiam, ut videtur, in oleo tunicae adiposae, et pinguiusculo humore glandularum cutanearum atque sebacearum. Ille corruptus humor, quamdiu sanguis admixtus est, sine noxa conquiescit, a sanguine vero secretus et ad illas fistulas et glandulas secretorias delatus, maiorem acrimoniam adipiscitur, inflammat roditque. Peculiare tamen et sui generis vitium esse videtur, quod eius contagium indicat. Nam contagione potissimum, median-
tibus linteis, vestibus aliisque rebus, quae corpori admo-
ventur, et si haec cum corpore sano incalescunt, in alia corpora transfertur.

§. 585.

Frequentior itaque causa huius morbi est contagium. Si vero is sine hoc ex aliis suisque causis in aliquo corpore nascitur, plura sunt, quae occasionem dare possunt. Praesertim aliunde aduenientes homines, aëri aquisque haud ad-
sueti, si has impuras potant, vel etiam iisdem manus lauant,
non raro scabiem contrahunt. Aliquid conferre videtur hu-
mor lentus, ex defectu exercitationis ortus, mundities ne-
glecta, aër vappidus, inclusus, impurus, paludosus.
Quare mala scabies miseros saepe urget, qui carceribus
squalidis et subterraneis adseruantur. Victus crudus, sal-
sus, ex fructibus horaeis austeris, nec non carnibus vis-
cidis, sale conditis. Animi pathemata, praecipue moeror,
quibus humorum lentor multum augetur, et humorum te-
nuiorum confectio impeditur, cohibita exspiratio, mensium
et haemorrhoidum obstructio, multum conferre videntur.
De vitio in visceribus nato iam dixi. Saepe in scabie ma-
ligna omnique medicinae reluctantibus post mor-
tem tumidi scirrhusique reperti fuerunt lienes.

§. 586.

Quandoque facile satis tollitur, nonnumquam vero
vix villo modo expugnari potest, prae ceteris maligna, ex alio
modo

modo vel ex visceris vitio orta. Facillime curatur ea, quae ex contagio nata fuit, si ei mox inter initia succurritur. Est tamen etiam critica, qua orta soluuntur alii desperati morbi, arthritis, asthma spasticum, quartana, epilepsia. Longe tamen frequentius est videre morbos ex scabie male curata ortos, epilepsiam, catarrhum suffocatum, paralytin, haemoptysin, phthisin, hydropem, varia oculorum vitia, praecipue amaurosin. Senibus ex scabie, si ei vetustas accedit, saepe metuenda est hœtica et marasmus. Pessima est scabies, quae sub cute in brachiis et in dorso tubercula maiora habet, seu glandulas cutaneas tumefactas et cellulas tunicae adiposae, coacto humore plenas et dilatatas. Haec tubercula in iis frequentius nascuntur, quibus scabies externis fuit ante tempus cohibita.

§. 587.

Curatio accommodanda est et ipsi morbo, et aetati ac temperamento aegri. Raro opus est sanguinis missione, quae tamen salutaris immo necessaria esse potest in corpore admodum pleno. Initium curationis fiat remedio purgante, in scabie sicca benigniori. Si malum benignum et valde recens est, ex contagio ortum, id quandoque inter initia dato cathartico tollitur. Non vero tutum est morbum, si inueteravit, solis purgantibus curare. Metuenda enim sunt eadem mala, quae ab intempestivo externorum reprimentium usu nascuntur. Dari possunt in scabie humida Pilulae ex panchymagogo Crollii, Mercurio dulci, Diagrydio; vel Emulsiones ex Resina Ialappae cum aliquot granis Diagrydii. In scabie sicca meliora sunt decocta Tamarindorum, Rhabbari, foliorum Sennae, Mannae et Cassiae. Interdum tamen dari potest Mercurius dulcis cum Syrupode Cichoreo cum Rhabbaro, vel de Spina Ceruina, &c. Purgantia inter aliorum medicamentorum usum debent octavo vel decimo quoque die iterari.

§. 588.

Praemissis purgantibus, dari possunt decocta ex radice Chinae, Bardanae, Sarsaparillae, Scorzonerae, Cichorei, Glycyrrhizae, addito pauco ligno Sassafras. Plurimum proficit, si haec decocta, sed minus meraca, potui ministrantur. Meraciora ex iam dictis composita conveniunt in scabie humida. Sedulo tamen videndum est, ne iisdem et aliis medicamentis, praecipue in iunioribus et plenis, sanguis nimium cieatur, quae res inflammationem concitat, et scabiem multum exasperat. Igitur nisi morbus venerens sub scabie delitescat, alienum est Guaiacum cum aliis valentioribus; quae in corporibus siccis et scabie sicca exasperatis funestam tabem afferre possunt. Cum his decoctis etiam dari potest Essentia Fumariae, vel simplex, vel composita. Fumariae plures specificam virtutem tribuunt, nec non Tincturae Antimonii tartarizatae, cui addunt Essentiam Succini, atque in corporibus raris Essentiam Myrrhae. In scabie sicca vero, et in corporibus adstrictis omnia calida nocent. His proficiunt leniora decocta ex herba Melissae, Fumariae, Scolopendrii, Cuscutae. Immo nonnumquam magis proficiunt decocta radicis Althaeae, Cornu Cerui florum Sambuci, seminis Papaveris albi, Cydoniorum. Inprimis salutare est decoctum Fumariae cum Sero lactis, cuius quotidie libra j. ad ij capiat homo. In huius vero usu per inultum tempus perseverandum est. Etiam in scabie sicca et corporibus, quibus tabes imminere videtur, coquantur iuscula non gelatinosa, sed tenuiora, ex carnibus minime pinguibus, veluti pullis cohortalibus cum herba recenti Fumariae; extollunt plurimum iuscula Viperarum.

§. 589.

Postquam haec per aliquod tempus data fuerunt, recurrendum est ad specifica. Horis vespertinis dari possunt pulveres ex Antimonio diaphoretico, lapidibus Cancrorum praeparatis et floribus Sulphuris; dari possunt ad gr. iij - v. viij. pro dosi. Proficit etiam Aethiops mineralis eadem dosi dandus

dandus et per tempus iterandus. Si malum valde pertinax, et suspicio est, eis virus venereum esse admixtum, horis vespertinis dari possunt grana iij-v-viij Panacæacæ LEMERY, vel Mercurii dulcis rite præparati, ita tamen, vt alium non moueat. Quare hoc tertio quoque die circiter fiat. Specificam virtutem habet Regulus Antimonii medicinalis, qui ex Antimonio, cum Sale communi et Sale Tartari fuso, paratur, cuius grana iij-vj-viij. semel vel bis per diem terreis admixta dantur. In scabie humida proficit etiam Antimonium crudum, quod, in petia ligatum, adijcitur decoctis. Mercurius non eodem tempore, quo sulphur datur, convenit. In corporibus ficcis, tabidis, morboque diuturno et omnis fere generis vitiis, quæ in cute nascuntur, exasperatis confectisque, quandoque proficit diuturnior vsus lactis asinini. Cauendum est, ne temere illam scabiem vehementioribus curare velimus, quæ critica est, et qua alii supra dicti morbi interdum leuantur. Hæc per multum tempus tolerari debet. Vbi in aegro febris accedit, omittenda sunt illa specifica, præcipue Sulphur et Mercurius. In his vero exhibendis sedulo semper ad aegrum, eius habitum, ad ipsum morbum eiusque causam atque etiam perniciam, respiciendum est, quibus omnibus hæc remedia accommodanda sunt.

§. 590.

Tandem recurrendum est ad externa, quæ vero nunquam, nisi bene repurgatis humoribus, tuta sunt. Semper a mitioribus incipiendum est; sine noxa fere est vnguentum de Cerussa, quod alio nomine vnguentum album camphoratum dicitur. Efficacissimum, sed minus tutum reprimens, est sulphur viuum, cuius drachma vna vel altera priori compositioni potest adijci, si efficaciori opus est. Si malum valde refractarium est, adhiberi potest vnguentum Neapolitanum, cuius exigua portio illiniatur carpo. Nec minus salutaris et fere sine periculo est aqua phagedænica Chirurgorum. Cingula ab aliis parari solent vel cum vn-

guento Neapolitano, vel si cingula ex panno sciffa in mortario lapideo Mercurio imbuuntur, qui diu cum albo ouorum in alio mortario lapideo subactus fuit. In scabie vero sicca haec remedia non semper tuta sunt, maxime in senibus et tabidis. Saepe plus proficiunt balnea ex aqua cum lacte vel decocto furfuris, quae saepe iteranda sunt et diu adhibenda, et post diuturnum horum usum tandem ad benigniora mercurialia recurrendum est. Multum extollunt mucilaginem ex cortice medio arboris Tiliae, cum aqua communi vel aqua rosarum extractam, quam etiam, addita cera, in emplastrum vertere solent. Inter reprimentia minus tuta referri possunt Balnea ex scoriiis metallicis, tum venereis, tum martialibus, vel ex scoriiis, quae ex Cadmia in Smaltum fusa relinquuntur (*die Schlackenbäder*).

§. 591.

Si scabies citius, quam par est, vel purgantibus fuit male curata, vel externis repressa, et ex hoc mali morbi sequuntur, illa reuocanda est. Dari possunt decocta, quae supra laudauimus, et cum his per aliquot dies pauca grana Panacacae LEMERY, vel Mercurii dulcis. Ne fauces offendant Mercurius, is ad grana v. circiter excipitur Syrupo Fumariae, vel alio quodam, et in bolum vertitur, vel pulveres fieri possunt, additis terreis, qui crustulo (*Germ. Oblate*) comprehendendi atque sic deglutiri possunt. Videntum est, ne ptyalismus Mercurio concitetur, et regimen imperandum est aegro. Si ptyalismus imminere videtur, dandum est purgans. Si post horum usum scabies non reuertitur, dari debent Flores Sulphuris, horis potissimum vespertinis. Vbi febris superuenit, ab usu horum medicamentorum per tempus desistendum est. Omnibus morbis cutaneis reuocandis inferuiunt Balnea (*das Wolkensteiner- und Wiesenbad*), quorum balneorum effectus est, ut purpura scorbutica per totam cutim erumpat; quae balnea etiam in affectibus rheumaticis inueteratis multum proficiunt. Illud vero sedulo notandum est, nihil magis necessarium

sarium esse, quam diligentem victus et regiminis observationem. Alienus est cibus pinguis, mucilaginosus, crudus, ex leguminibus aliisque vegetabilibus. Vitandum est omne frigus; aër, si paludosus est et impurus, mutandus; vitandum est omne contagium, et frequentissime mutanda sunt lineae vestesque. Hac enim munditiæ neglecta, vix sperari potest curatio.



ELEPHANTIASIS ET LEPRO.

§. 592.

Morbi frequentiores fuerunt olim, quam nostra aetate, qui, postquam morbus venericus in Europam incescit, in nostris ad minimum terris fere evanuerunt. Est tamen differentia inter Leporam Graecorum et Arabum, de qua prolixè agit *Leonh. Fuchsivs in Paradoxis medicis Lib. II. Cap. XVI.* Graecorum Lepora fuisse videtur *Impetigo CELSI, Lib. V. Cap. 28. §. 17.* cuius hic quatuor genera recenset. Nihil aliud est, quam scabies ferina, ex qua quandoque ulcera fiunt, quibus etiam crustae et quasi furfures supernascuntur. Longe vero grauior morbus fuit Lepora Arabum, quam Graeci Elephantiasin appellarunt. Vide *CELSVM Lib. III. Cap. 25.* et *ARETAEVVM.* Durus hic morbus est. Aegri ab initio de alui pertinaci obstructione conqueruntur, fiunt tristes, pigri, somnus est multis insomniis turbatus. Cutis crebras maculas, ab initio rubicundas, mox lividas et nigras, tandem etiam crebros tumores habet. Ex his squamae decidunt, ab initio albae, lividae, tandem nigricantes. Exasperatur universum corpus, et plerumque prius facies tumoribus duris, scirrhis, varicosis, secat, qui tandem in foeda atque callosa ulcera degenerant, quae quandoque cum multa fanie, quandoque cum multa suppuratione sunt. His ulceribus

ossa etiam vitiantur. Tumores adeo increfcunt, vt etiam manuum pedumque digiti tandem sub tumoribus condantur. Summa cutis tandem fit arida, inaequaliter craffa, afperior, corio ficco fimilis, quae tandem omni fenfu deftituitur, vt in eam acum etiam fine dolore et fenfu demittere poffis. Pili defluunt, vox rauca eft, cum fibilo, anima intolerabilem foetorem fpirat, vrina cruda, iumentorum vrinae fimilis. Si fanguis mittitur, in eo corpuscula albicantia, fplendida, milii femini fimilia, natate dicuntur. Miferi coeco impetu in Venetum feruntur, quare etiam nonnulli hunc morbum Satyriafin vocarunt. Haec vero illius potius fymptoma eft. Tandem febris heftica et marcor diu exoptatam mortem affert.

§. 593.

Sedes morbi effe in lymphâ prorfus corrupta videtur. Contagiofus eft, viris frequentior quam foeminis. Dicunt, hanc lepram oriri ex fcorbuto, fcabie, morbo venereo, multa et incongrua medicatione corruptis, praecipue fi malus cibis ex carnibus fuillis, falfamentis, pifeibus et carnibus fumo induratis, nec non abufus aromatum aphrodisiacorumque accefferit. Conferunt obftructiones haemorrhoidum et menftruorum. Haecreditate etiam propagatur morbus.

§. 594.

Lepra Graecorum mitior non aliam curationem pofcit, quam fcabies, eam tamen longiorem. Lepra Arabum, feu Elephantiafis, vbi vetuftas acceffit, tolli nequit. Inter initia vero exiftimo, inprimis refpiciendum effe ad cauffas illosque morbos, ex quibus hoc vitium natum fuit et adoleuit. Danda funt valentiora emetica, ex Antimonij vitro et Sulphure Antimonij, quod vltimum ad gr. iij. iv. exhiberi potest. Cum his etiam purgantia ex Jalappa, Mercurio dulci, Agarico trochifcato. Non aliena effe poffunt infufa ex radice Bryoniae, Valerianae, Pimpinellae albae; herba Fumariae; ligno Saffafras, Mechoacanna, Agarico, foliis Sennae et fimilibus. His praemiffis diu perfeuerandum

dum est in usu decocti ex radice Bardanae, Chinae, ligno Sassafras, addito etiam Antimonio crudo. Mercurius imprimis prodesse poterit, si morbus venericus est. Si vero corpus valde calet, et illud macie extenuatur, eluendum est copiosioribus iusculis tenuioribus, vel sero lactis, ex quibus coquantur herbae antiscorbuticae: Fumaria, Trifolium fibrinum, Carduus benedictus, Nasturtiorum varia genera. Veteres plurimum tribuunt Viperis. Omnes aliae praeparationes nullius usus sunt; aliquando prodesse poterit decoctum Viperarum cum iusculo tenuiori. Cum his omnibus frequentiora adhibenda sunt enemata leniora et lubricantia, nec non balnea, quibus cutis mollitur. Ab initio balnea fiant ex decocto surfurum vel lacte. Vbi cutis mollita fuit, admisceri possunt herbae Fumariae, Saponariae, Agrimoniae, additis etiam foliis Peti. Ad cutim purgandam etiam conferunt illa supra dicta remedia contra Scabiem.



MORBI VENEREI EORVMQVE DIVERSI GRADVS ET SYMPTOMATA.

§. 595.

Drum hoc morbi genus ex contagio quodam specifico oriri solet, quod contagium ab initio mite, inueteratum vero adeo nocens fit, ut partes non solum fluidas corrumpat, sed solidas etiam et durissima ossa rodat et vorat. Illud corpori admotum (nam e longinquo non agit) primum leuem inflammationem excitat, partesque rodit. Dicunt nonnulli esse acidae naturae, et saniem veneream Syrupi violarum colorem mutare in rubicundum, id quod experimentis probandum erit. Nec hic de origine disputandum. Quamuis olim similes morbi in nonnullis observati fuerunt,

fuerunt, morbus tamen et frequentior et peior factus est, adlato ex America Seculo XV. contagio. Multum semper ad morbos exasperandos confert aër, victus aliaque. Sedes primaria esse videtur in humoribus lymphaticis, salina et similibus, nec non in oleo tunicae adiposae atque cellulosae.



GONORRHOEA IN VTROQVE SEXV.

§. 596.

Non ex alia causa, quam ex impuro coitu nascitur, si virulenta est. Ab immoderato tamen coitu aliquando levis inflammatio et humoris etiam effluuium, praecipue in foeminis, oriri potest, quod vero sponte finitur. Quibus gonorrhoea imminet, illi tertio, quarto, rarius octavo vel decimo die post impuram Venerem sentiunt pruritum quemdam in glande atque vrethra, quo etiam inter initia ad libidinem magis incenduntur, tandem pruritus mutatur in dolorem, qui mingendo exasperatur, ita ut stranguria oriatur et frequens mingendi cupiditas. Vexantur aegri priapismo, profluit tandem ex vrethra, et in foeminis, quae etiam tintiginem sentiunt, ex vagina humor ab initio paucus, glutinosus, albicans, mox vero cinereus atque ex flauo viridescens. In viris facilis diagnosi est, in foeminis, praecipue si veritatem confiteri nolunt, longe difficilior, quum in multis conueniat cum fluore albo. Supra tamen exposita fuit differentia.

§. 597.

Sedes huius morbi varia esse solet. In foeminis affectae sunt illae glandulae, quae ad latera orificii externi posita sunt, et lacunas seu foramina habent. Vid. illarum glandularum descriptionem in *WINSLOW Tr. du bas Ventre*

Ventre §. 628. Laborant etiam prae ceteris illae glandulae, quae copiosiores exitus habent circa meatum urinarium, nec minus etiam glandulae per totam vaginam vteri. Addunt nonnulli adhuc in foeminis glandulas *COWPERI* iuxta anum sitas. Vid. *ASTRUC Tom. I. p. 247.* In viris autem aliquando, rarius tamen, virus haerere videtur in glandulis, substantia spongiae adsimili, et in illis minoribus glandulis, quae in corona conspiciuntur. In hac ultima virorum gonorrhoea nihil effluit ex vrethra, humor vero acris, purulentus, rodens quandoque copiosus reperitur inter glandem et praeputium. Vid. inter alios *Hist. Acad. Reg. Scientiarum 1729. p. 16.* Hanc gonorrhoeam nonnulli spuriam vocant. Alia sedes est, quam *COCKBOURNIUS* unicam esse credidit, in illis copiosioribus lacunis, quae in vrethra reperiuntur et a *MORGAGNIO* accuratius descriptae sunt. Ex his enim naturaliter humor exsudat, quo vrethra lubricatur, qui humor hoc vitium contrahit. Aliquando etiam virus haeret in glandulis *COWPERI* et aliis a *LITTRE* in *Hist. Acad. Reg. Scient. 1700.* descriptis. Hanc gonorrhoeam observationibus probavit et descripsit *LITTRE* in *Commentar. Acad. Reg. Scient. 1711. p. 262.* In his gonorrhoeae generibus paucus humor effertur, et glandulae *COWPERI*, in perinaeo iuxta musculos transversos sitae, inprimis dolent. Frequentissima vero sedes est in prostata et in vesiculis feminalibus, quorum ductus excretorii iuxta sic dictum Verumontanum exitum habent. Haec gonorrhoea cognoscitur ex copiosioris spissiorisque humoris profluvio. Saepe tamen non una pars, sed plures laborant, quare malum etiam intenditur. Est aliud gonorrhoeae genus, quod siccum dicitur, in quo dysuria, stranguria, dolor cum inflammationis signis vehementer vexant aegrum, ubi tamen vel nullus, vel paucus humor exit. Hoc genus a remediorum calidorum et adstringentium abusu ex aliis huius morbi generibus nascitur, et nonnumquam inflammatione et abscessu perinaei finitur.

§. 598.

Per quam viam virus ad haec loca perueniat, num per cauernosam glandis substantiam, quae ex cauernoso corpore vrethrae nascitur, num per ipsam vrethram, Auctores non consentiunt. Quidquid horum sit, virus illud rodens prius inflammationem excitat, a qua fere omnia symptomata nascuntur. Vrina enim, quae super partes crassas inflammatasque fertur, illum acerbiores dolorem adfert. Dolo-
re adducuntur et crispantur fibrae illius membranae, qua intus contegitur vrethra cum omnibus vicinis partibus. Hinc per consensum male afficitur sphincter vesicae, qui quasi conuellitur, ita, vt stranguria nascatur et crebrior mingendi cupiditas. Inflammatione aucta, et intensis illis fibris nerveis, comprimuntur vasa sanguifera, quae si rumpuntur, id quod in corporibus debilioribus facile accidit, multum sanguinis per vrethram effunditur. Hac inflammatione illo-
que sensu etiam irritantur muscoli erectores, hinc stimulus ad Venerem et molestus priapismus. Ex eadem causa, inflammata videlicet interiori tunica, membrum, agentibus erectores, cum acerbissimo dolore incuruatur. Tandem etiam propter inflammationem, maxime si illa calidis medicamentis exasperata fuit, praeccluduntur illi ductus excretorii, virulentus humor coërcetur, qui vasis lymphaticis absorbetur, fertur ad glandulas inguinales, in quibus bubones fiunt; vel diffunditur in vniuersum corpus, maxime vero in tonsillas et glandulas saliuales, et nascuntur vlcera faucium. Non raro etiam ille humor corruptus fertur in vasa deferentia, et intumescit cum inflammatione testiculus.

§. 599.

Gonorrhoea maligna in iuvene, si nullum aliud vitium in aliis humidis est, et si venerea lues haec corruptit, et si regimen obseruatur, sine magno negotio curari potest, citius, quam gonorrhoea benigna. Haec si inueterauit, et praecipue si illa ex nimia laxitate vesicularum feminalium, et, qui ex his educuntur, ductuum excretoriorum orta est,

non-

nonnumquam funestam tabem, in aliis epilepticos motus, aliaque grauissima mala afferre potest. Ceteroquin gonorrhoea sibi relicta, nisi cohibeatur, non facile lueni infert, et homines diu ea laborant sine alia noxa. Magnum autem discrimen est, pro diuersis sedibus, quae laborant, et si inflammatio, quae accedit, mitior vehementiorque est. Si materia, quae effertur, albida et spissiuscula sit, reliqua vero symptomata se remittunt, morbus mutatur in melius. Etiam spes est, si in vrina flocculi spissiores, albidī, veluti ramenta, natant. In foeminis tolerabilior est, et facilius curatur, quam in viris. In viris ex gonorrhoea, tanto magis male curata, saepe relinquuntur carunculae, de quibus supra dictum est.

§. 600.

In Curatione et tempora et corpora sedulo distinguenda sunt. Inter prima initia, post susceptum contagium, aliquantum proficere possunt emollientia extrinsecus glandi admota, balnea ex aqua fluuiatili, ex decocto emolliente, vel epithemata ex radice Althaeae et floribus Chamomillae ex lacte cocta. Haec decocta etiam mediante siphone in vrethram dari possunt. Haec auxilia sola necessaria sunt in illa gonorrhoea, quam spuriam vel aridam vocant, quam supra descripsi. Si vero morbus iam adoleuit, et aeger dolores sentit, et si iam facta est inflammatio, confert exhibere laxans antiphlogisticum, ex decocto Tamarindorū, Mannae, Cremoris Tartari, Cassiae. Alius semper aperta et lubrica seruanda est enemate. Danda est aegro ptisana diluens, ex radice Althaeae, Scorzonerae, Cithorei, foliis Lactucae, Parietariae: vel quae meliores sunt, dilutiores emulsiones ex seminibus frigidis, semine Papaueris, Amygdalis excorticatis, addito Nitro et absorbentibus. Optimum in hoc casu est Nitrum, quo saepe totus morbus tollitur. Si ingrauescit morbus, et cum hoc inflammatio, recurrendum est ad alia auxilia. Sanguis mittendus, praecipue plethoricis, alius ducenda lotionibus emollientibus, haud calidis,

calidis, addito Nitro. Extrinsecus imponenda sunt epithemata ex emollientibus. Demittendus est aeger in balneum emolliens.

§. 601.

Vbi vero deferbuit inflammatio, et purulenta materia copiosior sine dolore effertur, danda sunt laxantia paullo efficaciora in phlegmaticis, ex Mercurio dulci, Extracto panchymagogo, Pilulis de Sucoino Cratonis et similibus. Haec laxantia quinto sextoque die iterari debent. Cum his vero exhibenda sunt decocta ex radice Sarsaparillae, Chinae, Bardanae, Pimpinellae, Ligno Sancto, Sassafras. Si horum usu dolor non augetur, sed imminuitur, in his solis perseverandum est. Si vero corpus phlegmaticum est, ad efficaciora pergendum. Vlcus efficacius abstergunt Tinctura Antimonii, Essentia Pimpinellae. De his omnibus remediis vero sedulo notandum, ea accommodari debere ad aegri naturam. Si enim, praecipue in cholericis et haemorrhoidariis, nec non in iunioribus, his acrioribus et vehementioribus utamur, alia mala, nouae inflammationes, dysuria, stranguria, haemorrhoides coecae, abscessus et fistulae in perinaeo concitantur. Tunc proficiunt mitiora laxantia ex foliis Sennae, Cremore Tartari, Manna et similibus. Prodest etiam decoctum ex Sarsaparilla, China, Scorzonera, cui etiam folia Sennae adiciuntur. Cum his omnibus necessarium est, ut aeger cibo utatur pauco, ex materia imbecilla, et potione dilutissima, ex aqua vel ptisana, ut abstineat ab omnibus cogitationibus venereis, decubitu supino, in victu ab omnibus acris, fermentescentibus, salis, dyspeptis. Si morbus valde refractarius est, adhiberi possunt Mercurialia. Datur Panacea LEMERT ad scrupulum dimidium pro dosi, quae commode confertur Rosarum pallidarum et Syrupi earundem, vel florum Persicorum excipitur et in bolum vertitur. Datur eiusmodi bolus tertio quoque die cum illis remediis sanguinem purgantibus, ex quibus aliis praeferri debent decocta. Nec
alienum

alienum est Vnguentum Neapolitanum, si pauca quantitas Mercurii, ad drachmam j. vel ij. circiter, extrinsecus partitis vicibus perinaeo illinitur. Necessarium vero est, vt eo tempore, quo Mercurius adhibitus fuit, aeger vitet omne frigus, et vt semper, ne ptyalismus oriatur, post frictionem sumat laxantia, ex quorum numero illa apozemata reliquis praeferenda sunt. Quamdiu extrinsecus adhibetur Mercurius in vnguento, non facile mutanda sunt lintea. Raro vel numquam gonorrhoea concitato per Mercurium ptyalismo curatur.

§. 602.

Si tandem ex vsu horum remediorum corruptus humor, ex vrethra efferri solitus, benignior videtur, et magis albicans, adhibenda sunt remedia, quae hoc profluuium pedetentim cohibent. Hoc efficiunt Balsama: Balsamum Peruuianum, de Copaiua, nec non Terebinthina. Balsama admisceri possunt illis Essentiis et Tincturis. Balsama haec commode etiam excipiuntur vitello oui forbilis, et cum eo deglutuntur. Tandem efficacius cohibet Terebinthina. Plurimum ad cohibendam gonorrhoeam etiam valet os Sepiae praeparatum. Sedulo autem videndum, ne his vtamur, si vlcus nondum purgatum est, tanto magis, si corpus impurum fuerit. Nec etiam ad horum remediorum vsum nimis properandum est.

§. 603.

Multum tribuunt lotionibus in vrethram immixtis, quarum variae apud Auctores reperiuntur compositiones. Omnes minorem efficaciam habent, nisi partes iam atonia laborant. Nec tamen his, quibus etiam profluuium coercetur, temere vtendum est.

§. 604.

Nonnumquam ex gonorrhoea, praecipue male curata, sanguinis profluuium oritur saepe periculosum. Causam supra adduxi. Adhibenda sunt omnia auxilia, quae ad haemorrh.

morrhagiam sistendam necessaria sunt, enemata emollientia; frigida, lintea frigida madentia, quae perinaeo et mentulae imponuntur. Dentur emulsiones cum semine Papaveris, Nitro et Crytallo montana praeparata. Vrgente malo sanguis ex brachio mittendus. Vinctura sunt constringendi digiti manuum; prae ceteris omnibus necessaria est quies et abstinencia. Si gonorrhoea citius suppressa fuit, illa recenti re iterum potest reuocari. Est tamen differentia. Si post suppressionem inflammatio mota est, quam ex signis facile cognoscimus, et ex qua plerumque vel bubo, vel tumor testiculi metuendus est, adhibendum est solum Nitrum cum temperantibus, quae admisceri possunt emulsiōi ex semine Papaveris. Si vero adstringentia et Saturnina adhibita fuerunt, et nulla accessit inflammatio, proficit Balsamum Peruvianum vitello oui solutum, vel emulsionibus admixtum. In eo casu, ubi nulla inflammatio adest, licet etiam experiri Tincturam Antimonii acrem, praemisso laxante cum Mercurio dulci. Equitatio reuocare potest gonorrhoeam, qua abstinere debent, qui hoc morbo praecipue cum inflammatione laborant.

§. 605.

Gonorrhoeam benignam vocant, quando praeter voluptatem humor non acris, sed blandus ex genitalibus utriusque sexus excernitur. Plerumque relinquitur a gonorrhoea diuturna vel frequenti, aliquando etiam a Veneris praematureo nimioque usu. Est tamen differentia. Nonnullis perpetuum stillicidium est, et maribus glans semper humore viscido madet. Aliis vero accedit, ut leui aliqua pressione vel commotione facta, dum aluum vel lotium exprimunt, vel dum muscoli erectores agunt, verum semen inuitis exprimatur sine voluptate. In prioribus plerumque ductus excretorii in vrethram aperti ampliati sunt; in posterioribus vero infirmatae sunt illae membranae, ipsi etiam, ut videtur, muscoli relaxati, quibus ceteroquin semen in vesiculis suis continetur, et tempore coitus exprimitur.

mitur. Haec atonia oriri videtur a nimis frequenti tentigine, quae vel ex voluntate, vel ex morbis dictis venereis, et, quae his accedere solet, inflammatione profecta fuit. Ex hac enim intentione crebriori nascitur laxitas et atonia. In foeminis morbus hic non facile dignoscitur, refertur plerumque ad fluorem album, cuius frequentior causa etiam nimia impuraque Venus esse solet. Vterque morbus pertinax est et difficiliter sanescit, praecipue in senibus. Saepe finitur in senibus marcore et tabe, in iunioribus summa corporis et viscerum imbecillitate, vertigine, epilepsia. Vid. HOFFMANNI Dissert. de *Morbis ex nimio Veneris usu*.

§. 606.

In curandis his morbis minime festinari oportet, quia saepe in his corporibus simul acrimonia quaedam delitescit, vel ex aliis causis, vel ex morbo venereo relicta. Haec ante omnia expugnanda est congruis auxiliis, victu et medicamentis. Dari possunt noduli laxantes, ex radice Vincetoxici, Cichorei, Rhabarbaro, foliis Sennae, Passulis, Cremore Tartari, quae infusa aluum subducentia per aliquot dies potari possunt. Fiunt commodè ex aequis portionibus Vini et aquae. Interposito aliquo tempore, si nihil est, quod impediatur, corpus eluendum est aquis mineralibus. Egregie proficiunt Pyrmontanae, quibus sub finem etiam lac admisceri potest. Debilioribus conducunt Selteranae cum lacte asinino vel alio, diu potandae. Nec alienum est, si lacti admisceas decoctum Millefolii, Agrimoniae, Salviae, Melissaе, Malicorii. Etiam ferrum ignitum in sero lactis extinguere potest, serumque quotidie potari. Experientia compertum est, nonnullis profuisse Thermas Carolinas, quae vero, si malum valde inueteratum, et aeger iam imbecillior factus est, hominem praecipitare possunt. His auxiliis diu multumque adhibitis, et repurgatis, ut decet, humidis, adhibenda sunt roborantia. Sunt vero haec, praeter dicta balsama, cum vitello oui soluenda, Corallia, Succinum, Os Sepiae praeparatum. Melius conducunt

Bb

rebo-

roborantia ex Cydonio, miua Cydoniorum; Confectio Strobilorum Pini, cuius aeger quotidie ad drachmas ij. circiter sumat. Sunt, qui extollunt compositionem QVERCETANI. Etiam adhiberi possunt Liquores, qui in vrethram dantur, quibus tantillum Sacchari Saturni admisceri potest. Perinaeo admoueantur epithemata, non nimis calida, ex radice Bistortae, Tormentillae, herba Menthae crispae, Salviae, Pulegii, Alchimillae, Rorismarini, foliis Lauri, baccis Lauri, quae ex vino rubro coqui possunt. Superhaberi etiam potest emplastrum neruinum, oleo quodam stillatitio conspergendum. Etiam profunt balnea frigida. Omnia vero saepe frustra adhibentur, nisi aeger sollicite vitet omnia acria, quae sanguinem mouere vel etiam Venerem incendere possunt. Vita enim debilis fere optima est. Nocet imprimis equitatio. In foeminis saepe, frustra sumtis omnibus, profecerunt Thermae Toeplicenses.



LVES VENEREA.

§. 607.

Nascitur ex contagio, et plerumque ex gonorrhoea, vlc-
 ribus, bubonibus, si negliguntur vel male curantur. Praecipue vitium hoc, quo omnia corporis humida corrup-
 puntur, metuendum est iis, qui vlceribus illis sic dictis
 canerosis laborantes, haec, sine adhibitis internis sanguinem
 purgantibus, siccant glutinantque. Aliquando oritur a
 contagio partium externarum per oscula et saliuam, vel si
 homines sub iisdem stragulis decumbunt. Morbum contra-
 hit infans ex vitiato lacte; infans vero a parentibus genitus,
 qui hoc morbo laborant, morbum affere potest nutrici.
 Plerumque illae partes primum afficiuntur exulceranturque,
 quae impuro humore primum contaminatae fuerunt. Con-
 tagium tamen haud ex longinquo, nec per atmosphaeram,
 veluti

veluti in febribus malignis, nocet. Morbus per contagium partium externarum ortus ab initio longe facilius tollitur, quam qui ex humoribus vitiatis per genitalia susceptus fuit.

§. 608.

Symptomata huius morbi varia et fere infinita sunt.

Ab initio aegrorum animos incescit grauis moestitia, quae non ex solo pudore et metu, sed, ut videtur, ex lentore tenuiorum humorum lymphaticorum oritur. Qui vero hoc morbo per vniuersum corpus eiusque tenuiora humida diffuso laborant, sentiunt dolorem ab initio fere rheumaticum, post osteocopum, seu quo, ut describunt, interiora ossium quasi telo quodam acuto terebrantur. Hic dolor, si in interioribus ossium est, plerumque proficiscitur ab obstructione in utroque perioestio, interno externoque. In hoc enim a lymphâ, tum viscida, tum acri, mouetur inflammatio, ex qua tandem, facta suppuratione atque exulceratione, nascitur caries. Nonnumquam etiam perioestium afficitur, intenditurque ab intumescente osse, praecipue si tumor breui tempore multum increfcit. Pessimum est, si doloris causa haeret in vitiata medulla inflammatoque vel vitiato et eroso perioestio interno. Dolores hi distinguendi sunt ab aliis rheumaticis, arthriticis et ischiadicis doloribus. Rheumatici dolores sedem habent in membranis ipsisque musculis; arthritici in ligamentis ossium, praecipue articulorum; scorbutici in ipsis articulis et horum ligamentis capsularibus, quorum humor seu axungia vitium contraxit. Morbi venerei autem ipsa ossa, eaque duriora, et plerumque mediam eorum partem infestant. Venerei noctu et stragulorum calore multum exasperantur, quod signum pathognomonicum esse solet. Venereis etiam similis accedit cephalalgia, quae quoque lectuli calore intenditur.

§. 609.

Tandem vero his omnibus alia accedunt. In cutemaculae erumpunt rubicundae, purpureae seu ephelides

Bb 2

et

et lentigines, scabies, lichenes, ex quibus squamulae decidunt. Praecipue autem in fronte et capitis parte capillis obsita, fiunt vlcuscula, quibus inhacret crusta pinguior, flauescens, quae, si aufertur, mox renascitur. Vorant haec vlcera in latum et profundum, et nisi medela adferatur, in capite ad pericranium vsque penetrant. Labra finduntur, et in his etiam vlcuscula fiunt. Si morbus ingruvescit, oritur *αλωπεκία* seu pilorum defluuium. In genitalibus mala vlcera fiunt, quae serpunt, ita, vt pustulis pus fundentibus omnia exasperentur. Saepe etiam id, quod sanum videbatur, iterum exulceratur. Nascuntur etiam in his partibus verrucae, sic dicti porri, in ano fici et mariscae, condylomata seu tumores duri cartilaginosi, abscessus, fistulae, quae saepe, in perinaco ortae, sinuosae fiunt, et intra intestinum rectum desinunt. Fauces exulcerantur, et oriuntur vlcera impura cacoëthea, quae tonsillas, penetrandoque ipsum ad perioestium, vorant. Inter haec dentes labant caduntque. In capite et aliis etiam sedibus membrisque oriuntur gummata, topi, nodique, qui acerbissimum dolorem in perioestio intento mouent; tandem hi tumores maturescunt, aperiuntur, atque sub finem ad ipsa ossa, exeso corruptoque perioestio, penetrant, vt ossa cariōsa fiant. In ossibus non solum caries, sed etiam tumor seu maligna exostosis nasci solet. Aliquando ossa tota in ambitu suo intumescunt, quem tumorem Hyperostosin nonnulli adpellant. Sub finem, nisi auxilia adhibeantur, corruptis omnibus humidis, homines tabidi fiunt percuntque.

§. 610.

Saepe hic morbus confunditur cum Scorbuto. Differunt ortu. Verus Scorbutus nascitur ex malo victu et regimine, maxime si nautici homines, crudo salsoque victu vtentes, se atmosphaerae frigidae grauique per multum tempus exponunt atque expirationem cohibent. Etiam oritur ex moerore et insueti vitae genere, impura aqua, defectu exercitationis, &c. Morbus venereus non nisi ex

con-

contagio. Et Scorbuto contagium est, longe tamen segnius, quam morbo venereo. Nam illud vix alia ratione, quam per os et salivam propagatur. Verus scorbutus in terris septentrionalibus endemius est, et inter nauticos homines frequentior. In scorbuto laborant prae ceteris partibus gingivae. In morbo venereo tonsillae aliaeque glandulae. Scorbuticorum ulcera sunt cum magno aestu et pruritu, accedente gangraena et putredine, magis etiam in latum diffusa. Venereorum ulcera sunt profundiora, lenta, et in quibus humor est glutinosus, subpallidus, crassitudinem mellis aut visci referens. Non nisi valde confirmatus scorbutus periosteum exedit, et ossibus vitium adfert. Nec haec facile a solo veroque scorbuto intumescunt. In scorbuto magis afficiuntur carnes, quam glandulae; in morbo venereo hae prae ceteris. Dolor artuum in scorbuticis articulos, in venereis mediam artuum partem prae ceteris occupat. Priorum dolores non ita vehementes sunt, nec adeo calore exasperantur. Vtriusque vero morbi causae manifestae sunt.

§. 611.

Morbus venereus ipse plurimum differt pro diverso contagio, morbi vetustate, symptomatum vehementia, et ipsis partibus, quae laborant. Is multum exasperatur, si alii morbi accedunt, veluti Rhachitis, Scorbutus, Arthritis, Malum hypochondriacum. Facilius tollitur morbus, quamdiu adhuc in fluidis haeret. Vbi vero partes solidae, praecipue interna viscera vel ossa vitata sunt, malum difficilius tollitur, et non raro nullam curationem admittit, praecipue si ad ossum vitia manus Chirurgi admoueri nequit. Peior longe est vera et venerea exostosis, quam caries, quae ab inflammato corruptoque per eundem morbum periosteo ortum coepit. Difficillimus morbus est, qui recruduit, vel olim sopitus nouo contagio auctus fuit, maxime si vario mercurialium usu fuit tentatus. Si viscus vitio laborat, sequitur tabes et hœtica venerea, tandem funesta. Ceteris

Bb 3

paribus

paribus celerius et melius sanescunt foeminae, quibus catamenia fluunt, quam aliae, quibus illa non proueniunt, etiam hae facilius, quam viri. In hoc morbo fere nihil a naturae efficacia, quae in aliis morbis curandis maxima est, sperari potest.

§. 612.

Medendi ratio varia est, de qua etiam magnum dissensum inuenimus inter Auctores. Semper videndum, ut minori malo leniora auxilia et tolerabiliora, vehementi vero efficaciora adhibeantur. Reuocari possunt hae medendi rationes ad usum decoctorum aliorumque liquorum, qui aduersus hunc morbum, adhibita etiam sudatione, dari solent, et ad Mercurii usum, qui extrinsecus optime per vnguenta admouetur, ab aliis per suffitiones, vel etiam intus datur in variis arte chymica praeparatis. Praeterea Mercurius vel ita datur, ut excitetur atque per plures dies continuetur ptyalismus, vel, id quod aliis in more est, salivae profusum, quod imminet, datis catharticis iterum auertitur. De singulis seorsum.

§. 613.

Decocta sic dicta antiuenerica proficiunt in corporibus raris et obesis, si morbus adhuc in humidis haeret, et si non omne corpus, sed partes quaedam, veluti glandulae salivales, laborant. Valde autem nocere possunt meraciora decocta corporibus adstrictis, emaciatis, et quibus tabes imminere videtur, praecipue iis, quae iam pulmones ex aliis causis affectos, tuberculis ac scirrhis plenos, habent. Decocta parantur ex radice Sassa-parillae, Chinae, Bardanae, Pimpinellae albae, ligno Sassafras, Iunipero et, quod ceteris efficacius est, Guaiaco. Haec decocta ab initio dilutiora, mox meraciora potanda sunt. Hisce non solum praemitti, sed cum his interpositis vicibus aliquoties dari debent cathartica, ex Extracto panchymagogo, Pilulis de Succino Cratonis, Mercurio dulci, Resina Jalappae, Agarico

rico trochiscato et similibus. Cum decoctis dari possunt Essentia Pimpinellae albae, Succini, Myrrhae, prae aliis vero Tinctura Antimonii, ex qua, si lignis radicibusque modo commemoratis affunditur, parantur Tincturae antiuenerae. Si per tempus, adhibito simul idoneo victu, aeger decocta potauit, id quod commode horis matutinis in lectulo fieri potest, is, sumto decocto meraciori, sudare potest in laconico, accenso spiritu ardente, Germ. (*Schwitzkasten*); vel excitato vapore ex ipso meraciori decocto Ligni Guaiaci. Post quotidianam sudationem, quae pro viribus aegrotantis ad horas circiter tringinta vel quadraginta protrahenda, et in qua per plures dies perseverandum est, aeger debet se per tempus in lectulo continere, ex conclauis vero numquam egredi, quum frigida aura corpori admissa plurimum nocere possit. Adici etiam potest decoctis Antimonium crudum in petia ligatum ad vnciam vnā pro mensura. Id vero nonnullis nauseam vomitumque mouet. In victu vitanda sunt omnia iurulenta, quae nocentissima sunt, falsa, pingua, acria, acida. Potioni praestandum est vel decoctum secundarium illarum radicum et lignorum, vel aliud ex his compositum et palato magis accommodatum. Si fieri potest, aeger vescatur pane bis cocto et carnibus assis, non vero mucidis, quales sunt suillae, anaticae, anserinae, quae alienae et nocentissimae sunt. Ceteris praestantiores sunt carnes ferarum. Vinum alienum; vinum vero ardens pestilentissimum est. Semper cura habenda est, vt alius respondeat, quae ducenda est lotionibus. Cum decocto aeger vesci poterit uis Corinthiacis. Finita curatione aeger pedetentim ad pristinam viuendi rationem reuertatur.

§. 614.

Mercurio aduersus hunc morbum singularis et specifica virtus est. Vt videtur, agit summa sua mobilitate et pondere minimarum particularum, quibus lymphae itinera praclusa aperiantur, lentique humores attenuantur, ac in serum

Bb 4

con-

conuertuntur. Non vero tollit obstructionem in maioribus vasis, veluti in scirrho. Nec ossium morbis semper medetur, nec gonorrhoeae. Adhiberi debet ad minimum sub hoc nostro Septentrionali coelo magna diligentia, ne is, in corpore debili relictus, maiora mala pariat. Eius vsus varius est. Vel enim intus dantur varii generis praeparata, ex quibus ceteris praestantior est Mercurius dulcis, et, quae ab hoc parum differt, Panacaea LEMERY, vel is extrinsecus admouetur corpori; optime in vnguento, ab aliis per suffitus, emplastra, cingula. His omnibus vel ptyalismus concitatur, vel etiam, illo impedito, Mercurius per aluum educitur. Magna controuersia est, quatenam methodus praestantior? In maiori malo ceteris omnibus efficacior visa est medendi ratio per ptyalismum, illito vnguento Neapolitano concitatum.

§. 615.

Si itaque curationem per ptyalismum adhibere velis, corpus magna diligentia adhibita praeparandum est. Sanguis mittendus, praecipue si id corporis habitus postulat. Ante et post Venaesectionem aluus ducenda est admixto aliis catharticis Mercurio dulci. Post per decem vel duodecim circiter dies aeger bis per diem et per horae tempus demittatur in balneum ex aqua fluuiatili, quae balnea maxime necessaria sunt siccis et adstrictis corporibus. Aeger etiam victu tenui vtatur durante balneo, pane candido, brodiis tenuioribus, carnibus iuniorum animalium assatis, et concedi potest pauxillum vini. Nec alienus est panis bis coctus cum passulis. Nocent dyspepta, acida, falsa, pinguis, aromata. Potioni praestanda est ptisana, non ex meracioribus, sed ex hordeo, radice Graminis, Saffaparillae, Glycyrrhizae. Finitis balneis, aluus iterum ducatur. Tandem praeparandum est vnguentum. Mercurius adhiberi solet, qui ex Cinnabari obtinetur, si haec cum Limatura Martis puro igne vrgetur, vel adhibetur Mercurius saepe per corium transmissus. Adhibenda est suilla axungia recens,

cens, ab omni bus membranis studiose liberata, nec igne liquata, nec falsa, nec rancida. Sumi possunt pares portiones Mercurii et axungiae. Frequentius vna portio Mercurii admiscetur duabus axungiae. Subigitur Mercurius vel salina hominis ieiuni, vel dum paucae guttulae Terebinthinae prius Mercurio adiciuntur, et cum hoc diu teruntur. In tota curatione ratio habenda est non tam vnguenti, quam Mercurii.

§. 616.

Huius vnguenti adhibetur primo die tantum, quantum drachmam dimidiam Mercurii continet. Nec facile ultra drachmam j. vel vnam et dimidiam, Mercurii ascendendum est. Etiam vnguentum iterum diuidendum pro utroque latere et variis, quae inungendae sunt, partibus; nec non si portio Mercurii bis per diem, horis matutinis et vespertinis adhiberi debet. Vnctio fiat coram igne, deterfa prius cute, et si fieri potest manu Chirurgi, vel si hic Mercurium metuit, ipsius aegri. Pars diu perfricanda est ad rubedinem. Primo die inungantur plantae pedum, vel locus, vbi articulus astragali cum tibia est; altero die praeter has et genua; tertio die inguina et nates. Sunt, qui etiam ad carpum et brachia ascendunt. Post frictionem, quae semper horis matutinis et vespertinis, post peractam concoctionem, administranda est, quiescat aeger in lectulo, stragulis bene, non tamen ad sudorem vsque, coopertus. Sic continuandum est, donec aeger exspuat per nyctimeron circiter libram vnam feri; tunc enim intermittenda est fricatio et Mercurii vsus. Vbi vero sputum iterum immittitur, iterum Mercurius admoneri debet, donec aeger per nyctimeron exspuat libras circiter tres. Periculosum est, si plus salinae exspuitur. Ptyalismus continuari debet vsque ad tricesimum circiter diem, et si ante hunc deficere videtur sputum, iterum admonendus est Mercurius, vel dandus Mercurius dulcis. Magna est differentia. Plures enim adhibito paucio Mercurio spuunt, alii vero maiori dosi opus

Bb 5

habent.

habent. Plerumque sufficit vncia vna, ad summum duae. Fuerunt, qui nec tribus vnciis commoti fuerunt. Durante ptyalismo victus sit tenuis, tenue iusculum, interdum ouum sorbile. Plures lac dare solent, et polentum vel oryzam cum lacte decoctam. Vacillant dentes et aeger masticare nequit. Lintea numquam mutanda sunt, nec stragula. Temperatus calor in conclavi seruandus. Potioni praestanda est ptisana lenior, non vero meracior. Nec serum lactis, quod aegris gratum est, alienum fuit. Si aluus non respondet, ea lenioribus lotionibus ducatur.

§. 617.

Peracto illo tempore, bonum est, si ptyalismus pedetentim imminuitur. Prouide mutanda sunt lintea, et in victu adhuc persistendum est, datis tamen paullo valentioribus iusculis cum Cremore hordei, auena, oryza, et aliis. Si nimius est ptyalismus, aluus duci potest sub finem Apozemate ex foliis Sennae, Rhabarbaro, Manna. Proficit etiam, si aegro per plures dies Decocta antiuenerica paullo meraciora propinantur. Pedetentim etiam is se aëri committat, et ad pristinam viuendi rationem reuertatur. Plurimum nocere solet fames, qua aegri, post has curationes excitati, se multum implere solent.

§. 618.

Varia incidere possunt in hac curatione. Nonnumquam oritur suffocationis periculum, caput intumescit, impedita est omnis respiratio et deglutitio. Oritur vel a refrigerio, maxime potu frigido, vel a nimio Mercurio, praecipue, si aeger olim iam medicamentis ex Mercurio praeparatis fuit tentatus. Festinandum est in curatione. Protinus caput et collum linteis calidis inuoluendum est. Si a nimio Mercurio malum ortum fuit, mutanda sunt lintea, et linteis detergenda est cutis, cui illitum fuit vnguentum. In aluum immittenda est lotio ex foliis Sennae ad drachm. ij. vel

vel iij. additis emollientibus. Stimulus adiici potest ex Electuario de Hiera picra ad vnciam circiter dimidiam. Etiam aliud duci potest cum Apozemate ex foliis Sennae. Si malum valde vrget, sanguis mittatur ex talo. Regimen sit tale, vt diaphnoë adaugeatur. Nonnumquam tormina cum diarrhoea, immo deiectionibus cruentis oriuntur. Hoc incidere potest, si corpus ante curationem non recte fuit praeparatum, id quod purgantibus et balneis fieri supra diximus, vel si aeger victu pleniore vinoque vsus est, vel ex refrigerio. Frequentior autem causa est, si aeger salinam deglutit. Quare semper sub somno is pronus iacere debet, vt sputum ex ore effluere possit. Etiam antequam aliquid deglutire vult, debet semper os prius eluere, vel calida, vel gargarismo emolliente. Aduersus hoc symptoma clyσμα ex lacte pingui, addito pauco Croco, vitello oui, oleo Amygdalarum dulcium recenti vel Liliorum alborum, in aluum immittendum est. Aeger deglutiat oleum Amygdalarum recens sine igne expressum, et si symptomata non leuantur, dandum est Diascordium Fracastorii ad scrup. j. vel drachmam dimidiam pro dosi, quae dosi etiam, si illud res postulat, altera vel tertia vice repeti potest. Abdomini imponatur tegula calida, et si symptomata vehementiora sunt, mutari etiam possunt lintea, id quod tamen provide fieri debet. Vbi deiectiones conquieuerunt, dandum est Rhabarbarum in puluere, ad exturbandas fordes in intestinis relictas. Vix attinet dicere, eo tempore, quo haec et alia symptomata ingruunt, abstinendum esse ab omni vsu Mercurii, ad quem, postquam illa symptomata conquieuerunt, reuertendum est. Hoc etiam faciendum est, si durante hac curatione foeminis menstrua proueniunt. Ibi enim quiescendum est, sed idem regimen seruandum. Si menstrua copiosiora fluunt, eo tempore dari debent iuscula paullo meraciora cum oryza.

§. 619.

Plurimum vexantur aegri oris vlceribus, quare aeger frequentius debet os eluere decocto Altheae, florum Verbasci, Chamomillae, Sambuci. Etiam non alienae sunt mucilagines Psyllii et Cydoniorum. Nocentissima sunt omnia adstringentia in gargarismis. Vlcera haec saepe oriuntur ex frigidiore aëre, ori admixta, ex potu frigido, ex nimio Mercurii usu. Vbi vlcera vehementiora fiunt, et dolorem inferunt, illi decocto vel gargarismo adijci potest lignum Sassafras, vel Lignum sanctum. Vlceribus illini potest mel rosatum, cui vna vel altera guttula Spiritus Salis admisceatur. Nec aliena est essentia Pimpinellae albae, frutulo sacchari excepta. **ASTREVCIVS** extollit Collyrium **LANFRANCI.**

§. 620.

Si vero pytalismus non vnguento, sed Mercurio intus sumto excitandus est, nullum praestantius praeparatum est, quam Mercurius dulcis, iterata sublimatione praeparandus. Datur is, ne gingiuis inhaerescat, optime in bolo, cum Syrupo quodam et Conferua. Quotidie dari potest ab initio ad scrup. semis, tandem ad gr. xv. vel scrupulum vnum. In hac dosi perseverandum est, vel ea augenda, vel minuenda est, donec aeger per nyctimeron exspuat circiter libras tres salinae. Videndum est enim sedulo, ne ex nimio Mercurio oriatur suffocationis periculum. Vbi sputum ante tempus deficere videtur, dari potest nouus stimulus ex Mercurio dulci ad gr. viij. vel scrup. semis. In imbecillioribus quotidiana Mercurii dosi diuidi debet in duas vel plures partes, ita, vt pedetentim offeratur. Ceteroquin Mercurius tempore vespertino commode sumitur. Cetera cum iis conueniunt, quae supra dixi.

§. 621.

Alia methodus est, vbi tertio quoque die, aliquando etiam quarto vel quinto, datur Mercurii dosi, obseruato regimine

gimine. Vbi aeger spuerare incipit, dantur cathartica. Eadem ratione etiam illinire solent vnguentum Neapolitanum; et ita hanc curationem continuant, donec euanescent symptomata. Sub finem iterantur cathartica; datur ptisana meracior, adhibentur etiam balnea. Quae methodus quum in Gallia vltimatissima sit, forte in locis septentrionalibus non bene respondisse videtur; praecipue si aegri cum his regimen non seruauerunt.



S C O R B U T V S.

§. 622.

Est cacoehymiae genus, seu peculiaris sanguinis omniumque humorum in corpore dyscrasia, quae ex variis causis nascitur. Saepe ad scorbutum referri a Clinicis solent omnia morborum genera paullo difficiliora, morbi spastici, arthritici, quos quidem interdum, non vero semper ex vero Scorbuto oriri, certum est. Crebrius scorbuti nomine significant morbum venereum. De cuius et scorbuti differentia supra dictum fuit. Verus scorbutus, vix notus populis meridionalibus, communiter septentrionalibus est endemius. In terris septentrionalibus naturalis et copiosior prouentus est Cochleariae aliarumque herbarum antiscorbuticarum. Prae ceteris nautae eo laborant, cuius rei causa a viuendi ratione petenda est.

§. 623.

In Scorbuto syndrome est variorum symptomatum. Ipse autem morbus discrimina habet. Nam aliquando in corrupto corporis habitu exsuperat oleum rancidum, quod, admixto sale, per attritum attenuato, volatile factum, parit Scorbutum, quem vocamus calidum. Aliquando exsuperat salum, aliquando vero, maxime in iis, qui, victu
vege-

vegetabili acescente vfi, malo hypochondriaco confictati, tandem scorbutici fiunt, acidum. Omnes aegri ab initio conqueruntur de insolita corporis lassitudine, torpore, somnolentia, spiritus difficultate, cordis palpitatione, et post, increbrescente morbo, de obtuso lumborum artuumque dolore, qui illi dolori similis est, quem post paullo vehementiorem et insolitam exercitationem sentimus. Dolor vespri exasperatur, mane, proueniente sudore, se remittit. Facies et tota cutis fit pallida, liuida, et conspiciuntur maculae, mox rubicundae, mox flauescences nigricantesque. Anima fit foetida, gingivae stomacace laborant, seu exulceratione sanguinolenta, quae in scorbutico calido ad gangraenam spectat, in frigido autem lenta est, in qua multus et muco similis humor esse solet. Scorbuticis venae raninae atro sanguine turgidae sunt, dentes labant caduntque. Tandem fiunt vlcera non solum in ore, sed aliis etiam corporis sedibus, ex quibus crebrius ater sanguis erumpit. Sanguis ex vena missus varius est, colore vel liuidus, vel niger, multo sero acri et pituita viridi, flauesciente mixtus. Venter flatibus intentus est. Flatus enim ex cruditate oriuntur. Pulsus parvus, debilis, inaequalis est. Vrina varia, in scorbutico calido saepe lixiuiosa, cum multo sedimento tartareo matulae inhaeresciente; in frigido nonnumquam pallida, mox alia et quandoque nigra, cum sedimento farinoso. Ingrauescente morbo saepe paralysis oritur, σκελοτύφλη vocant. Ossa tandem vitium contrahunt, et cariota fiunt, id quod frequentius incidit, vbi acidum exsuperat. Illa exeso periosio friabilia fiunt. Inter causas non solum, sed etiam inter causarum symptomata discrimen est. Vbi exsuperat rancidum, spiritus grauior est et fere intolerabilis, cadauer olens, copiosiores sunt maculae nigricantes, vlcera ad gangraenam spectant. Accedunt vigiliae, marcor, febris lenta, alius male fluens, cruenta, biliosa et peioris odoris, quam ex consuetudine esse solet. Sub finem accedit infania. In falso difficilior respiratio et artuum vehementior dolor est. In acido exsuperante vrina plerumque

que vel pallida, vel nigra; spiritus oris acidum olet, cadunt celerius dentes exesi, scabri, nigri, vitianturque ossa. Sub finem arthritidis, rheumatismus, melancholia et infania, vi etiam coercenda, accedunt.

§. 624.

Causæ plerumque a rebus non-naturalibus petendæ sunt. Plurimum confert aër, quare in oris maritimis loca, in quibus post inundationes aqua salsa marina quiescit et putrescit, scorbutu gignendo aptiora sunt. Haec putredo adaugetur, si herbae, nec non animalia marina cum aquis paludosis putrescunt. Plurimum etiam conferunt nauticorum hominum carnes et pisces sale conditi, fumo indurati, caseus rancidus et legumina valentiora. In navigationibus longis nautae potant aquas verminosas, putres. Scorbutus etiam nascitur in miseris, qui in carceribus conclusis detinentur, nec non in iis, qui in locis subterraneis super pavimenta, lapide strata, habitant, et quibus aëre frigido, humido ac vappido insensibilis exspiratio cohibetur. Plurimum confert moeror, nimia quies, defectus somni, plethora, haemorrhoidum et menstruorum obstructio, febris quartana male curata, maxime celerius vel Cortice Peruviano, vel adstringentibus cohibita. Malum est hereditarium, et habet aliquod contagium, lentum vero et minus efficax.

§. 625.

Morbus recens, subito ortus, citius tollitur, quam qui ex humorum dyscrasia, pedetentim in corpore genita, natus fuit. Quibus multae et magnae maculae rubicundae fiunt, illis metuenda est haemorrhagia per nares, vel per pectus, quae interdum funesta esse potest. Menstruorum et haemorrhoidum profluuium leuat morbum, si ex harum excretionum vitiis ortus fuit, non vero, ubi ab acrimonia et nimia sanguinis raritate tale profluuium oritur. Viscera si male affecta sunt, aegri tabidi moriuntur, vel etiam exstinguuntur haemorrhagia exhausti. Si morbus a malo victu
ortus

ortus fuit, tolli nequit, nisi cibo potuque mutatis. Si alimenterum bonorum copia datur, saepe breui conualefcunt homines nautici.

§. 626.

In Curatione videndum est, vt humida corrigantur; vt crassum iterum tenue; stagnans, mobile; cohaerens, fluidum fiat; et praecipue, vt adsit copia mitis illius blandique humoris, quo corpus alitur, et ex quo perfectissimi succi elaborantur. Praeterea sedulo consideranda est acrimonia, illaque differentia inter scorbutum calidum et frigidum sic dictum. Hanc differentiam non solum cognoscimus ex supra dictis symptomatibus, sed etiam ex cognitis causis. Igitur acrimonia muriatica est, si ex victu duro, multo sale condito, morbus ortus fuit, &c. Praeterea morbus plurimum differt gradu. Ab initio enim quandoque paullo efficaciora et euacuantia locum habere possunt, quae pestifera esse solent, vbi morbus iam adoleuit, quum a valentioribus et sanguinem cientibus medicamentis metuenda sit viscerum corruptio, vasorumque ruptura. In hoc enim desperato casu non nisi mitioribus agendum est. Venaesectio vix vnquam proficit, plurimum nocet. Emetica ab initio morbi, in corporibus valde robustis, et vbi vitium a malo victu ortum est, et varia indicia cruditatem in ventriculo haerere significant, admitti possunt. Laudant inprimis decoctum Sedi vermicularis ad vncias iij. vel iv. In aliis, vbi morbus iam adoleuit, ex vomitu funesta haemorrhagia metuenda est. Praestantiora sunt, quae aluum ducunt, ex quorum numero, in scorbuto inprimis calido, conducunt Tamarindi, Cremor Tartari, folia Sennae, Palsulae, Rhabarbarum, Sal catharticus. Ex his parari possunt Apozemata, vel si vires illud permittunt, noduli laxantes, additis herbis sic dictis antiscorbuticis. In frigido vero scorbuto, praeter nodulos hos laxantes, inprimis conducunt Sales neutrius generis; Sal catharticus; Sal Thermaeum Carolinarum; Sal Tachenii. Haec purgantia vero
ita

ita exhibenda sunt, vt mala materia non vi, sed pedetentim educatur.

§. 627.

Maximum vero praesidium in medicamentis ponitur, quae cognitae acrimoniae contraria sunt. Igitur in scorbuto calido plurimum proficiunt Succī acidi vegetabilium recentium: herbae Acetosae, Acetosellae, Lactucae, Endiviae, Cerasa, Ribesia, Fraga, Mori, Limonia, Aurantia et citrina poma, Tamarindi, Cremor Tartari, Passulae, Mel, Oxytel. His varium in modum praeparatis, vel ex aqua, vel ex sero lactis, vel ex lacte ebutyrato decoctis, vtatur aeger. Parari etiam possunt iuscula carniū iuniorum valde tenuia; et ex his illae modo dictae herbae coquantur. Plurimum etiam proficit serum lactis solum diu potandum. Etiam ab initio morbi conducunt aquae minerales Schwalbacenses, Selteranae, Spadanae. Ab aquis valentioribus et Thermis abstinendum est. Accommodari debet victus, et possunt herbae illae recentes offerri in iusculis et acetariis.

§. 628.

In scorbuto frigido remedia paullo acriora necessaria sunt. Inter ea eminet Cochlearia eiusque recentis succus. Hac enim herba Septentrionales populi sola curantur. Nullius vsus sunt arte chemica praeparata ex Cochlearia, veluti Spiritus: minoris virtutis est decoctum herbae siccae. Huc etiam pertinent omnia Nasturtiorum et Raphanorum genera: herba Beccabungae, Fumariae, Trifolii fibrini. Ex his commodè parantur infusa et vina medicata. Plurimum proficit cum his potus diluens; aqua cum melle; aquae minerales; aqua fontana, addito Nitro; etiam iuscula carniū iuniorum cum modo dictis herbis commodè coquantur. Pauperibus dari potest Raphanus rusticanus ex sero lactis coctus. Sunt, qui in frigido scorbuto, et vbi acidum abundat, plurimum laudant aquam Calcis viuae. Cautè tamen cum hoc remedio agendum, quod non nisi robustiori-

Cc

bus

bus conuenit; in tabidis et in scorbuto calido multum nocere potest. Neceſſe etiam eſt, vt aeger aquae Calcis ſuperbibat ſerum lactis. Vbi ſcorbutus admodum inualuit, praecipue, ſi oſſa iam adfecta ſunt, omni medicatione mors acceleratur. Viſtus ſedulo obſeruandus, et omnium rerum naturalium uſus. Corporis exercitatio quotidiana ſit, non nimis tamen vehemens, praefertim ab initio. Supurato vero morbo, ad nouum robur viſceribus praestandum, illa maxime neceſſaria eſt. Eum in finem etiam danda ſunt martialia, carminatiua, et alibi laudata roborantia.

§. 629.

In omni hac curatione minime properandum eſt. Venaeſectio plerumque nocet. Infantibus, qui remedia illa non facile ſumunt, plurimum proficiunt balnea ex ſola aqua fluuiatili dulci, vel ex decocto herbarum, quae aduerſus illud ſcorbuti genus, quo laborant, proficiunt. Aliqua difficultas eſt, ſi in corpore ſcorbutico ex contagio oritur venerea lues. Nam Mercurii uſus non ſine periculo eſt. In hoc caſu decoctis Saffaparillae, Chinae, Bardanae, vtendum, et his humores ſimul diluendi ſunt. Vbi vero ſcorbutus calidus eſt, praestat prius corpus ſero lactis aliisque diluentibus eluere, et poſt auxilia aduerſus morbum venereum adhibere.

§. 630.

Stomacace remedia externa requirit. Si vlcera cruenta, foetida et nigra ſunt, conducunt acida, ſuccus Citri, Spiritus acidi, Roob Diamoron, Mel Roſarum. Fieri poſſunt gargarismi in ore continendi. Plurimum etiam proficiunt herbae, Acetoſae, Acetoſellae, vel ſolac, vel cum ſaccharo maſticatae. In ſcorbuto frigido, aut magis lento, praestantiſſimum remedium eſt Cochlearia crebrius maſticata. Nec alienum eſt Nitrum et Sal catharticus, ſi aquis Rutae, Salviae, Plantaginis ſoluuntur, et os iisdem eluitur. Vbi autem vlcera valde ſordida ſunt et craſſiori muco

mucō obducta, profunt valentiora, ex Spiritu Cochleariae, Effentia Myrrhae et similibus; vel sola Effentia Pimpinellae albae dari potest. Haec remedia vel frustulo Sacchari excepta, linguae imposita, ore continentur, vel excipiuntur melle rosato. Etiam Gargarismi parari possunt ex decocto herbarum antiscorbuticarum. Gummi Laccae et Sanguis Draconis plurimum valent ad roborandas gingiuas, quas scalpello concidi, non raro vtilissimum est.



RHEVMATISMVS ET ARTHRODYNIA.

§. 631.

Morbi spastici sunt et dolores, qui ab impedito transitu lymphae aliorumque tenuiorum humorum, per varii generis membranas, musculos, ligamenta, tendines proueniunt, qui vero non ita pertinaces sunt, ac podagra, sed subinde locum mutant. Differunt inter se tum gradu, tum loco adfecto. In utroque morbo membrum aegre mouetur, mitior vero est dolor in rheumatismo, vehementior in arthritide. In rheumatismo dolor saepe musculis et horum membranis, praecipue musculis ceruicis, ponderis instar incumbit. Aliquando de sensu refrigerii conqueruntur aegri. In Arthritide dolor magis acutus est, spasticus et pungens. Vterque saepe cum febre ingruit, tandem vero febris euanescit, manente dolore. Febris illa catarrhali similis est. Chronici sunt morbi. Soluuntur quandoque urinae et ventris profluuiio, aliquando sudore. Interdum, superueniente febre, crassa ex urina desidunt cum leuamine. Nonnumquam Rheumatismus, praecipue si aliud vitium, veluti scorbutus, accessit, per plures annos durat et per vices ingrauescit, atque iterum se paullulum remittit. Ob id in regionibus borealibus exempla sunt de aegris diuturno

rheumatismo vexatis, qui gibbosi facti sunt. In aliis mala materia, praecipue si externa adhibita fuerunt, conuertitur in viscera, et oritur tabes. Si illa inclinatur in cerebrum, epilepsia. Diuersa nomina habent hi morbi, et prae ceteris notandus est dolor lumborum, seu sic dicta Lumbago arthritica, quae, si vomitum excipias, omnia symptomata arthritidis habet.

§. 632.

Morbi hi frequentiores sunt corporibus raris iis, qui opiparo et vario victu, vino, acido, crudo, nec non otio abutuntur, maxime vero, qui sudorem represserunt, et corpus calens aurae frigidae vel perflatus exposuerunt. Plurimum confert haemorrhoidum et menstruorum obstructio, neglecta sanguinis missio, aëris vicissitudines subitaneae, moeror, spiritus ardentis abusus, et omnia, quibus transpiratio cohibetur, corpus vero imbecillum redditur. Rheumatismi causa frequentior est refrigerium, etiam saltem vnius partis, v. g. pedis. Ex hoc enim refrigerio fit strictura neruorum per vniuersum corpus, et insensibilis exspiratio cohibetur.

§. 633.

Sedes itaque morbi sunt membranae, tendines et glandulae Hauerfianae, ipsaeque ligamenta. In his enim partibus lymphæ cruda, tenax, crassa, vel acrior et tenuior quiescit, obstructionem et quasi spurium quoddam inflammationis genus parit, ipsosque neruos partesque neruosas ad sui contractionem excitat, ex qua contractione seu spasmus ille vehemens dolor nascitur. Nonnumquam aegri levantur exanthematibus, purpura scorbutica, scabie, vel si vlcera sponte nascuntur. Nec non si haemorrhoides et menstrua iterum proueniunt. Raro hi morbi funesti sunt, interdum tamen, ubi magna febris accedit, vel ubi extrinsecus incongrua auxilia admoventur. In senibus magis metuendi sunt, et quandoque in marasum degenerant; in aliis tandem mutantur in arthritidem fixam seu podagram.

§. 634.

§. 634.

In curatione humores quiescentes soluendi et per loca opportuna euacuandi sunt. In rheumatismo, si febris simul adest, a primis initiis quandoque illa curatio adhibenda, qualis conuenit feбри catarrhali. Dari potest Liqueur terrae foliatæ Tartari cum Spiritu Nitri dulci, vel Liqueur anodynus Hoffmanni cum pauco spiritu bezoardico. Aeger bibat ptisanam, alius ducatur clystere, et prae ceteris omnibus regimen imperandum est, et videndum, ne sudor reprimatur. Hac ratione quandoque inter initia grauior morbus auertitur. Si vero febris iam se remisit, et vel nulla est, vel valde exigua, morbus pertinacior esse solet. Is quandoque, maxime in plethoricis, inter initia auertitur, si sanguis mittitur, alius ducitur decocto Tamarindorum, Rhabbarbari, foliorum Sennae, Mannae, et hoc etiam, si res postulare videtur, iteratur. His praemissis dari potest emulsio ex semine Papaueris, addito Nitro et Antimonio diaphoretico. Aeger bibat Decoctum Radicis Graminis, Glycyrrhizae, Cichorei, florum Papaueris rhoeados vel Papaueris albi. Vbi vero aestus adest, decocto, vel aquis destillatis, admisceri potest Syrupus Violarum, florum Papaueris rhoeados, vel Papaueris albi. Hoc tamen sedulo videndum est, ne rheumatismus ortus sit a febris cuiusdam mala materia in membrum quoddam inclinata, in quo casu euacuantia nocere possunt. Praestat tunc lenioribus diaphoreticis uti, v. g. ptisana, Cornu Cerui sine igne, Antimonio diaphoretico, Nitro, aliisque similibus. Vbi morbus valde refractarius est, praemissa sanguinis missione dari possunt noduli laxantes, qui vero in corporibus raris et phlegmaticis meliores sunt, quam in aliis.

§. 635.

In Arthritide vero alius duci debet ab initio clysteribus emollientibus, vel puluere ex Rhabbarbaro et Nitro; post propinari debent decocta Saffaparillae, Scorzonerae, Pareirae brauae, Cichorei, Glycyrrhizae, adiectis etiam

Passulis et Caricis pinguibus. Si dolores valde vrgent, danda sunt temperantia; vbi vero illi se remittunt, cum decocto dari potest Mixtura ex Liquore minerali Hoffmanni et Tinctura Antimonii. Prae ceteris necesse est, vt aeger a vino et cereuisia abstineat, et bibat decoctum vel ptisanam. Vbi malum mitescere coepit, optime datur purgans antiphlogisticum paullo efficacius. Non facile ad Opiata procedendum est; si tamen id res postulare videtur, praemisso iteratoque purgante, dari potest Laudani opii gr. j. - ij. Laudani liquidi gtt. xv. - xx. Pilulae WILDGANSII gr. ij. - iij. Sedulo videndum, ne purgantia prius dentur, quam vbi materia iam mobilis facta est, et ne abutamur opiatis.

§. 636.

De Topicis sedulo notandum, illa plurimum nocere posse, raro iuuare. Si morbus recens est, a ferro represso, et si non tam acutus dolor, quam quidam refrigerii sensus partem infestat, proficit frictio cum linteis asperioribus. Etiam admoueri possunt cucurbitulae, altius prius incise cute, euocatoque sanguine. Hae cucurbitulae proficiunt in morbo chronico, praecipue in foeminis, quibus catamenia non fluunt, si furis admouentur, adpropinquante periodo menstrua. In morbo refractario et saepius reuertente optimum auxilium praestant Thermae Toeplicenses, vel in his terris aquae, quibus serum purgatur, Wolckensteinensis et Wildungensis. Ante tamen horum vsum confert corpus Thermarum Carolinarum, quae saluberrimae sunt, vel aliarum aquarum mineralium potu eluere, et post illis externis vti. Ne malum reuertatur, aeger singulis mensibus vtatur leni cathartico. Vitet omne frigus, tanto magis humidum; Venerem, aliaque quae nocere possunt. Victus et corporis exercitatio ita accommodari debent, vt nulla in primis viis cruditas sit, et vt visceribus pristinum robur restituantur.



* * * * *

P O D A G R A.

§. 637.

Dicitur Arthritis fixa, quod sedem non facile mutet, pro diuersis etiam partibus, quas occupat, etiam Gonagra, Chiragra &c. Huic obnoxia sunt corpora, quae occasione Arthritidis descripsimus. Vbi imminet, aeger sentit totius corporis languorem, aliquem plenitudinis et grauitatis sensum, appetitum prostratum, nauseam, agrypniam. Tandem in pede vel alia parte, prae ceteris vero in articulo inter metatarsum et pollicem, sentit ab initio leuiorem spasmus, qui mox in dolorem vehementiorem degenerat. Plerumque haec fiunt cum febricula et vago horrore. Pars, quae laborat, nitet, parum tumet et rubet. Dolor autem talis est, vt fere intolerabilis, et pars omnium rerum, stragulorum etiam mollissimorum, impatientissima sit. Dolor etiam acerbior est versus vesperam, horis matutinis mitescit. Vrina pauca est et ignea, et aeger nullum somnum capere potest. Mitescente vero malo, pars, quae laborat, magis intumescit, vrina, id quod tamen non perpetuum est, sedimentum demittit lateritium. Non vna tamen ratione aegros hic morbus corripere solet. Nonnumquam enim eum praecedit grauior cephalalgia, spirandi difficultas et asthma, imo et colica, qui aegri in maiori periculo versantur, donec mala materia in artuum extrema conuertitur. Etiam duratio dolorum plurimum variat. Vbi enim morbo vetustas accessit, illius paroxysmi longiores sunt. Etiam vbi morbus frequentius et plurimum saeuit, relinquuntur in articulis nodi, materia tartarea et tephacea pleni, qui quoque tumores nonnumquam exulcerantur. In reliquis autem, vbi paroxysmus desaeuit, dolores se remittunt, tumor pedetentim desidit, epidermis huiusque squamulae secedunt, diu autem manet rigor, obscurus dolor, et saepe etiam tumor. Vide, qui optime de his scripsit, SYDENHAMIVM.

Cc 4

§. 638.

§. 638.

Sedes huius morbi sunt articulorum ligamenta et glandulae, ex quibus axungia articulorum excernitur. Frequentius malum pedes infestat, in quorum partibus tardior est circuitus humorum, qui itaque facilius quiescant. Causa continens esse videtur humor acrior, et praecipue articulorum axungia corrupta, quibus spasmi illi concitantur. Non enim sanguis ipse, sed succus tenerior minimorum vasorum, qui variorum viscerum actione elaborantur, vitium contraxisse videtur. Multum disputant Auctores de natura huius vitii humoris, qui cum illa materia gypsea et cum axungia articulorum ex cadaueribus extracta experimenta instituerunt. Vid. KERCKERING in *Spicil. anatom. Obseru.* 28. et *Acta Acad. Bononiens.* p. 148. Probabilissimum videtur, illam materiam in genere conuenire cum tartaro, de quo supra occasione Nephritidis dictum fuit. Id non solum illi tophi significant, sed confirmant etiam observationes, saepe podagricos calculosos esse. Haec materia cruda, quae ex humidis desidit, a natura vero in extrema conuertitur, in ligamenti circuitum absolvere non potest, ibi accumulata haeret, et tandem quacumque re incitata, inflammationem et spasmos mouet. Hunc morbum habere aliquam purgationem et therapiam, qua corpus ab aliis grauioribus morbis liberum praestatur, sine dubio est.

§. 639.

Morbus hereditarius est, et eos, qui illum a parentibus acceperunt, citius ac vehementius infestat. Eum adferunt multumque exacerbant abusus vini, praecipue valentioris, sulphure et tartaro abundantis, nec non vini non recte fermentati, austeri. Plurimum facit Venus vel nimia, vel praematura, ira, moeror, nimium litterarum studium, victus vegetabilis crudus, nec non nimis iurulentus, pinguis, qui ab imbecillis visceribus non recte digeritur. Ingluies, otium, transpiratio cohibita et totius corporis,

poris, praesertim vero pedum, refrigerium. Quare venatores, si laute viuunt, facilius, quam ceteri, fiunt podagrici. Plurimum etiam confert haemorrhoidum obstructio; ad minimum his fluentibus morbus quidem non tollitur, plurimum tamen leuatur. Vbi ei vetustas accessit, quandoque haemorrhoides fluunt, sub vehementissimis doloribus. Habet etiam aliquid contagii, quod praesertim per vestimenta et stragula propagatur

§. 640.

Morbus in se spectatus plus doloris et incommodi habet, quam periculi. Est, ut dictum, therapia quaedam, qua corpus ab aliis saepe morbis leuatur. Si eo laborant iuniores, illi raro longaeui fiunt; si vero senes eo laborare incipiunt, et dolores non vagi, sed exquisiti constantesque sunt, is longaeuitatem promittit. Tandem vero senes, tanto magis imbecilli, eo opprimuntur, si iis vires deficiunt, ex mala materia, quae, si non in artuum extrema propelli potest, in viscera inclinatur. Si morbus variis medicamentis, praecipue externis, tentatur, dira sequuntur symptomata: Asthma conuulsium, Catarrhus suffocatiuus, Apoplexia, Paralysis, adfectus soporosi, Phrenitis et alia. Nondum reperta fuit methodus, qua tuto mederi possumus podagrae, si illa inualuit.

§. 641.

Podagra auerti vel plurimum mitigari potest abstinentia a nimio crudoque cibo, a Venere et omnibus, quae nocere possunt. Plurimum nocet ebriositas. A vino vero non prorsus prohibendi sunt, qui ei adfueti fuere. Illud enim, quum ventriculum roboret, proficere potest, modo sit edentulum, paucum, generosum. Durante vero paroxysmo, etiam postquam ille defauiisse videtur, saepe paucio vino dolores plurimum exacerbantur et recrudescent. Senibus vinum salubrius est, quam iunioribus. Praeterea abstinentum est a victu nimis iurulento, a caseo vel accescente,

vel rancido, a leguminibus et omnibus, quae difficilius concoquuntur. Sanguis mittendus est plethoricis et adfuetis, numquam vero durante paroxysmo. Sedulo videndum est, ne insensibilis exspiratio et sudor matutinus cohibeatur. Alius subito ducenda est remediis mitioribus. Maximam salubritatem praestant Thermae Carolinae, quibus podagra optime aueritur. Non raro tamen, si illae potantur, dolores saevire incipiunt. Si non ita vehementes sunt, nihilominus Thermae potari possunt. Si Thermarum copia non datur, propinari debent Acidulae, Pyrmontanae et Schwalbacenses. Corpus exercendum est sedulo. Ad roboranda viscera egregie proficit equitatio. Haec vero in pedibus dolores tumoresque excitare potest. Nec alienum est, si quandoque, purgato prius per cathartica corpore, aeger per aliquot hebdomadas horis matutinis bibit infusum aquosum ex Sassaaparilla, Cichoreo, herba Salviae, Melissae, Betonicae, Chamaedryos. BOERHAAVIUS laudat salem volatilem Cornu Cerui, qui ad gr. ij-iiij. horis matutinis in lecto sumi potest ex aqua, ita, ut aeger tale infusum superbibat, et auctam diapnoen congruo regimine excipiat. Huic vero curationi diu insistendum est. Nec aliena est articulorum fricatio eo tempore, quando nullus dolor saevit; sit tamen modesta, et talis, qua pori aperiuntur, non vero nimius rigor affertur ligamentis, tendinibus et ipsi cuti. Plurimum etiam extollunt cucurbitulas plantis pedum et ipsi loco, qui maxime dolere consuevit, altius prius concisa cute, admouendas, id quod tertio quoque mense fieri iubent. Ante omnia videndum, ut ventriculus et alia viscera robur debitum habeant. Quandoque, praecipue si aeger vinum non bibit, ante prandium is sumere potest Elixir stomachicum. Nec omittendum est, magnam necessitatem esse somni, cui nihil detrahere debent podagrici.

§. 642.

Si vero homo corporis languore, agrypnia, obscuro aliquo sensu, percipit sibi paroxysmum imminere, mox al-

vius

vus soluenda est vel clystere, vel Manna et lenissimo remedio. Datis enim valentioribus, metus esse potest, ne mala materia in viscera vertatur, et oriatur inflammatio interna. Si febricula iuncta est, oportet huius rationem habere, et dari possunt puluilli temperantes, diaphoretici, cum aquis diapnoicis. Vbi febris se remittit, et, desäeniente dolore, pars magis intumescit, vrina cocta est et sedimentum habet, dari potest mixtura ex liquoris anodymi partibus duabus vel tribus, essentiae Scordii parte vna, vel eadem proportionem dari potest Spiritus bezoardicus Bussii. Cauendum est, ne aeger diapnoen cohibeat. Potioni praestanda est aqua vel fontana, vel Selterana, vel ptisana ex hordeo. Nocet omnis cereuisia, etiam quam maxime potus frigidus. Vitus sit, qui sustinet, non vero alit. Nocent omnia iurulenta. Vix non omnia topica perniciofa sunt, et prae aliis spirituosä, Emplastrum saponatum Barbette aliaque. Laudant plures cataplasmata paregorica et emollientia, quae leuamen adferre possunt, partes vero nimium laxant, ita, vt tumor maneat diutius, et vt morbus celerius reuertatur. Nihil magis iuuat, quam continuus et aequalis corporis calor, et mollior partis dolentis decubitus.

§. 643.

Si morbus vel alienis medicamentis curatus, vel malo regimine exceptus, se subito remittit, alia vero symptomate, febris, agrypnia, anxietas sequuntur, periculum imminet. Igitur reuocandus est dolor. Fricandum est membrum linteis calidis et asperioribus, immo admouenda sunt rubefaciencia, cucurbitulae vel siccae, vel concisa prius cute. Dari potest vinum Rhenanum vetus, mixtura ex Essentia alexipharmaca et Elixir proprietatis, Essentia Myrrhae et alia, quae sanguinis motum augent. In hoc casu sanguinis missio omniaque auacuancia, temperantia etiam pestifera sunt. Sedulo videndum, ne frigore insensibilis exspiratio cohibeatur.



* * * * *

DE NERVORVM DISTENTIONE ET PRAECIPVE DE EPILEPSIA.

§. 644.

Nervorum distentio est motus praeter voluntatem violentus musculorum animali actioni inseruientium. Eius differentia est varia. Spasmus dicitur pertinacior et violenta nervorum intentio cum musculorum rigore. Convulsio autem est alterna reciprocatio huius intentionis et resolutionis. Priorem motum nonnulli tonicum, alterum clonicum vocant, quo membra quasi quatiuntur. Horum motuum varia genera sunt, variaeque denominationes. Ad primum genus referri debet Tetanus, seu Rigor Celsi, ubi corpus, manente sensuum integritate, erectum et rigidum est. Emprosthotonus, quando adfectis musculis anterioribus corpus pronum datur et in anteriora inflectitur ac contrahitur. Opisthotonus, quando laborantibus musculis dorso, corpus ad posteriora retrahitur. Quare morbus est Catalepsis, aliis Catoche vel Catochus, quae aegrum temporis momento corripit, qui cum omnium sensuum internorum et externorum abolitione, quasi fulmine tactus, in eo situ positumque membrorum, quem percussus servauerat, immobilis manet. Membra vero Catalepticis rigida non sunt, sed in quemcumque sensum flecti possunt, quae vero in illo situ manent. Interea pulsus et respiratio vix quidquam mutantur. Differt a Tetano, in quo etiam homo in eodem situ manet, sed rigidus, qui flecti nequit, et sensibus internis et externis manet sua integritas. In Catalepsi nullus omnino sensus, corpus vero, quasi cereum, potest ab adstantibus mirum in modum intorqueri. Vide *l'Histoire de l'Academie Royale des Sciences* 1738. p. 65. Horum vero morborum princeps est Epilepsia, quae olim morbus sacer, morbus herculeus, morbus comitialis, morbus caducus dicta fuit.

In

In hac variae et vix non omnes partes conuelluntur, et illo reciproco motu agitantur, cum omnium sensuum, tum internorum, tum externorum, plenaria abolitione, superstitute cordis et pulmonum actione illaesa. Aliorum etiam musculorum spasmi et conuulsiones fiunt, quae suis nominibus dignoscuntur, v. g. si labra versus aures trahuntur, est Spasmus cynicus; si conuellitur maxilla inferior, cum linguae aliisque musculis voci et loquellae formandae inferuentibus, oritur Risus sardonius. Si conuellitur diaphragma, oritur Singultus, qui propterea, praecipue in acutis, saepe conuulsionis prodromus est. Si vnus saltem musculus spasmo adducitur, id quod frequentius in artubus inferioribus accidit, vocant Crampum, et molestum adfert sensum, qui, si adscendit versus superiora, quandoque vniuersalem nervorum distentionem, immo et Epilepsiam infert. Simile quid obseruatur in foeminis hystericis, quibus spasmus ex abdomine per stomachum in fauces adscendit, et suffocationem vteri parit. Morbi enim hystERICI cum nervorum distentione magna conuenientia est, et illa, si vehementior est, hac saepe finitur. Rarum conuulsionis genus est Chorea Sti Viti, quae absoluitur alterna violentaque pedum agitatione et saltatione. Simile quid esse dicitur in Tarantismo. Ad spasticos et conuulsuos motus referri possunt alii morbi: vomitus, tussis conuulsiva, asthma conuulsuum, cordis palpitatio, ephialtes seu incubus, aphonía, dentium stridor, priapismus, &c. de quibus alibi diximus.

§. 645.

Hoc maxime discrimen inter simplicem nervorum distentionem et inter veram epilepsiam est, vt in prioribus homines plerumque sensibus gaudeant, immo etiam loquantur, in epilepsia vero interni externique sensus prorsus aboleantur. His etiam notis cognoscere possumus eos, qui morbum simulant. Illorum enim, de quibus haec suspicio est, naribus admouetur Spiritus Salis ammoniaci cum Calce viua, acus infiguntur cuti et parti tendineae, ignis admouetur

tur et pilus euellitur, id quod omne haud sentiunt epileptici. In his, praeter haec, saepe maior agitatio est musculorum abdominis et vehementior spasmus partium internarum, robur insolitum; pulsus valde aequalis est, sed durus. Omnia secus se habent in impostoribus. Ceteroquin in neruorum distentione et epilepsia mirae fiunt quandoque membrorum commotiones et gesticationes, cum clamore variato, ut saepe a cacodaemone illos motus fieri creduli opinentur. In vera epilepsia spuma erumpit ex ore, saepe exeritur lingua, quae etiam morsu laeditur. Exprimitur vrina, fex alui, semen, et ex genitalibus mulierum interdum sanguis. Hae conuulsiones interdum suo tempore reuertuntur, id quod crebrius incidit, si vel ex cohibitis variis excretionibus ortae fuerunt, vel si vitiosa phantasia accessit. Magna est differentia inter idiopathicam epilepsiam, cuius causa haeret in cerebro, et inter sympathicam, quae ex alio vitio, quod in quacumque corporis parte est, nascitur. Vtriusque etiam epilepsiae varii gradus sunt.

§. 646.

Sunt etiam quaedam signa, quae imminentem epilepsiam significant, praecipue idiopathicam. Aeger sentit grauitatem in capite, conqueritur de nimio somno, vel vigiliis, de insomniis, de obliuione insolita, oculis obuerfantur splendores et circuli ignei, ex re quauis vehementer commouetur. Sub somno frequentius supinus cubat, et vexatur priapismo. Frequens ei esse solet aurium tinnitus, oscitatio, palpitatio cordis, pandiculatio; adpetitus vagus est, saepe ad voracitatem auctus; vrina cruda, aquosa. Nonnullis mox ante neruorum distentionem acutus ille dolor, vel ex abdomine, vel crampus ex musculo etiam quodam pedis, et quasi sensus quidam refrigerii ad superiora adscendit.

§. 647.

Horum morborum causae variae sunt, multum discrepantes atque fere innumerae. Homines conuelluntur, si male

male adfectum est cerebrum. Hoc vitium saepe haereditarium est, saepe congenitum, et, vt videtur, ab imaginatione matris grauidae ortum. Aliquid conferre potest, si caput non recte conformatum est, et sub partu distortum. Praeterea id efficiunt omnia, quibus meninges ipsumque cerebrum adficitur, veluti vulnus, vlcus, suppuratio, sanguis et serum extra vasa missum, ossium fractorum festucae, tophi, exostoses in caluaria, praecipue in eius parte interiore ortae, ossicula, lapilli, polypi in dura matre, vel in eius sinubus post mortem reperti, Mercurius in interiora cerebri contractus, id quod quandoque obseruatum fuit in iis, qui argento viuo curati fuerunt, nec non in artificibus et metalli fossoribus, qui Mercurium tractauerunt. Etiam hoc accidit, praecipue in corporibus valde infirmis, si sanguis cum impetu fertur ad caput, et cerebri vasa distendit. Quare ex ebrietate et ebriositate, ab adsumtis narcoticis, nonnumquam epilepsia. Ex frequentioribus causis sunt subitae animi perturbationes, terror, metus, ira, gaudium. Multum valet phantasia rei alicui quasi adfixa et perturbata, praecipue si haec desiderio quodam et animi pathemate, amore, Veneris appetitu et aliis similibus magis inflammatur, quae corrupta phantasia saepe contagiosa est, ita, vt malum quasi epidemicum fiat.

§. 648.

Neruorum vero distentio et epilepsia sympathica ex aliis saepe causis oritur, ex magno dolore et nervosarum partium laesione, ipsius nerui vel tendinis punctura. Illas efficiunt varii generis venena, praecipue narcotica, v. g. Cicutae ore sumpta vel extrinsecus admota, inprimis animalium venenatorum morsus. Causa frequentissima epilepsiae in infantibus, nec raro in adultis, sunt vermes. Ea etiam oritur crebrius ex dentitione, praecipue in pueris, ex calculo, ex pure in abscessu profundius haerente, vel si pus in cauum quoddam, veluti pectus, effluxit, a feminis abundantia, a repressis exanthematibus in morbis exanthematicis,

a sca-

a scabie, podagra, vlceribus chronicis, abscessibus criticis et male curatis, et vehementioribus euacuationibus, praecipue ex haemorrhagia et Veneris abusu. In foeminis saepe ab omnibus rebus, quibus paroxysmi hysterici mouentur. Nam inter hos morbos magnus consensus est. Frequentius hoc etiam accidit adultis, a cohibitis variis excretionibus, menstruorum, haemorrhoidum, sudore pedum, alarum, &c. nec non a partu difficili. Nulli aetati hi morbi adeo frequentes sunt, quam primae. Infantes conuelluntur ex meconio retento, ex lactis acescentis coagulo in primis viis, ex lacte vitiatum per lactantis iram, terrorem, Venere, aliaque animi pathemata. Praeterea a dentitione, a flatibus, a repletionem, victu et lacte crudo aliisque. Omnia exasperantur, si iam causae illae adsunt, aliis causis accedentibus procatactis.

§. 649.

Quandoque etiam licet inuenire signa causarum. Idiopathicae epilepsiae, cuius sedes in cerebro est, notae sunt, cephalaea diuturnior, vertigo frequens, sensuum hebetudo, torpor et adpetitus vagus atque caninus. Hic enim, si praeter naturam est, et non a malo hypochondriaco et acrioribus humoribus in ventriculo oritur, significat ab acri humore cerebri meninges adfici. Plura tamen horum etiam in hypochondriacis inueniuntur. In sympathico morbo, si a malo hypochondriaco proficiscitur, plura cruditatis signa sunt, ructus acidi, nidorosi, rancidi, nausea, exacerbatio omnium, et anxietas post pastum, ieiuno autem ventriculo frequens cardialgia. Si malum ortum fuit a nimia Venere, aeger crebrius, maxime sub somno, priapismo vexatur. Si oritur a vermibus, illa phaenomena adsunt, quae olim exposita fuerunt, inter alia narium pruritus, deiectiones mucidae, tormina, abdominis duritia, et praecipue lumbricorum vel ascaridum excretio. In infantibus lac coactum esse significant deiectiones virides, aeruginosae, acidum spirantes.

§. 650.

§. 650.

Hi morbi in infantibus facilius curantur, quam in adultis. Facilius tollitur epilepsia sympathica, quam idiopathica. Prior tamen facile in alteram mutatur. Haereditaria epilepsia, et connata, ex phantasia matris orta, nec non quae post vicesimum quintum vel quadragesimum annum homines corripit, vix unquam tollitur. Interdum soluitur epilepsia motu et excretionem quadam critica, haemorrhoidibus, pubertatis annis catameniorum excretionem, coitu, viceribus manantibus, scabie, parotidibus ad suppurationem spectantibus. Nervorum distentio, a perversa phantasia orta, vix tollitur, nisi remotis omnibus, quibus phantasia excitatur; quare optime itinere et excitato alio sensu illi contrario eradicatur. Ex nervorum distensione et epilepsia metuendus est grauidis abortus, aliis, si paroxysmi vehementes sunt, fatuitas, torpor, affectus soporosi, nonnumquam etiam haecica. Epilepsia, quo crebrius et magis opinanter homines corripit, eo vehementior est. Eam talem esse ceteroquin significant magnus membrorum motus, stertor, spuma oris et sensuum omnium, etiam conquiescentibus membris, relicta abolitio.

§. 651.

Vbi forte incidit, ut praesente Medico aeger conuellatur, corpus, si fieri potest, mox imponatur lectulo; cauendum vero est, ne caput allidatur pauimento. In os ingerendum est corium vel suber. Membra, quantum fieri potest, continenda sunt a robustioribus, non tamen nimia vi adhibita. Pollices etiam extendendi. Naribus admoueri possunt acetum vini acre, ex quo ruta viridis recens trita fuit, nec non acetum Liliorum conuallium, vel Essentia Castorei. Fragrantiora, veluti Spiritus Salis ammoniaci cum Calce viua, fere nimis irritare solent nervos et malum possunt augere.

Dd

§. 652.

§. 652.

Curatio obtineri potest, si tolli possunt causae. Laudata specifica saepe plus nocent, quam iuvant, quae pestifera sunt, si dantur infantibus, qui ex vitiatō lacte conuellantur, vel in febribus praecipue exanthematicis. Vbi itaque infantes ex lactis coagulo, ex lacte per nutricis regimen, libidinem, animi perturbationem vitiatō, immo etiam ex distentione, ex qua ventriculus multum infirmatur, ex retento meconio, conuellantur, et si iis abdomen durum est, flatibus distentum, dari debet Medulla Rhabarbari electi, addito Nitro et quodam absorbente, veluti Matre Perlarum. Vbi malum vrget et abdomen valde distentum est, in aluum immitti potest lotio emolliens, addito saccharo vel melle et oleo. Postquam sordes primarum viarum fuerunt expurgatae, et nervorum distentio per vices reuertitur, dari potest potiuncula ex aqua florum Tiliae, Sambuci, Nitro, Specifico cephalico, Coralliis cum acido Citri praeparatis, addito Diacodio Montani. Pueris, qui distentione laborant, in os ingerenda et gingiuis tumentibus illinenda sunt emollientia, veluti Syrupus de Althaea, cui pauxillum Nitri admisceri potest. Eiusmodi Syrupō commodē impraegnatur crusta panis. Si vermes adsunt, danda sunt anthelmintica. Si scabies repressa fuit, illa reuocari debet. Puellis, praecipue hystericis, suadendum est matrimonium, et semper curatio a causarum notitia petenda est. Epilepsiae idiopathicae raro mederi possumus; si tamen acris quidam humor cerebrum et meninges infestat, excitandi sunt fonticuli, vel, id quod praestantius est, setaceum. Si quartana vel alia febris aegrum corripit, illa patienter ferenda est, minime vero cohibenda vel multis euacuantibus tentanda. Quartana enim per multum tempus tolerata saepe epilepsiam tollit. Si a Venere malum ortum fuit, haec et nimia meditatio plurimum nocent. Adhibenda est corporis exercitatio, ea tamen moderata et quotidiana, et omnia in victu et regimine in usum vocanda, qui-

quibus viscera et vniuersum corpus ad aliquale robur perduntur. Si paroxysmus certis temporibus reuertitur, antequam homo illo corripitur, dandum est purgans antiphlogisticum, euitanda sunt omnia, quae sensus nervosque irritare possunt. Sanguinis missio imperanda est, si aeger plethora laborat, vel ei adfectus est; non vero facile durante neruorum distentione sanguis detrahendus est. Vfus enim docuit, corpus nimium infirmari et crebrioribus insultibus obnoxium fieri. Si haemorrhoides non fluunt, admoueri possunt hirudines. Ceteroquin, praecipue in corporibus Venere, ingenii exercitatione, nimio otio aliisque infirmitatibus, omni studio enitendum est, vt nouum robur concilietur visceribus, id quod victu potissimum et corporis exercitatione obtineri alibi dictum est. Aquae minerales saluberrimae sunt, si in visceribus abdominis, chylicationi inferuentibus, et causa et origo mali est. In idiopathica vero epilepsia nonnumquam, et praecipue ex his Thermae, nocere possunt, quippe quae cerebrum saepe nimis adficiunt. Leniores tamen aquae minerales, quales sunt Selteranae, si potioni praestantur, vel diutius potantur, semper salubriores sunt.

§. 653.

Qui fidem suam Specificis addixerunt, plura in materia medica inueniunt. Apud nostrates nota est compositio MICHAELIS, seu Specificum cephalicum, quod dari potest cum aliis. Plures extollunt lumbricos terrestres, mense Iunii, quo coeunt, captos, vino extinctos, et in umbra siccatos, quorum puluis dari potest ad scrup. dimidium, vel vnum. Ex his etiam, addito Musco Corallino, componitur Specificum antiphlogisticum Stahlian. Muscus Corallinus anthelminticus est. A recentioribus Viscum quercinum plurimum laudatur. Alia specifica sunt, Cranium hominis violenta morte extincti; Muscus cranii humani; vngula alcis; sanguis hominis decollati calidus bibendus; Spiritus sanguinis humani; Stercus pauonis &c. Plurimum etiam tribuunt

oleo animali PIPPELII, quod describitur in *Vitae animalis morbo et medicina* p. 90. Alii vero docent, ex eius usu saepe stuporem et somnolentiam fuisse ortam. Omnia specifica frequentius fallere solent, quam prodesse.



LIPOTHYMIA ET SYNCOPE.

§. 654.

Gradu differunt haec symptomata, in quibus ad tempus omnes, tum vitales, tum animales motus, ad sensum conquiescunt. Nam et cordis et pulmonum actio prorsus deficere videtur; corpus vero, resolutis fere omnibus musculis, se sustinere nequit, quare concidit homo, cui erumpit plerumque sudor frigidus. In Lipothymia tamen articularum ictus adhuc sentiuntur, pulsus vero paucus, debilis, et non raro intermittens esse solet. In Syncope vero nulla arteria digitum ferit, sed est asphyxia et vera mortis imago. Abolita enim est omnis mouendi sentiendique potestas. Syncope laborantes interdum supremo officio mandatos et sepultos fuisse, historiae testantur. Vide Dissert. WINSLOWII, *de Morte incerta*, a Ioh. BRVHIER in gallicum idioma translata. In Syncope ut plurimum corpus non adeo rigidum est, ac esse solet post mortem. Syncope etiam differt ab Apoplexia. In ea enim homines plerumque oculos, resolutis palpebris, claudunt, qui in apoplecticis aperti toruique esse solent. In apoplexia, praecipue sanguinea, facies rubet, in Syncope pallet. In apoplexia pulsus magnus, fortis, respiratio magna, cum stertore; in Syncope pulsus debilis, parvus, intermittens, rarus, qui pessimus, vel prorsus nullus, respiratio etiam ad sensum fere nulla. Ut ii, qui Syncope correpti sine sensu et motu iacent, a vere mortuis dignoscantur, varia vulgo adhiben-

hibentur. Flamma cerei admouetur oculis, qui eius splendore stringuntur. Naribus eundem in finem adpropinquatur plumulae. In speculo, ori et naribus adpropinquato, conspiciuntur explosi per expirationem halitus. Pectori imponitur vasculum aqua plenum, quod etiam a lenissimo pectoris motu commouetur. Naribus errhina et ptarmica admouentur. Commouendi, pungendi, fricandi, velli-candi sunt artus, et aciculae infigendae sunt digitis sub vnguibus. Pili euellendi sunt. Aures strepitu sonoque agitantur. Efficacius est ferrum candens, quod, si volis manuum vel plantis pedum admouetur, syncope correptos, mixto acri repentinoque dolore, excitat. Certissimum signum mortis est resolutio corporis per putredinem.

§. 655.

Oriuntur haec symptomata ex omnibus, quibus cordis motus et actio neruorum cardiacorum cohibetur vel turbatur. Sedes est in male adfectis neruis, atque conspirant haec symptomata vel cum neruorum distentione, vel cum apoplexia, in quos morbos desinunt. Id confirmat observatio, vehementiorem iram in iunioribus, et quibus corpus infirmum est, facile mutari in epilepsiam, in senibus in apoplexiam. Animo linquuntur imbecilli, ex graui et repentina animi perturbatione, ira, terrore, gaudio, metu et insueto sensu, quare hysterice interdum ex odore suaueolenti rosae vel aliarum rerum hoc incidit. Id etiam experiuntur grauidae ex motu infantis in vtero, quandoque ex inflato ventriculo, ex quouis dolore vehementiori, ex titillatione et pruritu. Etiam hoc accidit, si sanguinis transitus ad cerebellum cohibetur, veluti ex graui haemorrhagia et alia subita magna euacuatione, ex labore nimio et vehementi corporis exercitatione cum inedia, ex vigiliis, ex magna ebrietate, ex cruditate primarum viarum vehementer et repente commota, ex humorum nimia visciditate in chronicis; in acutis ex coagulo inflammatorio et polypo in iugularibus et sinibus durae matris haerente. Prae ceteris

verò omnes, quibus cerebrum et genus nervorum infirmum et magna humorum sensibilitas est, frequentius hos morbos experiuntur. Non adeo extimescenda sunt haec symptomata in hystericis; in gravidis vero, si vehementiora et diuturniora sunt et crebrius recurrunt, interdum sequitur abortus. In acutis summum periculum ostendunt. Nec minor metus est post grauem haemorrhagiam et aliam euacuationem, nisi celerius succurrere possumus aegro.

§. 656.

Quoniam medicamenta difficiliter et non sine metu suffocationis deglutiuntur, protinus adhibenda sunt externa. Naribus admoveantur volatilia: Spiritus salis ammoniaci, cui, praecipue si foeminae hystericæ sunt, admisceatur Essentia Castorei; Sal Anglicanum volatile, addito oleo Caryophyllorum. Facies et nucha conspergantur frigida, in os ingerantur balsama, veluti SCHERZERI et alia, quae ex oleo Nucistae et oleis destillatis componuntur. Ingeri etiam potest frustulum sacchari, quod exceperit Spiritum Salis ammoniaci, vel balsamum Augustanorum. Euellantur pili, fricenturque pedes manusque lintheis asperioribus, et si Syncope diutius persistit, etiam confugiendum est ad clysteres stimulantés. Vbi autem aeger sibi redditus est, danda sunt analeptica, haustus vini generosi, aquae destillatae, et ex his aqua destillata Cinnamomi cydoniata, et alia; Confectio Alkermes, Syrupus Coralliorum Quercetani, Syrupus de Canela. Hystericis conducit Essentia Castorei. Quantum fieri potest, corpus moveri debet, ut etiam humores ad pristinum motum reuocentur. Si Syncope a grauiori haemorrhagia orta fuit, vel ex accepto vulnere, vel ex abortu, partu, homo quidem excitandus est, omnia vero aliena sunt, quae motum sanguinis augent. Quare adhibenda sunt, quae occasione sanguinis profluvii commendavimus: Emulsiones, Iuscula, et cum his temperantia. Aeger a somno prohibendus est. Symptoma est Syncope, igitur causae considerandae sunt, illaeque tollendae.

MELAN.



* * * * *

MELANCHOLIA ET MANIA.

§. 657.

Est mentis alienatio pertinacior sine febre. Differt itaque a delirio, quod symptoma febris est. Maniae tamen, praecipue confirmatae, aliquando febris ut symptoma accedit. Melancholia nomen habet ab atra bile. Veteres existimauerunt, atram bilem esse humorem naturalem, et eum, praeter modum redundantem et alia humida exsuperantem, hos morbos parere. Est inter hos discrimen. Melancholici ut plurimum tristes sunt, suspiciosi, timidi, solitudinem amantes. Maniaci in quamvis stultitiam feruntur, cuius summus gradus furor, est et rabies. Quibus hi morbi imminet, ii plerumque ab initio de insolito pondere corporis, virium imbecillitate, somno infomniis turbato, respiratione lenta ac difficili, anxietate, adpetitu deprauato, conqueruntur, pallidi fiunt, et propositi atque idearum semel impressarum sunt tenacissimi.

§. 658.

Interdum oriuntur hi morbi ex vitiatō corpore, si in hoc corrupta humida, solida relaxata, vel alia ratione male affecta sunt, quibus mentis actiones perturbari multis observationibus compertum habemus. Nonnumquam eadem valetudinum genera nascuntur ex mentis adfectionibus, veluti ex idea tenaciter inhaerente, praecipue si talis aliquo vehementi desiderio, amore, odio et similibus inflammata atque in dies magis confirmata fuit. Nam his inualescētibz, tandem etiam corpus laeditur, et praecipue cerebrum, quo mediante omnes sensus internos fieri nouimus. Igitur morbi hi nascuntur ex sanguine lento, crasso, corrupto, si partes mobiles, gelatinosae, teneriores diffantur, partes vero oleosae, rancidae, terrestres cum salibus inter se cohaerent. Nam si sanguinis habitus ita corruptus est, is

Dd 4

diffi-

difficilius, praecipue in abdomine, mouetur, vnde oritur **anxietas**. Propter defectum laudabilis humoris lymphatici turbantur omnes se-et excretiones, et alienantur illa tenuissima fluida in cerebro, sine quibus sensus motusque recte fieri nequeunt. Quare insani fiunt ex morbo hypochondriaco et hysterico, si vetustas accessit, ex corruptis humoribus primarum viarum et viscerum abdominis, id quod quandoque fieri potest a febribus male curatis, a febribus propter imbecillitatem partium solidarum pertinacioribus, quibus etiam humida corporis vitiantur, ex Opii aliorumque Narcoticorum abusu, ex abundante corruptoque liquore genitali, ex mensium, haemorrhoidum, lochiorum obstructione, ex nimio calore sub Sirio, ex nimia Venere, vigiliis, ex victu crasso crudoque, ex ebriositate, praecipue spiritus ardentis abusu, ex potu parciore, et tandem, si in ipso cerebro vlcus vel aliud quid praeter naturam est.

§. 659.

Ratio reddi potest, cur sanguis crassior lymphaque sua orbatus, terrestris et acrior, facilius in viscera abdominis contrahatur. Dum enim sanguis ex corde in aortam proicitur, limpida pars sursum fertur, terrestris descendit, cuius non minima vis ingreditur arteriam coeliacam eiusque ramos, quae ad viscera abdominis pertinent. Praeterea sanguis difficiliter mouetur in visceribus raris admodum, tanto magis per venam portae, quae omnibus valvulis destituitur. Ex difficiliore autem motu et lentore humoris et anxietas augentur.

§. 660.

Saepe autem hi morbi ex vitiata mentis actione nasci videntur. Nihil dicam de animi perturbationibus, terrore, gaudio, moerore, amore, aliisque, ex quibus, si animo pertinaciter inhaerent, nascitur Melancholia. Hoc accidit etiam litterarum studiis deditis, qui sine intermissione vnam eandemque rem mente agitant. Tales sunt Algebraici, et
qui

qui per difficiliorem calculum varia, veluti cireuli quadraturam, quaerunt; Poëtae furore agitati; Fanatici, qui salutem aeternam per stultitiam quaerunt; qui lectione fabularum romanensium phantasiam concitant turbantque; Amatores infelices, et qui ex honoris vel opum dispendio moerorem contrahunt; qui dura paupertate pressi, elatum spiritum habent, et non nisi magna moliantur, saepe stulti fiunt. Nam hi omnes ideae, quae illis impressa fuit et aliquo desiderio agitata, pertinaciter inhaerent, et se ab ea depelli non sinunt, in quibus sub finem corporis non solum humida, sed solida etiam vitiantur. Nam in his post mortem cerebrum plerumque exsuccum et fere aridum repertum fuit. Crebrius hoc morbo laborant homines sicci, et qui corpus adstrictum habent et gracile, ingenio pollentes et altum sapientes, quam alii.

§. 661.

Longe difficilius tollitur morbus ex idea ortus, quam qui ex corporis vitio natus fuit. Raro curatur Mania, cui vetustas accessit, et quae in furorem degenerauit. In hac non raro insolitum musculorum robur, tolerantia frigoris et dolorum, diuturna inedia, vigiliae cum phantasiae corruptae horrendis imaginibus esse solent. Aegri quandoque epileptici fiunt, vel apoplectici moriuntur. Naturae beneficio tollitur morbus, si materia biliosa, vel etiam acida, picca aliaque, et vomitu et per aluum reiicitur. Numquam id accidit haemorrhoidibus prouenientibus, vel alio magno sanguinis profluvio, superueniente febre quartana et erumpente scabie maligna, vel in cruribus ortis ulceribus.

§. 662.

In curatione respiciendae sunt causae, et ante omnia illae, si fieri potest, tollendae sunt. Moueantur haemorrhoides et menstrua, a Venere prohibeatur aeger, si illa abusus est, vel salacioribus, si id fieri potest, concedendum

est matrimonium. Numquam vitia humores vi mouendi sunt, sed potius lenioribus diluentibus et leniter euacuantibus. Illa vero diluentia vitio humori et exsuperanti acrimoniae adcommadari debent. Inter praestantissima remedia sunt aquae minerales, quae vero aegris accommodatiores esse debent. Thermae non semper, neque omnes, ita bonae sunt. Optimae plerumque esse videntur acidulae Spadanae, et, quae cum his proxime conueniunt, Schwalbacenses. Diu vero per vnum alterumque mensem potari debent. Valentiores, veluti Egranae, possunt praemitti, non vero tamdiu continuari. In corporibus imbecillis proficiunt Selteranae, vel solae, vel cum lacte. Cum his aquis adhiberi debent balnea frigida, quibus fere quotidie vtendum est. Etiam conferunt alia diluentia, quae semper acrimoniae, quae in aegro exsuperat, et quae ex signis suis cognoscenda est, accommodari debent. Si abundat acidum, dari potest Sapo Venetus cum Pilulis Stahlianis, Sal Cardui benedicti, Absynthii, &c. Multum prosunt iuscula carniū cum Canceris fluuiatilibus, qui viui contundendi sunt. Adici potest vitellus oui crudi, non cocti. Si exsuperat putre, alealescens, conducit Oxymel, succus fructuum horaeorum maturorum, horum fructuum aëre siccatorum decoctum, serum lactis, vinum oligophorum; herba Endiviae, Lactucae decocta; radix Cichorei recens cum Passulis. Vbi rancidum exsuperat, optima est aqua diluens, additis etiam acidis. His vero diu insistendum est, vt leuis, non vero nimia sit diarrhoea, et frequens ad minimum deiectio. Inter diluentia etiam est ptisana ex hordeo, quae praecipue in acrimonia alcalescente et rancida multi vsus est. Vbi vero tandem materia mobilis facta est, illa saepe pedetentim euacuatur, quandoque vero motu quasi critico. Hoc futurum esse significat mira aegri anxietas, nausea, lipothymia, vomitus, pulsus intermittens, vrina vel nigra, vel biliosa. In hoc casu crisis non turbanda est. In aluum immittendi sunt clysteres paregorici. Danda sunt lenissima laxantia, acrimoniae adcommoanda, ex Sale cathartico

tharſtico Thermarum Carolinarum, Cremore Tartari, Tamarindis, Manna, Rheo. Vbi tandem materia euacuata eſt, danda ſunt roborantia, martialia, Cortex Peruvianus.

§. 663.

Venaefectio ſaepe quidem ad tempus leuamen affert, et neceſſaria eſt in valde plethoricis atque adſuetis; in aliis vero malum pertinacius reddit. Nec ſine periculo dantur fortiora purgantia, omniaque, quibus corporum viſcerumque robur reſoluitur. Viſtus ſedulo conſiderandus, et potio idonea aegro praeſtanda eſt. Cibus ſit paucus, corporis motus, ſi id res patitur, magis continuus quam vehemens. Plurimum proficit equitatio. Somnus, quantum fieri poteſt, ſit longus et quietus, alius ſemper laxa. Vinum non niſi triſtioribus, alcaleſcente acrimonia laborantibus, numquam furioſis, praeſtandum eſt. Maniacos haud opinantes nonnulli in aquam praecipitare ſolent. Terrore quandoque deletur idea et homo ad ſe redit, numquam vero tollitur mala materia corporis. Etiam ex ſimili terrore interdum morbus exaſperatur. Semper videndum eſt, inprimis ſi morbus ex aliqua idea ortus fuit, vt illa contrariis deleatur et eradicetur. Timidorum itaque animus erigendus eſt. Audacioribus et furibundis incutiendus eſt metus ac terror. Triſtibus grata quandoque eſt muſica; ſalaciores flagris coërcendi ſunt, &c. Prae ceteris neceſſarium eſt iter, Torcorum et obiectorum mutatio. Numquam melancholico exprobreſtur ſtultitia, ſed Medicus ante omnia eritatur, vt aegri habeat confidentiam. Peſſimum enim eſt, ſi melancholici Medicum timent vel aſpernantur et nullum auxiliorum genus admittunt.

* * * * *

MORBI GRAVIDARVM

ET

PARTVRIENTIVM.

STERILITAS.

§. 664.

Sterilitatis caussa frequentius in foemina est, quam in viro; accidere tamen potest, vt inter maritum et vxorem sit sterilitas, quae cum aliis non est, quam nonnulli relatiuam vocant. Foeminae ex variis caussis steriles sunt. Prima caussa est mala partium conformatio, quae nullum, nisi in atretis, auxilium admittit. De his vide Chirurgiam. Si foeminae nimis obesae sunt, omentum altius descendit, comprimitque vterum et eius ceruicem. His non aliud remedium est, quam parcior victus, corporis exercitatio, aquarum mineralium vsus, quibus omnibus corpus tenuatur. Frequentissima caussa est catameniorum fluxus deficiens, vel aliter vitiat. Hoc corrigi debet. Post abortum et partum difficilem, maxime, si adhaerentes secundinae digitis auellendae fuerunt, foeminae steriles interdum fiunt, si interior vteri pars laesa fauciataque et suppurata fuit, ex qua occasione etiam interdum Tubarum Fallopiarum ora, in vterum naturaliter aperta, exulcerantur et post glutinantur ocludunturque. Nec hoc vitium facile auxilium admittit. Non raro ex partu relinquuntur in vtero secundinarum partes, quae in molas increscunt, id quod inprimis accidit, si post partum vel abortum mulieri lochia non recte proueniunt, vel si nimia haemorrhagia adstringentibus fuit cohibita. His foeminis, nec non iis etiam, quibus quandoque tenacior mucus in vtero haerere videtur, proficiunt Thermae, vel si harum opportunitas non est, balnea

nea domestica. Mulier sedeat super sacculum herbis fragrantioribus plenum. Idoneae sunt herbae, Parietariae, Absynthii, Matricariae, Melissae, Maioranae, Artemisiae; flores Verbasci, Chamomillae. Sacculus alius superhaberi potest abdomini. Cum his balneis bibat Infusa per epicrasin laxantia, aquas minerales, et sumat cum his pilulas Becheri. Haec omnia vero accommodanda sunt ad foeminarum temperiem et corporis habitum.

§. 665.

Saepe Sterilitatis causa est a nimis relaxatis genitalibus et fluore albo, id quod accidit ex frequentiori partu, magna haemorrhagia, nimio coitu. Profunt aduersus fluorem album auxilia supra proposita. Adhibenda sunt simul roborantia: vinum rubrum Pontac, quod potioni praestandum est. Medicamenti loco est hoc vinum, si in eo ferrum candens exstinguitur. Dari etiam possunt, praemissis aliis, martialia. Genitalibus admoueantur fomenta ex roborantibus. Profunt suffitus, ex Gummi Elemi, Olibani, Aminae. Sedulo autem videndum est, ne his turbentur catamenia, et ne nimis celeriter cohibeatur aliud profluuium, cuius mala materia non raro scirrhum parit, interdum in viscera conuertitur. Plurimum valent Thermae Toeplicenses, quibus, si primae viae atque viscera abdominis ipseque vterus laborant, praemittendae sunt Carolinae, per plures dies potandae.

VOMITVS GRAVIDARVM.

§. 666.

Eo plerumque primis mensibus, maxime horis matutinis, vexantur. Non ita timendus est, magis vero is, qui ultimis gestationis temporibus incidit, et qui, nisi a malo victu et repletione ortus fuerit, saepe abortum futurum significat

significat. Oritur hic vomitus a redundantia humorum ad ventriculum, et difficilius illorum per eius membranas transitu; plurimum tamen conferunt cruditates in eo relictæ. Humores vero, qui per genitalia excerni non possunt, ad reliqua viscera abdominis, et ad ipsum præcipue ventriculum conuerti, alia in Pathologia obseruata ostendunt. Hic vomitus tolerari debet, nisi vehementior fuerit. Plurimum illum leuant pulueres ex Rhabarbaro, addito Nitro et Conchis præparatis. Vbi vero tamen vehementer vrget, et propter conuulsionem musculorum abdominis abortus metum adfert, sanguis mitti debet ex brachio, præmissis iisdem pulueribus. In corporibus robustis, et si copiosior et tenacior pituita vomitu cum multo labore reiiicitur, quandoque non aliena est Ipecacuanha ad scrup. j. addito Sale cathartico et epotis simul multis diluentibus. Sic enim sæpe ventriculus expurgatur et auertuntur laboriosi illi nixus; caute tamen cum his agendum est. Quum hoc auxilium non omnibus opportunum sit, maior securitas est in Rhabarbaro.



ALVI OBSTRVCTIO GRAVIDARVM.

§. 667.

Hac sæpe vexantur grauidæ, ex qua sola non raro abortus sequitur, quod ab induratis coaceruatisque acrioribus fecibus spasmi concitantur. Imperandus est potus sufficiens, diluens victus mollior, ex iusculis carniū iuniorum, fructibus horacis aëre siccatis, præcipue prunis Damascenis, Passulis. Dari possunt Passulæ cum Rhabarbaro coctæ. Sæpe proficit potus Caffee cum lacte. Si hæc non leuant, recurrendum est ad clysteres, quos tamen nec feruidos, nec acres

acres esse oportet. Optime fiunt ex auena excorticata, addito oleo et pauco sale. Interdum decoctum dari potest Mannae cum Cremore Tartari; vel Manna sola, quae cum fabis Caffee coquitur. Plurimi vsus sunt pulueres ex Rhabbarbo, Nitro et Conchis praeparatis, qui tamen magis proficiunt, si primis viis inhaerent cruditates, ex quibus etiam nonnumquam abortus sequitur; alium autem pertinaciter obstruam melius soluit Manna.



DIARRHOEA GRAVIDARVM.

§. 668.

Diarrhoea non sine periculo est, praecipue si accedunt spasmi vel febris. Protinus dandi sunt Pulueres ex Rhabbarbo et absorbentibus, praecipue Coralliis, addito pauco Nitro, quod vltimum magis necessarium est, si aegra de siti et aestu conqueritur. Post Rhabbarbari vsum conveniunt iuscula tenuiora, quibus accedente febre succus Citri miscetur. Si autem diarrhoea sine febre est et a refrigerio orta, ea cum seminibus Carui et Nigellae contusis commode coquuntur. Dari etiam potest Mixtura ex Essentia Castorei, Corticum aurantium, Liquore anodyno. Conducunt pulueres ex Castoreo cum Coralliis, quae cum aquis destillatis, Melissae sine vino, Corticum aurantium, deglutiantur. Si malum pertinax est, confugiendum est ad sopientia, praecipue ad Diascordium Fracastorii. Euitandum est refrigerium, praecipue pedum.

See page 431

FOETVS



FOETVS IMBECILLI CVRATIO.

§. 669.

Saepe grauidae abortum metuunt, si foetus se mouentis impetum non sentiunt. Videndum est, num alia signa adsint, quae foetum haud rectum valere ostendunt. Et his caussis accommodanda est curatio. Perniciosa saepe sunt medicamenta analeptica calida, tum intus sumta, tum abdomini illita, quae foetum roborare vulgo dicuntur. Tolerari potest minor cyathus vini generosi, aqua Cinnamomi cydoniata, et abdomini illitum Balsamum Embryonum, vel aqua Reginae Hungariae. Vehementior commotio foetus maiorem futuri abortus metum affert, quam eius quies.



PARTVS DIFFICILIS.

§. 670.

Varias caussas variaque auxilia docet Chirurgia. Hoc tenendum, non solum a peruerso situ ipsius foetus, sed etiam ab alieno situ vteri partus difficultatem oriri. Antequam os vteri internum satis dilatatum est, partus numquam accelerari, nec facile membranae digitis dilacerari debent. Id vero necessarium est, si ex auulsa placenta periculosior oritur haemorrhagia. Primiparis et annosioribus ante partum conducunt balnea, numquam feruida, sed tepida. Insedeant in balneo super saccum ex herbis emollientibus. Durante partu genitalibus illinuntur vnguentum pomatum, butyrum sine sale, oleum Liliorum alborum.


DOLO.



DOLORES NOTHI ET VERI.

§. 671.

Dolores nothi, seu spurii, distinguendi sunt a veris. Dolores veri sunt spasmi musculorum abdominis, quibus vterus comprimitur, et ipsius, vt videtur, vteri, sub quibus eius os internum ampliatur. Dolores veri a lumbis incipiunt, diutius durant, per inguina descendunt ad imos vsque pedes. Dolores vero nothi vagi sunt, colicis similes, vel lumbos occupant, non vero ita descendunt. Maximum vero criterium est, si inter dolores orificium vteri internum commouetur, et post magis magisque ampliatur. Doloribus nothis medentur clysteres ex lacte et emollientibus, Rhabarbarum cum Nitro et absorbentibus, et alia supra proposita; extrinsecus Balsamum embryonum.



VRINAE SVPPRESSIO GRAVIDARVM.

§. 672.

Non omittenda est vrinae suppressio, qua grauidae plurimum vexantur. Illa oritur ab haemorrhoidibus, calculo et aliis causis, quibus spasmi harum et vicinarum partium excitantur. His medentur clysteres, balnea, fomenta, genitalibus admota. Interdum tamen pertinacior vrinae suppressio oritur, quando caput infantis, in anteriora inclinati, ceruicem vesicae premit. In hoc casu quandoque nec demisso in vesicam cathetere, vrina educi potest, quod vltimum ceteroquin auxilium esse solet. Igitur si hanc causam esse nouimus, supina collocanda est mulier, coxis elati-

Et

tioribus

tioribus, demissiori capite. Duo digiti in vaginam vteri demittendi sunt, quibus modeste, nulla vi adhibita, paululum in posteriora inclinari potest infantis caput. Vrina tunc vel sponte effluit, vel demisso in meatum vrinae cathetere euocatur. Nonnumquam mulieres vexantur vrinae incontinentia. Si hoc ex eo incidit, quod foetus vesicam premit et angustiore reddit, nullum auxilium est; si vero vrina acrior est rodensque, necessaria sunt fomenta et frequentiores genitalium lotiones. Potus etiam detur diluens.



DE CVRA MVLIERIS SVB PARTV.

§. 673.

Ante partum, et quidem vltimis diebus, plethoricis et adfuetis iterum mitti potest sanguis ex talo. Hac sanguinis missione respiratio facilius redditur, ita, vt mulier partum melius eniti possit. Auertitur etiam febris et inflammationis metus. Ante omnia videndum est, vt alius libera sit eo tempore, quare protinus illa ducatur clystere, praecipue si intestinum rectum fecibus induratis repletum est. Sunt, qui tempore partus pilulas Becheri aqua Melissae soluunt et mulieri exhibent, id quod in phlegmaticis, et in quibus nulla haemorrhagia metuenda est, et quae etiam haemorrhoidibus coecis non vexantur, fieri potest. Sub partu imperandum est mulieri, ne vel vrinam, vel aluum contineat, id quod pestiferum foret. Sub partu nocent omnia medicamenta cardiaca, analeptica, immo etiam iuscula meraciora. Videndum est, ne ventriculus potione nimium impleatur. Si dolores deficiunt, id quod, si omnia recte fiunt, et si infans recte collocatus est, rarum esse solet, dari potest Syrupus Capillorum Veneris ad vnciam j. cum aqua quadam destillata, v. g. Ceraforum, Melissae
sive

sine vino, addita aqua Cinnamomi sine vino. Conducunt pilulae Becheri, aqua Melissae vel Corticum Aurantiorum solutae. Plurimum tribuunt Borraci Venetae, cuius scrupulum vnum vel drachmam dimidiam admiscant potiunculae analepticae; reliqua parum proficiunt. Genitalia vngenda sunt et lubricanda. Membranae vero, nisi illud summa necessitas postulauerit, numquam rumpendae sunt. Amnii enim liquore optime lubricantur genitalia. Si, aperto orificio interno vteri, membranae aequales, rotundae, turgidae, digito obuersae sunt, signum est foetum recte collocatum esse.

§. 674.

Post partum puerpera refici potest dato pauxillo vini, nisi sanguinis profluuium illud prohibeat. Omni studio vitari debet, ne aër in vterum irruat, quare genitalia panno calido contegenda sunt. Obstetrix educere debet secundinas protinus, antequam os vteri iterum contrahitur. Non raro necesse est, ut demissa in vterum manu, mediantibus digitis illas diducat; quomodo id fieri debet, docet Chirurgia. Aër in conclavi nec frigidus sit, nec calidus. Remouendus est omnis strepitus nimiaeque lux, et ex praeccepto HIPPOCRATIS foemina curanda ut grauitur vulnerata. Si magna imbecillitas est, prima alteraque hora somnus non ita bonus est, et ab eo prohibenda est mulier; post vero nihil magis ad reficiendas vires idoneum est, quam placidus somnus. Mulier abstineat primo alteroque die ab omni cibo, omnique potu fermentescente frigido. Nocent iuscula meraciora. Ministranda sunt iuscula tenuiora pulorum, non nimis calida, vel etiam iuscula ex aqua cum farina et cereuisia secundaria, &c. Multum conqueruntur foeminae post partum de doloribus (germ. *Nachwehen*). Nihil aliud sunt quam spasmi, quibus sanguis coactus aliaque, quae in vtero haerent, expelluntur. Primiparae illis non facile vexantur, quod in his vterus se longe celerius et maiori vi contrahere solet. In aliis auertuntur hi dolores, si

mox post partum obstetrix manum demittit in vterum apertum, et sanguinem coactum aliaque, quae in eo haerent, praecipue si mola adest, eam extrahit. Vbi vero iam contractum est os vteri, tolerandi sunt illi dolores, numquam, nec sopientibus, nec nimium temperantibus, cohibendi. Danda sunt illa iusecula, quibus admisceri potest oleum amygdalarum dulcium recens. Abdomen fascia recte accommodata moderate, non tamen nimium, adstringendum est. Ceterum ea obseruanda sunt, quae alibi de Lochiis pellendis dixi. Si dolores illi ab admissio genitalibus refrigerio orti videntur, fomenta emollientia, panni scilicet ex decocto emolliente expressi, admoueri possunt genitalibus. Nocent spirituosa genitalibus admota, nocet etiam nimius calor et stragulorum pondus.



VTERI INFLAMMATIO.

§. 675.

Atrox morbus, saepe etiam partum et abortum sequitur. Dum enim vterus post partum contrahitur, vasa coarctantur, et sanguinis circuitus, accedentibus spasmis aliisque causis, impeditur. Hoc vero fit, si ab obstetricia manu laesus, vel ad minimum in difficiliore partu multum vexatus fuit, si placenta vi fuit diducta, vel si haec dilacerata et ex parte fuit relicta. Praecipue autem hoc incidit, si lochiorum fluxus fuit coercitus ab admissio genitalibus, praecipue post partum et aperto adhuc orificio interno, refrigerio, ab animi perturbatione, ira, terrore, ab adsumtis frigidis aliisque incongruis flatulentis, potu praecipue frigido. Magis obnoxiae sunt huic morbo mulieres cacochymia, fluore albo, chlorosi, malo hysterico, spasmis, neruorum imbecillitate laborantes. Non solum in puerperis, sed etiam in aliis vterus quandoque, rarius tamen, inflam-

inflammari potest, si haemorrhagia repente adstringentibus valentioribus fuit cohibita, vel si fluor albus externis adstringentibus fuit curatus, etiam a laesione violenta per illas plagas atque vulnera. Quandoque foetus in vtero demortuus et putrescens labem relinquit, quae post hunc in lucem editum inflammationem adferre potest. Nec omitendum est, in puerperis febrem lacteam, si nimium ingrauescit, quandoque lochiorum obstructionem, et hanc vteri inflammationem adferre posse, praecipue si calidiora medicamenta propinantur ad pellenda lochia.


§. 676.

Differt vero inflammatio, quae etiam variis modis solvitur. Nam quandoque saltem vteri interior pars et quasi superficies laborat, quae inflammatio solvitur interdum sudore, interdum purpura, saepius levi suppuratione intus in vtero orta, quam humor purulentus, foetidus, qui remittente se febre ex genitalibus effertur, significat. Nonnumquam vterus scirrhus manet, qui scirrhus saepe in cancerum mutatur, quales foeminae miseram vitam trahunt. Aliud vero inflammationis genus est, quod totum vterum occupat, et quod tandem in funestum sphacelum mutatur. Hoc cognoscitur a praegressis causis, laesione in partu difficili, a cohibitis repente lochiis, ex inflatione abdominis, ex dolore inflammatorio ardente in regione hypogastrica; accedit febris inflammatoria vehementissima cum omnibus suis symptomatibus, tenesmus, frequens mingendi ac desidendi desiderium, tandem diarrhoea et excretio omnium praeter voluntatem. Septimo vero die mors. Profunda haec inflammatio raro solvitur purpura alba, ex qua tamen non minus periculum imminet.

§. 677.

Averti potest vteri inflammatio in foeminis, si ante partum moderato victu utuntur, si alius ducitur Rhabarbaro, et si plethoricis sanguis mittitur. Praeterea obseruan-

da sunt omnia, quae ad lochiorum fluxum facere possunt. Euitandae sunt causae. Si febricula adest cum calore, danda sunt medicamenta temperantia. Confer omnia, quae supra de lochiis dicta sunt. Ad solvendo spasmus facere potest oleum amygdalarum dulcium recens sine igne expressum, cum potu diluente, parum calido, emolliente. Ad sanguinis missionem non protinus ac temere confugiendum est, quippe quae saepe lochia magis turbantur. Si vero inflammatio magna est, et causa magna fuit, et si symptomata ingrauescunt, illa differri non debet. Nec omittenda sunt enemata emollientia. In foeminis hystericis, quae spasmis facile obnoxiae sunt, cum medicamentis absorben-
tibus dari quandoque potest Castoreum, ad gr. viij. vel scrupulum dimidium, cum aqua destillata Melissae sine vino. Auertendae huic inflammationi etiam inseruiunt pilulae Becheri, quibus saepe lochia optime restituuntur. Talia vero dari debent, ubi aestus non magnus est et malum recens.



GENITALIVM TVMOR.

§. 678.

Si genitalia ex difficili partu intumuerunt, parari possunt epithemata ex decocto florum Chamomillae, Verbasci cum lacte, vel ex decocto auenae excorticatae, quae calida genitalibus imponantur.


DIAR.

* * * * *

DIARRHOEA PVERPERARVM.

§. 679.

Diarrhoea puerperis oritur ex variis causis. Magnum metum facit, si est cum inflammationis signis. Non est symptoma inflammati vteri. Quandoque oritur a refrigerio et potu frigido, quandoque a lacte represso. Quod ea frequentior est et quo maior tenesmus, eo magis timenda. Dari debent pulvres ex Rhabarbaro et medicamentis absorbentibus. His praemissis, conducit Diafscordium Fracastorii. Plurimum conferunt infusa tenuiora pullorum cum oleo amygdalarum dulcium recenti. In aluum immitenda sunt enemata ex lacte, vitello oui, decocto emolliente, nullo adhibito stimulo.

ABDOMINIS TUMOR
POST PARTVM.

§. 680.

Post partum saepe intumescit abdomen sine febre et inflammationis signis, qui tumor etiam manet. Oritur a neglecta vinctura abdominis post partum, saepius vero a potu frigido et adsumtis copiosioribus alimentis per primos post partum dies, nec non ab admissio refrigerio. Malo recenti medentur pilulae Becheri, praecipue si tales, fluentibus adhuc lochiis, per aliquot dies dantur. Superbibatur Decoctum radicis Althaeae, Scorzonerae, Cichorei; herbae Capillorum Veneris, Maluae; florum Chamomillae, Sambuci, addito paucis semine Foeniculi. Post lochiorum fluxum dari possunt Infusa per epicrasin laxantia, et cum his adhiberi balnea. Malum inueteratum nullam curationem admittit.

Ee 4

FEBRIS



FEBRIS LACTEA.

§. 681.

Tertio circiter die lac irruit in mammas, cum quo hor-
ror et febricula incurſat (Germ. *ein Milchſchauer*).
Nullum inde periculum metuendum, niſi febris valde vehe-
mens et cum aliis ſignis ſit. Nec opus eſt medicamentis.
Si tamen metus fuerit nimiae febris, dari poſſunt puluilli
ex Margaritis vel Matre perlarum, lapidibus Cancrorum
cum acido Citri, addito pauco Nitro. Si vero lac in iis,
quae partum lactare nolunt, reprimendum eſt, protinus, et
decima circiter poſt editum infantem hora, mammae ſcacia
attolli et moderate adſtringi debent, id quod in mammoſis
mammasque penſiles habentibus valde neceſſarium eſt, qua
ſcacia prohibetur, quo minus lactis nimia viſ mammas re-
pleat. Imponi etiam poteſt Emplaſtrum compoſitum ex
Emplaſtro de Spermate Ceti et diaphoretico Mynſichti.
Neceſſe eſt, vt emplaſtra foramina habeant pro papillis ex-
cipiendis. Eo tempore dari poteſt lenis catharticum, quod
eo magis neceſſarium eſt, ſi alius adſtriſta fuerit. In cor-
poribus raris, ſic diſtis phlegmaticis, dari aliquoties poſ-
ſunt pilulae Becheri, quae vero, ſi haemorrhoidum metus
eſt, alienae ſunt. Foemina abſtineat ab omnibus iurulentis
et a potione valentiori. Si vero infans, poſtquam adoleuit,
a lacte depellendus eſt, imponi poſſunt eadem emplaſtra, et
dari poteſt efficacius catharticum ex Sale cathartico cum
Magneſia, vel datis pilulis ex Extracto panchymagogo, Mer-
curio dulci, Diagrydio, &c. Si res poſtulat, tale cathartici-
cum iterum dari poteſt.

§. 682.


Lactis defectum cognoviſimus, ſi mammae nimis flacci-
dae et penſiles in lactantibus ſunt, et ſi ex illis vel nullum,
vel paucum exprimi poteſt; ſi nutrix de imbecillitate et do-
loribus

loribus colicis conqueritur. Non raro nutrices debiliores ex infantis robustioris suctu animo linquuntur. Infantes parum dormiunt, sed vagiendo mammam quaerunt. Variæ huius rei causæ sunt, quandoque ductus galactophori nimis tenues vel concreti, quod iis præ ceteris accidit, quibus olim post alium partum lac repressum fuit. Hoc etiam accidit ex animi pathematibus, moerore, amore, desideriis Veneris, ex Venere, et si mulier iterum concepit, ex agrypnia, defectu alimentorum. Saepe verò lactis defectus ex eius abundantia nascitur. Nam si tenellus infans non omne lac exfugere potest, illud in mammis relictum cogitur et dolores mouet, tandem vero, alias vias ingressum, iterum sanguini admiscetur. Quare cura habenda est, ut his nutricibus lac exfugatur, vel ab alio infante, vel a muliere, vel a catello, vel adhibitis etiam varii generis machinis. Saepe lac deficit vel alienatum varia incommoda pueris affert, si lactanti catamenia fluunt, quæ in nonnullis, non vero omnibus lactantibus prouenire solent. Lac etiam ætati infantis debet esse accommodatum, et semper melius est infanti neonato tenue, non nimis pingue, quod primis post partum mensibus in corpore conficitur. Primis post partum diebus illud admodum serosum, Colostrum dicitur, quo etiam alius infanti soluitur. Bonum lac debet esse albidum, hand flaescens, nec nimis cœruleum, nec nimis caseosum, palato gratum, sine odore, quod non nimium pingue est, vel cremorem habet, sed non nimium.

§. 683.

Lactis defectui medendum est, remotis, si fieri potest, causis, addito congruo victu, moderata corporis exercitatione, somno etiam et animi tranquillitate. Ceteroquin danda sunt iuscula ex carnibus, etiam ex cereuisia bene defecata, cum lupulo cocta, non acescente, addito Semine Carui vel Nigellæ contuso. Nec alienæ sunt emulsionēs. Si vero cruditas in primis viis est, danda sunt absorbentia. Plurimum tribuunt Crystallo montanæ bene tritæ, quam

nostrates *das Milchpulver* vocant. Dari potest cum aliis. Non quidem valentes purgationes adhiberi debent, saepe tamen profunt ad educendas sordes pulueres ex *Rhabbaro*. Cum his vero mutari debet victus, et si lac in ventriculo infantis coacuit, abstinendum est nutrici ab omnibus fermentescentibus et acidis vegetabilibus. Danda sunt iurulenta, pisces, carnes assae, si fieri potest, et potioni praestanda est vel aqua simplex fontana, vel decoctum *Eboris* aut *Cornu Cerui*. Vbi vero infans febre laborat, veluti ex dentitione, variolis, tunc omnia iurulenta aliena sunt. Proficiunt vegetabilia, non nimis tamen acida. Potioni praestanda est *Cerevisia* tenuis, decoctum *furfuris*, vel in valentioribus decoctum panis domestici.



MORBI INFANTVM.

§. 684.

Infantēs pluribus morbis obnoxii sunt, non solum propter partium solidarum teneritudinem, sed maxime etiam propter neruorum copiam et exquisitiorem omnium mutationum, quae illis accidunt, sensum. Abundant etiam *Lympha*, quae, si quiescit, corrumpitur, et varios morbos, praesertim *ulcera cutis*, parit. Non raro etiam morbos a parentibus per haereditatem accipiunt ex semine effoeto et venerca tabe infecto geniti. Matres sunt hystericae, quae, tempore gestationis, grauioribus animi perturbationibus, *Veneris* abusu, nimia quiete, incongruo victu ac inglutie, et proprium et foetus in visceribus haerentis corpus infirmant atque enervant. Plures morbi nascuntur ex vitiatō lacte, nec non ex victu, pulibus spissioribus, carnibus, ex potu acescente, maxime si hic cum lacte offertur, potu nocturno, &c. Multum confert neglecta mundities, si infantes in sordibus relinquuntur et insensibilis respiratio reprimatur, id

id quod etiam fit, si tenelli, lectulis et linteis fere oppressi, tempore nocturno nudantur et frigori exponuntur. Plures funestosque morbos parit dentitio, ex qua frequentius conuelluntur. Propter neruorum abundantiam epilepsia huic aetati frequentissima est.

§. 685.

Infans in lucem editus, obligato, vt decet, vmbilico, protinus demittitur in balneum, quod nec frigidum, nec feruidum esse debet. Praeter necessitatem affundunt balneo vinum, quod fieri potest, si infans valde debilis est. Abstergendae enim sunt sordes mediante spongia, vel etiam adhibita farina fabarum, quae, si aëre indurantur, non absque dolore abraduntur. Cura habenda est vmbilici, qui, vbi siccatus est, sponte separatur; vlcus relinquit, si non recte fuit deligatus. Si prominet et super eum tumor manet, superdandus est globulus ex cera, qui fascia adstringitur, atque per aliquot menses superhabetur. Linteis et fasciis comprehendere debet infans non nimium adstrictis. Caput, quod sub partu nonnumquam distorquetur, manu reponendum est. Id vero fiat magna diligentia adhibita, ne cerebrum offendatur. Oculi a luce primis diebus prohibendi sunt. Cunae ita collocandae sunt, ne oculos lux offendant, et ne oculi in latus distorqueantur, et strabismus contrahant. Nihil tamen perniciosius est, quam si cupae et totus infans linteis operiuntur, et sic omnis aëris reciprocatio prohibetur, qua re multum laeditur respiratio.

§. 686.

Expurgandum est meconium, id quod, si mater alit puerum, fieri potest mediante colostro; si vero is nutrici committitur, protinus post partum dari debet catharticum. Syrupus hic praestat olco amygdalarum dulcium, quod alii dare solent. Si vero mucus tenacior in ventriculo haeret, id quod ex impedita respiratione, rhoncho, et irritato vomendi conatu scire licet, illi Syrupo admisceatur oxymel squil.

squlliticum ad drachm. j. vnam et dimidiam, vel duas; alia emetica aliena sunt.

§. 687.

Per duodecim horas post partum nec mamma, nec alius cibus dandus est infanti. Nocent alia, quae quandoque a nimis officiosis mulieribus ad auertendas alias valetudines roborandumque infantem dari solent. Si fieri potest, primis temporibus solo lacte alendus est infans. Mamma porrigenda est certo tempore, et non alio, quam post absolutam in nutrice chylicationem. Perniciosissimum est, si mamma praebetur infanti per iram atque vagitum perturbato. Potus nocturnus numquam bonus est, fermentescens vero pestilentissimus. Si tandem increscens foetus plus alimenti desiderat, dandae sunt pultes, quae optime coquuntur ex pane candido arido cum lacte tenui, vel ex farina crassiori, germ. *Griess*. Pultes esse debent sine butyro et ovis, nocet etiam lac nimis pingue. Sedulo considerandus est in nutrice victus et ceterarum rerum non-naturalium usus.

§. 688.

Si infans post partum valde debilis est, et propter summam imbecillitatem respirare nequit, pulmones distendi sunt halitu et spiritu in os immisso, quo pulmones distenduntur. Lauandus est infans vino, quod etiam admoueri debet naribus. Confert etiam halitus ex masticatis caryophyllis. Volatilia, naribus admota, infantibus non ita opportuna sunt, et neruorum distentionem parere possunt.

§. 689.

Saepe infantes non recte sugunt. Protinus ad Chirurgiam properant, putantes, frenulum linguae suctionem impedire, id quod autopsia docet. Tunc incidendum est frenulum; saepe tamen infans vel debiliior est, vel articulus maxillae inferioris nondum satis mobilis. Nonnumquam laetantis papillae iusto maiores sunt. Si illae depressoiores fuerint, foeminae adultae suctione valentiori educantur.

§. 690.

§. 690.

Si infantes torminibus vexantur, id quod ex vagitu aliisque symptomatibus cognoscimus, danda sunt leniora cathartica, Syrupus de Cichoreo cum Rhabarbaro, Syrupus florum Perficorum, &c. Optimum vero est medulla Rhabarbari studiosius selecta et in puluerem trita, additis aliquot granis Nitri et Matris Perlarum vel Crystalli montanae. Talis puluilli et quidem Rhabarbari grana v. vel vi. pro vna dosi dari possunt tenerioribus infantibus, et si id visum fuerit, iterari. Sedulo inquirendum est, num error commissus fuerit a lactante, num illa alui segnitie laboret, num ei catamēnia fluant, &c. Huic, nisi aliquid prohibeat, dari possunt pulueres ex Nitro, Arcano duplicato, Crystallo montana, puluere Marchionum, vel aliis absorbentibus. Si infans alui segnitie laborat, profunt Enemata.

§. 691.

Rhöncho saepe laborant infantes et difficill respiratōne. Plerumque oppletus est ventriculus, quare protinus dari possunt laudata cathartica, Rhabarbarum vel Syrupus de Cichoreo cum Rhabarbaro. Huic Syrupō adiici possunt drachmae ij. vel iij. Oxymellis squillitici. Cum his proficiunt Enemata modo proposita. Si pituita tenacior est in ventriculo, aliquot grana, iij. vel iv. radicis Ireos Florentinae bene tritae offerri possunt cum pulte. Sed efficacius est Oxymel. Sapo Venetus etiam ad gr. iij. - v. - viij. cum vitello oui tritus solutusque, pulti admisceri et dari potest. Si lubricantibus opus est, exhiberi potest Eleosaccharum.

§. 692.

Cardiognus, germ. *das Herzgeßpann*, oritur ut plurimum ex inflato ventriculo, atque si lactis coagulum pyloro inhaeret, saepe etiam ex flatibus in intestinis, praecipue in duodeno et colo. Nocturna vigilia cum vagitu est, spiritus cum difficultate trahitur, et circulus luridus conspicietur circa oculos. Protinus confugiendum est ad enemata,
et

et danda est Medulla Rhabbarbari cum Nitro. Non inutiles sunt fricationes hypochondriorum. Abdomini illini potest oleum Anethi recens, adiectis aliquot guttulis olei destillati carminatiui. Vulgus multum extollit butyrum crudum. Cohibita per haec oleosa expiratione, humor intus vertitur, et infarctus mobilis redditur. Si vero Cardiognus vel Asthma orta sunt a repressis exanthematibus vel a refrigerio, alius clystere ducenda est, non vero aliis catharticis, sed danda sunt diapnoica, praecipue Antimonium diaphoreticum rite praeparatum cum aqua florum Sambuci.

§. 693.

Comedones, germ. *die Mireffer*, sunt glandulae sebaceae MORGAENI, materia sebacea spissescente repletae. Molestum sensum afferunt et infantes a somno prohibent, quare tandem oritur macies vera et tabes. Plures existimant esse vera insecta, quae in nonnullorum scriptis delineata cernuntur. Nec omnino negandum est, eiusmodi vermiculos in illis folliculis nidum opportunum inuenire posse, id quod in vena Medinensi Arabum alii deprehenderunt. Saepius tamen et plerumque praeter sebaceam materiam nihil exprimitur. Huic morbo medentur balnea, adhibita simul magna cura, ut infantes frequentius novis linteis contegantur. Nam plerumque hoc vitium a munditiae neglecta oritur. Vbi per balnea cutis emollita est, exprimendi sunt folliculi prominentes cultello, et euocanda est materia sebacea. Plurimum confert fricatio cum linteo asperiori. Balnea sunt ex aqua fluuiatili, melius ex lacte, ex quibus etiam coqui possunt emollientia. Nec decoctum Furfuris alienum est.

§. 694.

Narium obstructio saepe suctionem et deglutitionem impedit. Nonnumquam vitio laborat ventriculus, et ante omnia alius ducenda est dato Syrupo quodam vel puluere Rhabbarbari. Nutrici dari possunt pulueres temperantes
cum

sum Nitro. Nec alienum est decoctum vel Infusum aquosum florum Chamomillae, addito pauco semine Anisi vel Nigellae. Infanti potest dari pulvis Glycyrrhizae cum pulvere. Extrinsecus naribus admoveantur emollientia cum lenioribus ptarmicis. Vulgus butyro cum maiorana nares, tum circa radicem extrinsecus, tum intus illinire solet. Proinde etiam lac tepidum mediante siphunculo in nares potest immitti.

§. 695.

Intertrigo est excoriatio cuticulae in variis sedibus, maxime sub alis, inguinibus, perinaeo et auribus. Fit ab humore acri. Humida in infante hoc vitium contrahunt a victu lactis falso vel acefcente. Maxime vero hoc vitium oritur in infantibus a neglecta munditie. Causae tollendae sunt et obseruanda mundities. Infanti alius ducatur Rhabbaro. Extrinsecus lauandae sunt partes aqua calida, cui, si malum pertinax est, adiicitur aqua sclopetorum, vel octaua aut decima pars vini adusti. Lintea saepe mutanda sunt, et vbi fricatio metuenda, interponendum est linteam carptum. Si vero exulceratio iam profundior est, adhibenda sunt leniora siccantia; ad valentiora enim nec temere, nec protinus confugiendum est, id quod inprimis obseruari debet, si madent aures. Parari potest linimentum ex mucilagine seminis Cydoniorum, addito pauxillo Cerussae et Antimonii diaphoretici. Etiam oleo Liliorum alborum admisceri potest vnguentum album camphoratum, addita Cerussa. Plerumque vtuntur pulueribus ex farina volatili, Cerussa, Cornu Cerui vsto et Antimonio diaphoretico. Siccantur quidem vlcera, difficiliter vero separantur crustae. Si vlcera vetustate et negligentia curationem non recipiunt, Cerussae admisceri potest Mercurius dulcis, paucus tamen.

§. 696.

Dentitio difficilis varia habet symptomata, non raro funesta, febrem, conuulsionem, epilepsiam, diarrhoeam,
alui

alui pertinacem obstructionem, agrypniam, tussim. Optimum est, si infantes sub dentitione diarrhoea laborant. Si illos febris tenet, non facile conuulsiones timendae sunt. Nam ubi anxietas est, vigilia et inquietudo sine febre, et si corpus haud calet, plerumque imminet neruorum distentio. Bonum etiam est, si multa salua ex ore effluit. Si dentitio cum tussi est, haec plerumque solet esse conuulsiva, quae non nisi erumpentibus dentibus finitur. Plerumque malum pertinacius est. Nulla sunt medicamenta, quae proprie dentitionem iuuare possunt. Purgandae sunt primae viae, non alio vero medicamento, quam Rhabarbaro. Si aluus obstructa est, in eam immittantur lotiones mollientes. Si aestus vrget, dari possunt potiunculae ex temperantibus et diapnoicis, addito etiam Specifico cephalico. Repurgatis primis viis, conducunt Emulsiones ex semine Papaueris, Amygdalis, addito Syrupo emolliente de Althaea. Extrinsecus comprimantur gingivae corpore duro, dente lupi, vel crusta panis. Emolliuntur gingivae, si lintheum, bacillo adligandum, demittitur in mel, et hoc gingivae pertractantur, quales formulas habet BOERHAAVIUS. Is etiam laudat cremorem florum Sambuci. Flores Sambuci recentes lintheolo includunt, quod adpenso plumbo, ut fundum petant, demittitur in vitrum rotundum cylindricum, superaffundunt lac dulce, quae omnia sic digeruntur moderato calore. Cremor eadem ratione admouetur gingivis. Non facile recurrendum est ad sectionem gingivarum, quam proponit Chirurgia.

§. 697.

Alui obstructioni medentur clysteres emollientes. De his tamen dicendum, crebriorem usum nocere, et coli rectique aliquam imbecillitatem relinquere. Etiam ubi ventriculus, duodenum et intestina tenuia crudis humoribus plena sunt, nihil vel parum sunt enemata; meliora sunt cathartica. Dari potest Manna, eiusque solutio cum infuso tenuiore

tenuiori Thée vel Coffée ad vnciam dimidiam vel vnam. Videndum, vt illa recens sit. Maxime considerandus est victus lactantis. Nocent huic enim omnia, quae alui ficitatem pariunt, inter alia etiam multum panis domestici. Lactanti dari possunt pruna et poma aëre siccata aliaque, quibus aluus lubrica fit. Si lactanti aluus soluenda est, hoc numquam fiat acrioribus vel valentioribus, cum his etiam infantes afficiantur.

§. 698.

Vrinae defectus esse solet, si vrethra non perforata est. Auxilium ex Chirurgia quaerendum est. In aliis oritur a spasmis, admissio refrigerio, vel si aluus adstricta est et intestina flatibus intenta. In hoc casu aluus soluenda est clystere, exhibeantur potiunculae ex aqua Corticum aurantium et Petroselini, addito Nitro, specifico cephalico et teneriore absorbente. Nutrici dari possunt pulueres temperantes, ex aquis diaphoreticis, quibus commode admiscetur Liqueor mineralis anodynus. Extrinsecus abdomini infantis illinatur oleum Anethi, additis paucioribus guttulis olei destillati. Spasmis, etiam vehementioribus, aliunde ortis, medetur oleum Amygdalarum recens cum Spermate Ceti recenti, ex quibus Eleosaccharum parari potest. Si vrina propter lactis defectum pauca est, alia nutrix quaerenda est, vel alendus est infans aliis iusculis, maxime Cremore auenae excorticatae.

§. 699.

Tussis infantum saepe est cum dentitione. Semper videndum, num pulmo, num ventriculus, num vtrumque viscus mala materia abundet. Vix non semper laborat ventriculus, quoniam infantes ea etiam, quae ex pulmonibus efferuntur, iterum deglutiunt. Igitur proficiunt pul-

F f

veres

veres ex Rhabbarbo, praecipue si tussis non clangosa, sed cum stertore est. Vbi vero pulmones laborant, proficit Oxymel squilliticum, quod cum Syrupo quodam, veluti Syrupo Capillorum Veneris, ad drachm. j. vel vnciam dimidiam aut drachmas vj. misceri potest. Si tussis a refrigerio est, dari possunt potiunculae et emulsiones diapnoicae. Si tussis valde clangosa est, proficiunt lubricantia, Syrupus de Althaea, Capillorum Veneris, nec non Sperma Ceti et iusecula ex auena excorticata.

§. 700.

Catarrhus suffocatiuus plerumque oritur a coacto in ventriculo lacte, saepe etiam a dentitione. Alia etiam alimenta cruda, maiori in copia ingesta, occasionem dare possunt, pultes inprimis pingues et spissiores. In hoc casu protinus dandum est lene emeticum, radix Ipecacuanhae bene trita ad gr. iiij-vj. quae commodè offerri potest cum potu Caffee atque Chocolata. Nec alienum est, urgente malo, si gr. iij-iv. salis Vitrioli albi, seu Gillae Paracelsi, aqua soluuntur et cum Syrupo, veluti florum Persicorum, exhibentur. Nonnumquam sufficit digestium, Arcanum duplicatum ad gr. viij. vel scrupulum dimidium, Anima Rhabbarbari ad gtt. xx-xxx. Si malum non ita vrget, propinari potest cum Syrupo Oxymel squilliticum ad drachmas ij. vel iij. Lac, si in ventriculo coactum haeret, efficacius soluit Sapo Venetus, qui commodè cum Vitello oui terendo solui ac pultibus admisceri potest. Post huius usum conducit emeticum vel Rhabbarbarum. Ante omnia vero et protinus ab initio duci debet Enemate, cui vel Sal communis, vel Tartarus vitriolatus cum aliquot granis salis Vitrioli adijci debet. Postquam malum sopitum fuit, adhuc dari debent Rhabbarbarina. Durante insultu pulueres dari nequeunt propter impeditam deglutationem.

§. 701.

§. 701.

Vomitum infantum crebrior, si cetera bona sunt, nihil significat, praeter repletionem lactisque copiam, et in hoc abundantiam Cremoris. Vbi vero infantes aeruginosum eiciunt, dandum est Rhabarbarum et victus lactantis emendandus.



R H A C H I T I S.

§. 702.

Rhachitis a graeco *ῥαχίς* spina dorſi, quae in hoc morbo plerumque distorta eſt. Nouus morbus eſſe videtur, a Veteribus minimum talis, qualis hodie deprehenditur, deſcriptus. Ex Anglia ad nos delatus fuit, vbi ſeculo xvi. primum innotuit, vnde vulgo dicitur morbus Anglicus. Infantes eo plerumque laborare incipiunt intra nonum et viceſimum quartum et triceſimum aetatis ſuae meſem. His caput valde magnum eſt, muſculi macilenti, cutis flaccida. Oſſa circa articulos et epiphyſes intumeſcunt, artus vero in medio incuruantur, vertebrae diſtorquentur, pectus durum eſt, e latere quaſi compreſſum, venae iugulares tumidae, abdomen durum et tumens. Dentes tardius et difficilius erumpunt, mox rursus vitium contrahunt, labant, et carie exeſi cadunt. Reſpiratio fit difficilis et tuſſiculosa, os ſiccum eſt et vox rauca. Ingenio plurimum valent hi pueri, ſodalibus etiam prudentiores, corpus vero valde laxum eſt et infirmum. Quare omnem corporis exercitationem, qua multum deſatigantur, auerſari ſolent. Voraciores ſunt. Si malum inualuit, ſaepe oſſa, frequentius

digitorum manuum pedumque vitiantur, orta in iis spina ventosa. Superuenire tandem solet febris hectica cum summa atrophia, qua confecti emaciatique exstinguuntur. Plures, superato circiter decimo aetatis anno, conualefcunt, detumescuntibus etiam pedetentim ossibus. Ossa etiam vitata interdum ab integris squamae in modum secedunt, ita vt vlcera glutinari possint. In demortuorum cadaueribus omnia fere viscera, praecipue hepar, solito maiora esse solent, sed valde laxa. Pancreas saepe scirrhum. Glandulae mesaraicae tumidae et scirrhosae, pulmones scirrhosi et mucos pleni. Recentiores testantur, etiam medullam spinalem plerumque esse induratum.

§. 703.

Quod ad causam attinet, tales infantes non tam facile a robustioribus et agrestibus hominibus, quam a laute viventibus, imbecillisque et vrbis gignuntur. A parentibus nimirum, qui se quoque quotidie multa calida, addito saccharo, ingurgitant, qui vario cibo, nulla vero corporis exercitatione vtuntur, qui Venere, morbis venereis, frequenti maxime gonorrhoea, aliis morbis exhausti multumque infirmati sunt. Si parentes etiam boni sunt et talis nutritrix est, vel si haec morbo venereo laborat, si in ea scabies aliaque similia vitia male et reprimantibus curata fuerunt, infantes rhachitici fiunt. Plurimum etiam confert victus matris grauidae. Natis infantibus plurimum nocet et eos huic morbo obnoxios reddit, praeter vitiosum lac, alius victus crudus, pultes spissiores, legumina, carnes tenaciores, prae ceteris omnibus potus nocturnus frigidus et acescentis cereuisiae. Plurimum confert neglecta mundaes, et si diutius in linteis vrina fordibusque madentibus iacent. Aer paludosus, refrigeria, inprimis partibus inferioribus admissa, dum infantes diutius in sedecula familiaria relinquantur. Vermes infantes, quamdiu lacte aluntur

tur, raro vexare solent, post vero hunc morbum vel efficiunt, vel multum exasperant. Id quod etiam de infinitis aliis occasionibus, de difficili dentitione, de tineâ, crusta lactea, aliisque vitiis, praecipue male et reprimentibus curatis, tenendum est. Nec omittenda sunt specifica antepileptica, plerumque ex efficacioribus adstringentibus composita, quae saepe hanc labem intulisse visa sunt.

§. 704.

Huius itaque atrocis morbi causa proxima quaerenda est in vitiata nutritione. Haec proficiscitur partim ab imbecillitate omnium fibrarum, quas partes solidae, et inter has praecipue viscera habent, quae impedit, quo minus corporis humida recte possint concoqui; partim vero causa illa petenda est a vitiatis humoribus lymphaticis, inprimis quibus ob id solidae partes nec recte ali, nec ad legitimum robur perduciqueunt. Ex his causis laborare inprimis solent glandulae lymphaticae, in quibus a lentore infarctus fiunt. Praecipue malum increscit, si hoc accidit glandulis mesenterii, quae si scirrhusae factae sunt, id quod plerumque accidit, chylum, quo minus ad cisternam lumbarem per lactea fluere possit, prohibent. Quare etiam tales pueri tandem coeliaca seu deiectione chylosa laborant. Dum vero novus humor sanguini non adfunditur, is corrumpitur et acrior fit, adeo ut ossum etiam caernosorum rarioremque medulla vitium contrahat, unde nascitur *παιδαρδεοκαχίη*. Quia etiam partes nutrientes deficiunt, et humores vitiati viscerum imbecilliorum actione non recte elaborantur, ossa fiunt molliora et ceræ instar flexibilia, quare, quamvis ossa magis, quam ceterae partes, increseunt, imo circa epiphyses intumescunt, illa tamen a contractis emaciatisque musculis flectuntur conuertunturque. Spina dorso, ex eiusmodi ossibus composita, et ligamenta habens etiam infirma et laxa, a mole grandioris capitis

premitur, et suo vario corporis flexu dataque alia occasione facile distorquetur.

§. 705.

Morbus hic grauis est, qui si inualuit, difficilior et vix non semper melius, obseruata victus et omnium rerum non-naturalium ratione, quam medicamentis, expugnatur. Facilius curantur pueri, quibus hoc vitium a vitiato lacte et malo victu ortum est, quam qui hoc a parentibus acceperunt. Difficultas augetur, si parentes occultis morbis venereis laborant; vbi febris hectica et frequentior deiectio chylosa superueniunt, mors in propinquo est.

§. 706.

In curatione considerari debet morbus, cuius diuersi gradus sunt. Nam vbi puerum iam summa macies et febricula tenet, vbi abdomen valde durum est, et vbi accedit coeliaca, nihil moliri oportet, ad minimum medicamentis, ne Medicus, quem seruare nequit, occidisse videatur. Ab initio vero morbi repurgandae sunt primae viae, a fordibus, et videndum est, vt visceribus robur reddatur. Inter euacuantia nonnumquam multum boni praestare potest, si vires illud permittunt, radix Ipecacuanhae, cuius aliquot grana potui Caffee vel Succolatae commode admisceri possunt. Si tali emetico multa pituita exturbatur, illud repetendum est, interpositis aliquot diebus. Non alienum est Oxymel squilliticum, quod interdum propinari potest ad drachm. j. vel iij. quod commode admiscetur Syrupo. Inter laxantia optimum est Rhabarbarum, cui tamen aliquando aliquot grana Mercurii dulcis admisceri possunt. Vbi Mercurius datur, ab omnibus Salibus et acescentibus abstinendum est. Rhabarbaro admisceri potest Nitrum, Arcanum duplicatum, Sal catharticus. Quales Sales etiam cum Cereuisia exhiberi

beri possunt. His autem omnibus diu insistendum est. Non alienae sunt pilulae Stahlianæ, quæ cum pulte offerri possunt.

§. 707.

Roborandis visceribus nihil magis inseruit, quam vitæ et corporis exercitatio. Nam Martialia aliaque roborantia vix tenerioribus visceribus opportuna sunt. Vesce itaque debent pueri pane bis cocto, semine Foeniculi, Anisi, Petroselini, Cinnamomo, Cardamomo, Nuce myristica, paucis Croco condito. Aromatibus etiam similibus conspergendæ sunt carnes, quas assas esse confert, raro vero elixas. Nocentissima sunt omnia glutinosa, gelatinosa et iurulenta, nec non omnia acescentia et quæ ex farina et butyro pasta sunt. Alienum quoque est lac. Potioni apta est cereuisia multo lupulo condita, meracior, qualis est Brunsvicensis et Martisburgensis. Nocentissima est acescens et tenuis. Haec vltima præstantior est aqua fontana vel sola, vel cum semine Foeniculi, Anisi aut Cornu Cerui decocta. Cereuisia etiam melior redditur, si ei tempore fermentationis radix Ari, Leuistici, herba Absynthii, Melissæ, Betonicae, Ceterach et alia adiiciuntur. Dari potest interdum vinum, sed paucum atque meracum, edentulum, dulce. Aëris etiam ratio habenda est, quem serenum, purum, montanum esse confert. Nihil magis nocet, quam somnus in conclauibus arctioribus, si plures in eodem conclavi decumbunt, et si mundities negligitur. Plures etiam suadent decubitus super herbas fragrantiores, herbam Betonicae, Artemisiæ, Lauendulae, Serpilli, Rorismarini, Pulegii, Melissæ, Maioranae. Plurimum extollunt balnea frigida roborandis partibus externis, lubricandis visceribus idonea. Balnea calida nimium debilitant; noui tamen exemplum, vbi puer rhachiticus ex usu externo Thermarum Aquisgranensium, facta copiosissima et tenacissima pituita per aluum excretionem, conualuit. Cum

balneis plurimum proficiunt frictiones mediantibus pannis atque linteis asperioribus, vel pannis laneis. Panni illi excipiant fumum ex Styrace, Thure, Mastiche, Benzoë, pauperibus ex baccis Iuniperi. Vestibus induantur pueri laneis, germ. *Flanell*, etiam his suffimigiis imbutis. Nihil praestantius est, quam frequens corporis exercitatio. Plurimum nocet praematurum et nimium litterarum studium, in quod tales pueri saepe procliuiiores sunt, quippe qui natura sunt prudentiores intelligentioresque.



DE MARCORE SENVM

ET

REGIMINE ILLORVM.

§. 708.

Puribus morbis senes obnoxios esse, docuit Pathologia, et iam animaduertit HIPPOCRATES. Tollitur enim in his vel imminuitur pedetentim illud aequilibrium, quod inter partes solidas fluidasque esse solet, a quarum mutuo renixu vita nostra pendet. Partes enim solidae magis et magis densantur augenturque; minora et subtilissimum humorem recipientia vascula, tam numero, quam diametro seu capacitate minuuntur, vnde tandem fit in omnibus partibus maior rigor et validior renixus, cordis motui resistens. Ab hac re vix non omnia incommoda senum proficiuntur. Humores fiunt lenti, quippe qui a visceribus non recte elaborantur, et a quibus humores inutiles non recte excernuntur. Ipsa etiam cutis arida et adstricta, quare multum cohibetur insensibilis exspiratio. Humor, per cutim exire solitus, fertur ad alia loca; ad pectus, et nascitur tussis, asthma

asthma humidum; ad fauces, membranam pituitariam et ad ipsum cerebrum, quippe quod, a nulla re compressum, exsuperantem in corpore humorem facile recipere potest. Vnde senibus frequens est apoplexia, et qui gradu differunt, affectus soporosi. Plurimum confert, si senes victum non mutant, repletionem, ebriositate nimiaque quiete, eruditates in corpore augment, vel si illi corpus Venere, curis aliisque nimium infirmant.

§. 709.

Senes itaque debent sibi multum a victu detrahere, non alio cibo uti, quam qui facile concoquitur, corporis exercitationem, quamvis propter senilem rigorem illa non sine molestia sit, minime negligere, alium subinde lenioribus catharticis ducere, inter quae pilulae Becheri, nisi has mictus cruentus et haemorrhoidum molimina prohibeant, optimae sunt, quibus subinde Extractum panchymagogum vel Mercurius dulcis ad excutiendam pituitam adijci possunt. Potione utantur paullo meraciore. Vinum recte lac senum esse dicitur. Nocentissimum est vinum adustum, quod rigorem multum auget. Degant in aëre sereno, corpus contra frigus muniant. Necessè est, ut senes sibi nihil de somno detrahant, sed ut diutius in lectulo maneant, quo cutis molliatur et iuuetur exspiratio. Nec a somno meridiano prohibendi sunt. Sanguinis missio, si illi adfuerit, minime negligenda, pedetentim vero minuenda est sanguinis educendi quantitas. Senibus propter impeditam exspirationem frequentes sunt diarrhoeae, maxime si facta fuit ex nimio cibo repletio; illae nullo modo turbandae sunt. Pestifera est senibus Venus, maxime ea, ad quam non residuo corporis robore, sed stolidi phantasia excitantur. Nec sine periculo est ebrietas. Omnia remedia prophylactica, spirituosa, sic dicta balsama vitae, aromatica, aliena esse arbitror. Dari possunt interdum emulsiones, Sales neutrius generis et supra laudata laxantia.


Ff 5

§. 710.

§. 710.

Senes tandem extinguuntur febricula, quam marcorem seu marasimum senilem vocamus. Nascitur ex supra adductis causis, et si a lentore humorum, turbatis omnibus se- et excretionibus ipsaque nutritione, infarctus sunt in visceribus aliisque corporis partibus. Esse solet haec febricula cum magna imbecillitate, corporis tabe, febriculae illi similis, qua hectici laborant. Saliva glutinosa est, lingua pituitosa, cutis arida, extrema rigida, frigida, saepe contracta sunt. His parum valet medicina. Mitiganda sunt symptomata. Si alius non respondet, ducenda est lotione emolliente, eaque benigna. Dari possunt emulsiones cum aquis analepticiis, addito, si aestus vrget, pauxillo Nitri. Pro sunt Gelatinae succis acidis imbutae, Syrupi officinales, haustus vini generosi. Si corporis exercitationem ferre nequeunt, vtendum est gestatione et vectura in aëre sereno. De Apoplexia aliisque senum morbis iam alibi dictum fuit.

F I N I S.



FOR-



FORMULAE.

Ad §. 61.

Infusum.

R. Vini emet. l. Infus. vitri ꝑij. 3j.
Oxym. squillit. 3iij.
D. pro dosi.

R. Fri emet. gr. iij.
Fri Olat. 3j.
M. D. pro vna dosi.

R. Rad. Ipecacuanh. 3ss. l. 3ij.
Conseru. flor. Persic. 3ss. l. 3ij.
Syrup. de Cichor. c. Rhab. q. s.
M. F. Bolus.

R. Rad. Ipecacuanh. 3j.
Fri emet. gr. j.
M. F. Pulv.

R. Rad. Ipecacuanh. 3jv. l. 3j.
Vini Rhenan. 3ij.
Sacchari 3ss.
Infusa stent per noctem. D. altero die pro dosi.

Ad

Ad §. 63.

R̄. Rad. Gentian. rubr.
 Vincetox. l.
 Pimpin. albac ana ʒiij.
 Herb. Absynth.
 Rutae l. Fumar. ana Mj.
 Summit. Cent. min. Mjʒ.
 Flaved. Cort. Orant. recent.
 rasp. n. j. l. ij.
 Rhabarb. opt. ʒij. l. ʒiʒ.
 Fol. Senn. f. f. ʒʒ.
 Fibr. Hellebor. nigr. ʒij.
 S̄is cathart. ʒj.

M. C. C. F. Spec. pro nodulo. D. in Cilicio. S.
Species zu einem Kräuterwein früh ʒij. zu nehmen. Vinum adhib. Rhenanum l. Franconicum.

R̄. Rhab. optim. gr. xxv.
 Fri Friſat. ʒʒ.

M. F. Pulv. div. in 2. partes. S. *Eines früh,
 das andere Abends zu nehmen.*

R̄. Rhab. optim. ʒiij.
 Liqv. Vae fol. Fri. ʒj.
 Vae flor. Acaciae ʒiv.

Dig. leni calore per horam dimid. exprime et filtra.
 D. pro doſi ʒʒ. *oder ein Löffel voll.*

R̄. Rhabarb. optim. ʒʒ.
 S̄is Fri ʒiʒ.
 Vae Cichor. ʒv.

S. vt ſupra. D. poteſt ad 180. gtt. pro doſi.

R̄. Extract. Rhab. aquoſ. ʒiij.
 Liqv. Vae fol. Fri ʒj.

M. D. S. vt ſupra.

Potio

Potio antiphlogistica, in febris acutis.

℞. Pulp. Tamarind. ℥℥.

Crem. Fri. ℥j.

Passul. min. ℥i℥.

Fol. Senn. f. f. ℥ij.

C. C. coqu. in f. q. ∇ae font. vel Seri lactis in
Colatura solue

Mann. Calabr. recent. ℥j.

c. pauxillo Sacch. ℥i del Cedro gtt. ij.

D.

℞. Cremor. Fri ℥i℥.

Mann. Calabr. ℥ij.

M. coqv. in f. q. ∇ae font. adde

Syrup. Rosar. pallid. ℥j.

℥ Cort. O rant. gtt. ij.

M. D.

Ad §. 64.

℞. Spec. emoll. ℥iij. l. Decoct. Chamom.

l. Decoct. auenae excortic.

Sem. Carui contus. ℥vj.

M. C. C. coqv. in f. q. ∇ae font.

℞. Colat. ℥x. l. libr. j. adde

Mellis simpl. l. anthosat.

℥i recent. Oliv. ana ℥j.

Ois comm. ℥i℥.

M. F. Clyster. D. adpl.

Clyster in febris inflammatoriis.

℞. Decoct. Hordei ℥viij.

Otri depurat. ℥ij.

+ti commun.

Syrup. de Cichor. c. Rhab. ana ℥j.

F. Clyster, haud calidus, sed tepidus adinouendus.

Ad

Ad §. 76.

R. Cort. Peruv. opt. ʒj.
 ▽ae Ceraf. ʒiſſ.
 Syrup. Cort. Ⓞrant. ʒiiij.
 M. F. Haustus pro vna doſi.

R. Conſerv. viſceral.
 Roſar. antiqv. ana ʒvj.
 Cort. Peruv. opt. ʒj.
 Syrup. Cort. Ⓞrant. q. s.
 M. F. Electuar. D. ad Fiſtile, S. *alle 4. Stunden
 einer Kaſtanie groſß zu nehmen.*

R. Roob Sambuci
 Cort. Peruv. ana ʒj.
 Extr. Cent. min. aquoſ. ʒj.
 Syrup. V. Rad. aper. q. s.
 M. D. S. vt ſupra.

R. Cort. Peruv. ʒj.
 Ⓞis Fri ʒiſſ. adfunde
 Vini Rhenani et ▽ae ana ʒviiij.
 Diger. leni calore per noctem,
 adde
 Syrup. Cort. Ⓞrant. ʒvj. l. ʒj.
 Cuius infuſi D. tertia vel quarta quaque hora ʒiſſ
 pro adulto.

Clyſter pro homine adulto.

R. Cort. Peruv. ʒj.
 Groſſo modo pulueriſ. bulliat in ▽ae font libr. j.
 D. pro Enemate, praemiſſa prius lotionē aluui
 aucente.

Ad

Ad §. 79.

- R_x. Ceraf. succulent. q. v.
 Coqv. in ▽ae q. s.
 Colat. adde ℥j. vini Rhenan. ad ℥xij. Co-
 laturae.
 NB. Eadem vini proportio ad Decoct. panis.

Potio in febris intermittenibus.

- R_x. Chin. ponderos. ℥℥.
 Cort. Caff. lign. verae ℥℥.
 M. C. coqv. c. Mens. iij. ▽ae font. ad remanen-
 tiam duarum tertiarum D. S. *zum ordentli-
 chen Trank.*

Ad §. 83.

Pro homine robusto, viscido laborante.

- R_x. Fri ⊕-lati ℥i℥.
 Conch. f. △e ppt. ℥j.
 ⊕tri depurat. ℥℥.
 M. F. Pulv. div. in 6. partes. D. S. *den guten
 Tag über alle 3. Stunden eins zu nehmen.*

Ad §. 85.

- R_x. Empl. de Cumino
 Tacamahaca ana q. s.
 Malaxentur addito Balsamo Peruiano ad ℥i℥.
 Ducatur super alutam, adsperge ℥i dest. Macis,
 Absynthii, Maioran. ana gtt. X.
 D. S. *Pflaster auf die Gegend des Magens zu
 legen.*

Ad

Ad §. 86.

R. ∇ ae Ceraſ. nigr. \mathfrak{z} viii.
 Cinnam. cydon. \mathfrak{z} j.
 Syrup. rübiidæi \mathfrak{z} iſſ. i. \mathfrak{z} ij.
 l. Ribes. l. Granat.
 Lutus Aris per campan. gtt. xv. pro ſapore.
 Dari poteſt altera quaque hora ad \mathfrak{z} iſſ.

R. Decoct. Hordei libr. j.
 Syrup. Ceraſ. acidor. \mathfrak{z} ij.
 Tinct. flor. Bellid. \mathfrak{z} ij.
 M. D. S. vt ſupra.

R. Decoct. Scorzon. libr. j.
 Roob. Ceraſ. acid. \mathfrak{z} ij.
 Syrup. acetof. Citri \mathfrak{z} j.
 M. D. S. vt ſupra.

Ad §. 88.

R. ∇ ae flor. Sambuc.
 Til. ana \mathfrak{z} ij.

Sem. Papav. alb.
 Card. Mariæ
 Amygd. dulc. ana \mathfrak{z} ij.

M. F. l. a. Emulſio, adde
 Matr. Perl. \mathfrak{z} j.
 Otri depurat. \mathfrak{z} iſſ.
 Sacch. q. s.

M. D. S. *Alle 2. Stunden ein halb Theeköpf
 gen voll zu nehmen.*

Ad

Ad §. 90.

- Rx. ∇ ae flor. Sambuc. \mathfrak{z} iv.
 Specif. cephal. Michael.
 Pulv. bezoard. Angl. ana \mathfrak{z} j.
 Lap. 69. ppt. \mathfrak{z} ij.
 Syrup. papav. rhoead. \mathfrak{z} iß.

M. D. S. *Einem Erwachsenen alle 2. Stunden
 ein paar Löffel voll, einem Kinde einen Löffel voll.*

- Rx. Liqv. anodyn. min. H. \mathfrak{z} iß.
 Tinct. Corall.

ut us bezoard. Bussi ana \mathfrak{z} ß.

M. D. S. *In gebrannten Wasser oder Thé
 25. Tropfen zu nehmen.*

Ad §. 91.

- Rx. Corall. rubr. ppt.
 Spec. de Hyacinth. ana \mathfrak{z} ij.
 \odot tri depur. \mathfrak{z} j.

M. F. Pulv. diuid. in 5. partes. D. S. *alle 2-3.
 Stunden eins zu nehmen.*

- Rx. ∇ ae Ceras. nigr. \mathfrak{z} vj.
 +ti vini \mathfrak{z} ß.

M. D. S. *Wasser, worinnen das Pulver zu
 nehmen.*

Ad §. 92.

- Rx. ∇ ae Meliss. f. v.
 Cort. \odot rant. ana \mathfrak{z} ij.
 Diascord. Fracastor. \mathfrak{z} iß.

M. D. S. *Alle 2-3. Stunden ein paar Löffel
 voll. (Cessante diarrhoea seponatur hoc quo-
 que medicamentum.)*

Gg

Clyster

Clyster anodynus in diarrhoea proficiens.
 R. Lact. calid. l. Decoct. auenae excortic. ℥iv.

Theriac. Androm. ℥ss. l. 3vj.

M. F. Enema, adplic.

Theriacae ℥ss. l. gr. xv. repetitis vicibus dari possunt.

Ad §. 102.

R. Conch. f. Δ^e ppt.

Lap. 69 c. +do Citri.

⊙tri depurat.

℥ii diaphoret. ana ℥j.

Arcan. dupl. ℥ss.

℥℥is ℥ii ppt. ℥ss.

M. F. Pulv. div. in 7. partes. D. S. *Alle 3. Stunden eins zu nehmen.*

R. ∇ae Ceraf. 3vj.

Liqv. ∇ae fol. ℥ri. ℥ss.

Syrup. Cort. ⊙rant. 3ij.

M. D. S. *Alle 2. Stunden ein halb Théeköpfgen voll zu nehmen.*

Ad §. 103.

Contra bilis vitium.

R. Crem. ℥ri.

Lap. 69 c. +do Citri

Conch. f. Δ^e ppt. ana ℥j.

⊙ depurat. ℥ij.

M. F. Pulv. div. in 4. partes. Capiat aeger vnum altera vel tertia quaque hora.

In

In Acido praedominante.

R. Magnes. albae

℞ is cathart. Angl. ana ʒj.

℞ tri depurat. ʒss.

M. F. Pulv. div. in 6. partes. D. S. *Alle 2. bis 3. Stunden eines in Wasser zu nehmen.*

In viscido.

R. Fri ℞ lat. ʒj.

℞ tri depurat. ʒss.

M. F. Pulv. div. in 3. partes. D. S. *vt supra.*

Ad §. 105.

Rhab. c. ℞o Friat. die intercalari saepius sumtum
febres pellit, e. g.

R. Medull. Rhab. opt. ʒss. l. gr. xxv.

℞ is cathart. ʒss. l. Crem. Fri.

M. F. Pulv. div. in 2. part. aequal. D. S. *Eins bey dem Schlafengehen, das andere früh zu nehmen.*

R. Gumm. ammon,

Hederae

Iuniperi, ana ʒj.

Myrrhae

Extr. Hellebor. nigr. ana ʒj.

Card. bened.

Cent. min.

Aloes gummof. ana ʒj.

M. F. c. Elixir. Propr. sine + do Pilulae,
ex ʒj no. 20. Dosis est 18 vel 20.

Gg 2

Ad

Ad §. 107.

℞. Pulv. Birkmanni ℥iſſ.

Sem. Foenicul.

Anisi. ana ℥iij.

Coriandri ℥j.

Cort. ◯rant. rec. rasp. no j.

Sacch. rosat. ℥j.

M. F. grosso modo Pulv. l. Tragea, D. ad Scatulam, capiat aeger horis matutinis et ante prandium ℥j.

℞. Cort. Peruv. ℥iv.

Limat. ꝑtis purae ℥j.

Adfunde Vini Rhenan. meracioris ℥xvj. bibat aeger ieiuno ventriculo bis l. ter per diem ℥iſſ.

Ad §. 110.

℞. ∇ae dest. ℥viiij.

Liqv. ∇ae fol. ꝑri ℥j. cui addi potest

Tinct. Corall. ℥ij.

M. D.

℞. MP. Stahl. l. alius cuiusd. ℥j.

ꝑri ꝑrisat. ℥ſſ.

◯ depurat. gr. v.

M. Solv. in f. q. ∇ae dest. vel. Melissae f. v.

D. S. auf einmahl zu nehmen.

Ad §. 115.

Infusum pro corpore raro, ut vulgo vocant phlegmatico, in quo viscidum abundat.

R_x. Rad. Ari

Pimpin. alb.

Bryon. ana ʒiʒ.

Summit. Absynth.

Cent. min. ana Mij.

Bacc. Lauri

Cort. Winteran. ana ʒij.

Rhab. opt. elect. ʒiʒ.

Fol. Sennae ʒj.

Agaric. in petia ligati ʒiʒ.

Eis ʒri ʒiʒ.

M. C. C. F. Spec. D. in cilicio pro ∇ae lib. ʒ.
et Vin. Rhenani vel Francon. libr. ij.

Infusum pro corpore magis mobili.

R_x. Rad. Gentian. rubr.

Vincetox. ana ʒiij.

Hb. Card. bened.

Fumar.

Trifol. fibrin. ana Mjʒ.

Cort. flauī mali ○rant. rec. rasp. no. j.

Sem. Foenicul.

Cinnamom. ana ʒiʒ.

Rhabarb. optim.

Polypod. quern.

Fol. Senn. f. f. ana ʒj.

Fibr. Hellebor. nigr. ʒij.

Eis Thermar. l. Eis cathart. Angl. ʒvj.

M. D. S. vt supra.

Gg 3

Ad

Ad §. 116.

R. Rad. Sassaquil.
Gramin.

Raf. C. C. ana ℥i℥.

Rad. Cichorei ℥vj.

Sem. Foenicul.

Cort. Ligni Sassafr. ana ℥ij.

M. C. C. F. Spec. coqv. ℥j. ex ∇ae font. lib. iij.
per dimid. hor. Colat. depurat. D. S. pro po-
tu ordinario.

R. Rad. Sassaquil.

Chin. ponderos. ana ℥i℥.

Glycyrrh. ℥j.

Vincetox. ℥℥.

Sem. Anisi.

Ligni Sassafr. ana ℥ij.

M. C. C. F. Spec. D. S. vt supra. **NE.** Si
alius sicca sit, his decoctis adiiciatur hordeum,
quod apud pauperes loco Scorzon. substitui
potest.

Ad §. 119.

Elixir stomach. ad method. Hoffm.

R. Extr. Absynth.

Cent. min.

Cort. Orant. rec. rasp.

Peruv. ana ℥℥.

Myrrhae ℥i℥.

Croci oriental.

Os Fri ana ℥j.

M. adfunde Vini generosi Canariens. libr. j.
Coqv. leni igne arenae, vase clauso, et post
sufficientem solutionem decanta. D. ex vino LX-
XXX-C. gtt.

Ad

Ad §. 123.

R. Medull. Rhabarb. gr. xv.

Matr. Perlar. ppt. gr. v.

Citri depurat. gr. ij.

M. F. Pulv. Detur in triplo, capiat aeger tertia quaque hora vnum.**R.** Tamarind. ʒij. l. ʒiij.

Rhabarb. opt. ʒiʒ.

M. C. C. coqv. in f. q. ∇ae font. in Colat. solue.

Mann. Calabr. rec. elect. ʒiʒ.

Depur. adde c. pauxillo Sacch. ʒi dest. Rutac gtt. ij.

M. F. Apozema. *D. S. Laxiertrank auf einmal zu nehmen.***R.** Corall. rubr. c. +do Citri ppt.

Mandib. Lucii piscis ppt. ana ʒij.

Citri depurat. ʒj.

Pulv. bezoard. Angl. ʒʒ.

ʒʒis ʒii ppt. ʒʒ.

M. F. Pulv. diuid. in 7. partes. Capiat aeger altera vel tertia quaque hora vnum ex Ptisana vel ∇a dest. quadam.

Ad §. 127.

R. Lap. 69. c. +do Citri.

ʒii diaphor. rec. ana ʒʒ.

Citri depur. gr. xv.

ʒʒis ʒii ppt. gr. v.

M. F. Pulv. div. in 4. partes. *D. tertia quaque hora vnus ex ∇a fl. Sambuci l. simpl.*

Gg 4

R.

- ℞. ∇ae flor. Sambuc.
 Cerafor. nigr. ana ʒiij.
 Lap. 69. c. + do Citri.
 Mandib. Lucii piscis ppt. ana ʒij.
 Pulv. bezoard. Angl. ʒʒ.
 ʒʒis ʒii ppt. ʒʒ.
 Liqv. ∇ae fol. ʒri ʒvj.
 Syrup. de Althaea vel Papav. alb. ʒij.
 M. D. S. *Alle 2. bis 3. Stunden ein klein Théeköpfgen voll zu nehmen.*

Ad §. 128.

- ℞. Rad. Scorzon.
 Saffaparil. ana ʒiij.
 Herb. Beton.
 Veron.
 Salv. ana Mʒ.
 Sem. Anisi stellati ʒʒ.
 M. C. C. F. Spec. D. S. *Kräuterthée.* Dari
 potest infusum cum Syrup. Capillor. Veneris.
 ℞. Essent. Glycyrrh. ʒij.
 Pimpin. alb.
 Latus ʒis ammon. ana ʒj.
 M. D. S. 40. *Tropfen in Kräuterthée zu nehmen.*
 ℞. Syrup. de Alth. Fernel.
 ʒi ei Amygdal. dulc. recent. ana ʒʒ.
 Sperm. Ceti recent. ʒij.
 Croci oriental. gr. vj.
 ʒi dest. Anisi
 Macis ana gtt. v.
 M. D. S. *Dann und wann ein Coffeelöffel voll.*

R. ℞ ei Amygdal. dulc. rec. f. ∇ e expr. \mathfrak{z} ij.
 Croci oriental. \mathfrak{z} ij.
 ℞ ei dest. Foenicul. gt. viij.
 Sacchar. Canar. q. s.
 M. F. Eleofaccharum, D. S. vt supra.

Ad §. 135.

R. Lap. 69.
 Mand. Lucii piscis ppt. ana \mathfrak{z} ij.
 Pulv. bezoard. Sennerti \mathfrak{z} j.
 M. Div. in 5. partes. D. altera quaque hora dosis
 ex ∇ is destill. seqq.

R. ∇ ae flor. Samb.
 Cerasor. ana \mathfrak{z} ij.
 Succ. Citri rec. \mathfrak{z} j.
 M. D. S. *Wasser, aus welchen die Pulver zu
 nehmen.*

Vel

R. Matr. Perlar. ppt.
 Mand. Lucii pisc. ppt. ana. gr. xv.
 Succ. Citr. rec. \mathfrak{z} ij.
 ∇ ae Ceras. nigr. \mathfrak{z} ij.
 M. F. Haustus D. pro dosi, et repeti potest tertia
 quaque hora.

Ad §. 138.

R. Decoct. auen. excortic. \mathfrak{z} x.
 Oxym. squill. \mathfrak{z} ij. l. j.
 ℞ ei Amygdal. dulc. vel Anisi recent. \mathfrak{z} j.
 Tri depur. \mathfrak{z} j.
 M. F. Clyster pro soluenda aluo.

Rx. ∇ ae Meliffae sine vino
Cort. \odot rant. ana \mathfrak{z} ij.
Diafcord. Fracast. \mathfrak{z} ij.

M. D. S. *Alle Stunden im Anfang ein paar
Löffel voll, darnach alle 2. Stunden zu neh-
men* (donec diarrhœa se remittit).

Ad §. 140.

Rx. +ti rofacei \mathfrak{z} ij.
Camph. in Lutus Ros. f. q. solut. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 \odot ei Ligni Rhodii gtt. xv.

M. et eo madefiant lintcola fronti applicanda.

Ad §. 145.

Rx. Tamarind, $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
Crem. \mathfrak{f} ri \mathfrak{z} j.

Coqv. in f. q. Seri lactis, in Colatura solue Syrup.
Rosar. pallid. \mathfrak{z} j. depur. adde \odot ei del Credo
Italici gtt. ij.

M. D. S. *Laxiertrank laulich auf einmal zu
nehmen.*

Rx. Medull. Rhabarb. elect.
Conchar. f. \triangle e ppt. ana $\mathfrak{D}\mathfrak{ss}$.
 \odot tri depur. gr. v.

M. F. Pulv. D. in 4. vel 6plo. Capiat aeger vnum
altera quaque hora, donec aluus soluitur.

Iulapium analepticum.

Rx. ∇ ae Ceraf. nigr. \mathfrak{z} viiij.
Cinnamom. cydon. \mathfrak{z} j.
Syr. Rubi Idaei \mathfrak{z} i \mathfrak{ss} .
Clyff. \mathfrak{g} nii q. s. pro sapore.

M. D. S. *Alle 2. bis 3. Stunden ein paar
Löffel.*

R.

Rx. Decoct. Hordei libr. j.
 Syr. Ribes. iij.
 Confect. Alkerm. incompl. ʒij.
 Tinct. flor. Bellid. ʒj.
M. D. S. vt supra.

Rx. Flor. Tunic. Mij. affunde
 Vae calidae purae fontan. Mens. j.
 Digere in vase elauso per duas horas leni calo-
 re, adde Colaturae Syr. Berb. ʒij.
 Lutus Aris per campan. q. s. pro sapore.
M. D. S. vt supra.

Ad §. 170.

Rx. Ess. alexipharm. Stahl. ʒiʒ.
 Myrrh.
 Croci ana ʒʒ.
M. D. S. *Im Thé 10-20-30 Tropfen zu*
geben (pro diuersa aetate).

Ad §. 173.

Rx. Ferment. panis ʒij.
 Sem. Sinapi contus. ʒij.
 Ois comm.
 +ti ana ʒiʒ.
M. et admoueatur plantis pedum.

Rx. Decoct. Scorzon. libr. j.
 Succ. Citri recent.
 Syrup. Ceras. acid. ana ʒiʒ.
 Lutus Oli gtt. x. l. xv.
M. D. ʒj. pro Dosi.

Rx.

R. Decoct. Hordei libr. j.
 Syr. Ribes. ℥iij.
 M. tus ☉ tri dulc. 3j.
M. D. S. vt supra.

Ad §. 174.

R. Olei Amygdal. dulc. rec. 3i℥.
 Sperm. Ceti 3℥.
 Sacch. candi
 Syrup. de Althaea ana 3℥.
 Croci oriental. gr. vj.
 Oei Ligni Rhod. gtt. viij.
M. F. Eleofaccharum. S. *Zuweilen ein Coffer-
 löffel voll in den Mund zu geben.*

Ad §. 178.

Pro puera 5. annorum.

R. Rhabarb. optim. gr. xv.
 ☿ ii dulc. rite ppt. gr. ij.
 Diagryd. ☉ rat. gr. j.
 Syr. Rosar. pallid. 3i℥.
 ∇ae Cerafor. 3vj.
M. F. Haustus, D. pro vna Dosi.

Ad §. 182.

R. Extr. Cent. min. ex succo parati
 ∇ae fol. ☿ ri ana 3℥.
 ∇ae Meliss. f. v.
 Cort. ☉ rant. ana 3iij.
Dig. 1. c. per horam. D. S. *Täglich drey- oder
 viermal einen halben Löffel voll oder eine 3℥.*

Ad §. 168.

Rx. Camphor. 3ß. Solue in
 tus Rosar. ʒiij. adde
 +ti Rosar. ʒij.
 ʒei Lign. Rhodii gt. x.

M. D. S. *Aeufferlicher Umschlag auf die
 Stirne zu legen.*

Rx. Nucl. Persicor.
 Cerafor.

Sem. Papau. alb. ana ʒij.

Terantur c. f. q. ∇ ae Plantag. F. Emulsio spissa
 cui addatur

Camphor. c. Amygdal. dulc. contritae gr. v.

M. D. S. vt supra.

Ad §. 190.

Rx. Tamarind.

Herb. Acetof. rec. ana ʒij.

M. Coqv. in f. q. ∇ ae font.

Rx. Colatur. libr. j. adde

Oxymel. ʒj.

M. F. Clyster pro homine adulto.

Vel

Rx. ∇ ae font. tepid. libr. j.

+ti vini

Mellis ana ʒj.

Tri depurat. 3iß.

M. F. Clyster.

Rx. Hord. excortic.

Tamarind. ana ʒj.

Herb. Acetof. rec. Miv.

Coqv. in ∇ ae font Mens. iv.

Rx. Colat.

R. Colat. libr. iv. adde
 Roob. Ribes ℥ij.
 Otri depurat. ℥iſſ.
 M. Capiat aeger pro lubitu.

R. Decoct. Hord. libr. ij.
 Roob. Ribes.
 Sambuc. ana ℥iſſ.
 Eis Prunell. ℥j.
 Latus Atris per campan. gtt. xv-xx
 Vel

R. Seri Lactis rec. libr. ij.
 Succi Citri ℥iſſ.
 Otri depurat. ℥j.
 Sacchar. q. s. pro sapore.
 M. D. S. vt supra.

Ad §. 198.

Epispasticum.

R. Ferment. Panis +di ℥iv.
 Raphan. rust. rec. ℥iſſ.
 Rad. Pyrethri
 Eis ammon. ana ℥ij.
 +ti q. s.

M. exacte, diuid. in part. aeqv. et admoveatur
 furis, plantis pedum, poplitibus, &c.

Ad §. 199.

R. Rad. Gramin.
 Scorzon. ana ℥ij.
 Herb. Acetos. rec. Mijj.
 M. C. C. coqv. in f. q. Vae font. per dimidi-
 um horae.

R. Colat.

Rx. Colat. libr. iij. adde
Roob Sambuc.

Ribes. ana ʒiʒ.

Syrup. acetos. Citri. ʒij.

Œtri depurat. ʒij.

Cuius bibat aeger quantum placet, vt corpus hy-
dropicum fere fiat.

Rx. Decoct. Hordei libr. j.

Sem. Papav. alb.

Card. Mar.

Amygdal. dulc. rec. excort. ana ʒiʒ.

M. F. Emulsio, adde

Œtri depurat. ʒj.

Iulap. Rosar. ʒv.

M. D. ʒj. circiter altera quaque hora.

Ad §. 200.

Rx. Decoct. Hordei libr. j.

Mellis

Syrup. Acetos. Citri ana ʒj.

Œtri depurat. ʒj.

M. D. S. *Den Mund damit oft auszuspuhen.*

Ad §. 203.

Rx. Rad. Altheae ʒij.

Flor. Chamomill. Mij.

Fol. Peti ʒiʒ.

M. C. C. coqv. in f. q. ∇ae font.

Rx. Colat. libr. j. adde

Electuar. Hierae picrae pro Clysteribus.

Mellis anthosati ana ʒiʒ.

Œis Gemmae ʒij.

M. F. Clyster.

Rx. Tama-

R. Tamarind. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Fol. Senn. f. f.
 Crem. Fri ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. C. C. coqv. in f. q. ∇ ae font.
 adde Colaturae.

Syrup. Rosar. pallid. $\mathfrak{z}\text{j}$.

\odot tri depur. j .

M. D. S. *Laxiertrank auf einmal laulich zu nehmen.*

AL

R. Mann. Calabr. Fris. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Solv. et coqv. in Seri lactis libr. j .

Colat. adde

\odot tri depurat. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

\mathfrak{z} ei del Cedro gtt. v .

M. D.

R. Rad. Althaeae

Herb. Maluae

Parietar. ana Miss .

Capit. Papau. alb. c. semine no. iv .

M. C. C. coqv. in ∇ ae fluv. Mens. ij , per quadrantem horae.

R. Colatur. libr. ij . adde

+ti $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Syrup. de Althaea $\mathfrak{z}\text{ij}$.

\odot tri depurat. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. D. altera quoque hora $\mathfrak{z}\text{ij}-\text{ij}$.

R. ∇ ae flor. Sambuc. $\mathfrak{z}\text{vii}$.

Syrup. Violar. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

\mathfrak{z} is Prunell. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. Capiat aeger $\mathfrak{z}\text{j}$. vel ij . altera quaque hora.

R. ∇ ae

Rx. ∇ ae purae l. Decoct. Hordei libr. j.

+ti \mathfrak{z} ij.

\textcircled{U} tri depurat. \mathfrak{z} ij.

M. D. Capiat aeger altera quaque hora \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} ij.

Ad \mathfrak{z} . 200.

Rx. Rad. Altheae.

Bistort. ana \mathfrak{z} j.

Herb. Salviae.

Parietar. ana Mij.

M. C. coqv. in f. q. ∇ ae font.

Rx. Colat. libr. j. adde

Roob Diamoron. \mathfrak{z} ij.

\textcircled{U} tri depurat. \mathfrak{z} j.

M. F. Gargarisma.

Rx. Herb. Scabios.

Parietar. ana Mij.

M. Coqv. in f. q. ∇ ae font. per quadrant, hor.

Rx. Colat. libr. ij. adde

Mellis rosat.

Roob Diamoron ana \mathfrak{z} ij.

\textcircled{U} tri depurat. \mathfrak{z} ij.

M. F. Gargarisma.

Rx. Iulap. Rosar. \mathfrak{z} j.

\textcircled{U} tri depurat. gr. xv.

ut li gtt. viij.

M. F. Linctus in ore detinendus.

Rx. Mellis rosat. \mathfrak{z} j.

Roob Diamoron \mathfrak{z} ij.

ut \textcircled{U} is \mathfrak{z} ij. l. \mathfrak{z} ij.

M. Admoueat leniter parti gangraena affectae
mediante penicillo.

Hh

Ad

Ad §. 207.

*Cataplasma.***R.** Rad. Althacae \mathfrak{z} iv.

Herb. Melilot.

Maluae.

Parietar. ana Mijj.

Flor. Chamom.

Verbasci ana Mij.

M. Coqv. in f. q. ∇ ae fluuiatil. ad debitam consist.
sub finem addeFarin. Sem. Lin. \mathfrak{z} iv.

Nidor. hirund. no. ij.

 \mathcal{Q} ei Liliorum alb. q. s.**M.** F. Cataplasma.

Ad §. 208.

R. Garicar. pingv. no. viij.

Flor. Verbasci.

Papav. rhoead. ana p. iv.

M. C. Coqv. in ∇ ae font. libr. ij. per quadrante-
tem horae.**R.** Colatur. libr. j. addeSyr. de Althaea \mathfrak{z} j.Mellis rosati \mathfrak{z} ss. \mathcal{C} tri depurat. \mathfrak{z} ss.**M.** F. Gargarisma.

Ad §. 210.

R. Fol. Senn. f. f. \mathfrak{z} ijj.Crem. \mathfrak{f} ri \mathfrak{z} ij.**M.** C. coqv. in s. q. ∇ ae font. in Colat. solueMann. Calabr. rec. \mathfrak{z} ss.

Depur. addatur c. pauxillo Sacchari

 \mathcal{Q} ei del Cedro gt. iij.**M.** D.

Ad §. 219.

℞. ∇ae purae font. tepid. ℥vj.

Syrup. de Althaea ℥i℥.

Oxymel. ℥℥.

M. F. Clyster, qui iterari debet post. 3. l. 4.
horas.*Formula BOERHAAVII.*

℞. Decoct. Hord. Mens. ij.

Oxym. ℥iij.

ℚ tri depurat. ℥ij.

M. Bibat aeger saepius ℥j. l. ij.

℞. Decoct. Hord. libr. iij.

Lap. Prunel. ℥ij.

Syrup. rad. 5. aperient. ℥iij.

Diacodii Montani ℥℥.

Bibat aeger quaque hora ℥ij. vel ℥iij.

℞. Rad. Foenicul.

Gramin.

Petroselini ana ℥j.

Semin. Petroselin.

Anisi ana ℥ij.

M. C. C. coqv. in f. q. ∇ae per quadrantem
horae,

Colat. Mens. ij. adde

Syr. 5. Rad. aperient. ℥iij.

Oxym. simpl. ℥j.

ℚ tri depur. ℥j.

M. D. S. vt supra.

H h 2.

℞. Rad.

Rx. Rad. Glycyrrh.

Polypod.

Gramin. ana ℥j.

M. C. coqv. c. Menf. ij. ▽ae font. per quadran-
tem horae

Colat. Menf. ij. adde

Syrup. Capill. Vener. Monfpel. ℥iij.

⊙tri depurat. ℥j.

M. D. S. vt fupra.

Rx. ▽ae Scabiof.

Flor. Tiliae ana ℥iv.

Sem. Card. Mar. ℥℥.

Papav. alb.

Amygdal. dulc. excort. ana ℥iij

M. F. Emulfio, adde

⊙tri depur. ℥℥.

℥ii diaphor. ℥jv.

Syr. de Althaea ℥iij.

M. D. ℥j. omni bihorio.

Rx. Cort. Cafcarill. ℥℥.

Conferv. Rosar. antiqv. ℥ij.

Syr. Cort. ⊙rant. q. s.

M. F. Bolus.

Ad §. 220.

Rx. Eff. Glycyrrh. ℥iij.

Pimpin. alb.

Cafcarill. ana ℥j.

M. D. c. Infuso calido 30-40. gtt.

Rx. Rad.

R_x. Rad. Glycyrrh.

Althaeae ana ℥j.

Gramin. ℥i℥.

Caric. pingv. no. vj.

M. C. coqv. in ∇ae font. Mens. iv. per quadran-
tem horae, sub finem per octauam partem ho-
rae adde

Flor. Papav. rhoead. p. iij.

D. Colatura.

Linctus pro expectoratione.

R_x. Syr. Capill. Vener.

℞ei Amygdal. dulc. rec. f. Δe expressi ana ℥j.

Sperm. Ceti rec. ℥j.

Mellis ℥℥.

M. F. Linctus, cuius interdum capiat ℥j.-ij.

Ein oder zwey Cöffelöffel voll.

Ad §. 221.

R_x. Herb. Parietar.

Maluae.

Melilot.

Hyoscyami ana M_{pj}.

Flor. Sambuci.

Chamomil. ana M_p. i℥.

Farinae Lini ℥j.

M. C. coqv. c. Lactis et ∇ae partibus aequali-
bus, et hoc decocto repleantur vesicae calidae,
F. Fomentum.

R_x. Sacch. Saturni ℥℥.

+ti ℥vj.

℞ei rosati ℥j.

M. F. Vnguent. parti dolenti illiniendum.

Ad §. 225.

R. Rad. Acetof. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Gramin. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Herb. Acetofell.

Agrimon. ana Miß.

M. C. coqv. c. f. q. ∇ ae per quadrantem horae,
 Colat. adde

Flor. Rosarum

Violar.

Bugloss. ana Mij.

Stent in digestionem per octavam partem horae,

Colatur. recipe $\mathfrak{z}\text{iiij}$. adde

Syrup. Moror.

Rad. v. aperient. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.Otri depur. $\mathfrak{z}\text{j}$.M. D. quaque hora $\mathfrak{z}\text{ij}$. l. iiij .

Ad §. 230.

R. \mathfrak{z} ei Amygdal. dulc. $\mathfrak{z}\text{j}$.Diacod. Montan. $\mathfrak{z}\text{ss}$.Sperm. Cetti. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Sacch. Candi pulueris. q. s.

M. F. Linctus. D. eius $\mathfrak{z}\text{ss}$. pro dosi, repetatur
 omni hora.

Vel

R. Conserv. Rosar. antiqv. $\mathfrak{z}\text{j}$.Cort. Cascarill. $\mathfrak{z}\text{ss}$.Diacord. Fracast. $\mathfrak{z}\text{ss}$.Syr. Cort. C rum q. s.

F. Electuarium. S. *Alle 2. 3. Stunden eine Ka-*
stanie groß zu nehmen.

Ad

Ad §. 231.

℞. Sem. Hord.

Rad. Scorzon. ana ℥iij.

M. C. C. coqv. c. ∇ae font. Mens. iv. per quadrant. horae;

℞. Colat. Mens. ij. adde

Succi Citri rec. ℥j.

Roob Diamoron ℥ij.

Citri depur. ℥j.

M. F. Decoctum.

Vel

℞. Rasur. C. C.

Eboris.

Rad. Scorzon. ana ℥j.

Conc. coqv. in ∇ae font. Mens. iij. sub finem adde

Passul. min. Mij.

Sem. Foenicul. contus. ℥ij.

Flor. Papav. rhoead. p. iij.

Ebull. D. Colat. cui quoque addi potest Roob Diamoron, Succus Citri.

Ad §. 239.

Apozema laxans, quod, ne nauseam moueat, per intervalla sumi potest.

℞. Tamarind. ℥j.

Passul. min. ℥ss.

M. C. coqv. in f. q. ∇ae flor. Acaciae vel etiam ∇ae font.

In Colatura solue

Mann. Calabr. ℥ss.

M. D. pro Dosi.

Hh 4

℞. Rad.

R. Rad. Scorzon.

Glycyrrh. ana ℥j.

Herb. Acetof. rec. Mij.

Passul. min. Mj.

Caricar. pingv. no. v.

M. C. coque in ∇ae font. Mens. iij. per quadrantem horae:

R. Colaf. libr. iij. adde

Syr. de Althaea I. Violarum I. Papaveris alb. ℥j.

Tri depur. ℥j.

M. D. S. *Alle Stunden ein Théeköpfgen voll zu nehmen.*

Ad §. 240.

R. ∇ae Petroselini ℥iv.

Millep. puluerif. ℥iſſ.

Coccionell. gr. xv.

Syr. v. Rad. aperient. vel de Althaea Fernes. ℥ij.

M. Capiat aeger quarta quaque hora quartam partem.

Emulsio.

R. Decoct. Hord. libr. j.

Sem. Card. Mar.

Papav. alb. ana ℥iij.

rv. frigid. mai. ℥vj.

M. E. Emulsio, adde

Syrup. de Althaea ℥vj.

Capiat aeger omni bihorio ℥ij. circiter.

Ad §. 282.

R. Medull. Rhabarb. elect. ℥ij.

Lap. 69 c. + do Citri ℥iſſ.

Tri depur. ℥iſſ.

M. F. Pulv. diind. in 4. p. D. S. *Alle 2. bis 3. Stunden eins mit Wasser zu nehmen.*

Ad

Ad §. 286.

R. Extr. Panchymag. Crollū $\mathfrak{D}\mathfrak{ss}$.

Orii dulc. rite ppti gr. v.

Resin. Ialapp. gr. iij.

Diagryd. \mathfrak{q} ratī gr. ij.**M.** F. Pilulae no. xx. obd. fol. $\mathfrak{C}\mathfrak{ti}$,**D.** S. *Auf einmal zu nehmen.***R.** Rad. Aristol. rotund.

Vincetoxici.

Foenicul. ana $\mathfrak{Z}\mathfrak{ss}$.

Herb. Melissae.

Card. bened. ana Mj.

M. C. coqv. in ∇ ae font. ij.**R.** Colatur. libr. ij. addeSyr. v. Rad. aperient. $\mathfrak{Z}\mathfrak{j}$.Bibat aegra bis per diem $\mathfrak{Z}\mathfrak{iv}$. circiter.(Omittendus est Syrupus, quando foeminae
dulcia ferre nequeunt.)**R.** Rad. v. aperient. $\mathfrak{Z}\mathfrak{ij}$. ∇ ae fol. $\mathfrak{F}\mathfrak{ri}$ $\mathfrak{Z}\mathfrak{j}$.Ebulliant per dimidium horae, in \mathfrak{f} . q. ∇ ae,
sub finem adde, vt leniter ebulliant,

Herbas (s̄ fieri potest recentes)

Melissae

Veronicae ana Mij.

D. Colatura, cuius etiam bis per diem aliquot
vncias bibat aegra.

Formula sequens pertinet ad verba: per epicrasin purgantia.

- R. Rad. Aristoloch. rotund.
 Pimpinell. alb. ana ʒij.
 Herb. Matricariae vel
 Melissae Miß
 Summitat. Centaur. min.
 Absynth. ana Mj.
 Cort. Winteran.
 Bacc. Lauri ana ʒiſs.
 Rad. Bryoniae
 Rhab. elect. ana ʒj.
 Fol. Senn. f. f. ʒſs. l. ʒvj.
 Agarici in petia ligati ʒj.
 Eis Fri ʒiij. vel ʒſs.
 M. C. C. F. Species pro nodulo, D. in Cilicio,
 quibus adfundatur ∇ ae feruidae libra j. et post
 refrigerationem Vini meracioris libr. iv. vel
 Rhenani Miß.

Ad §. 295.

- R. Succin. ppt.
 Castorei
 Œtri depur. ana gr. v.
 Corall. rubr. ppt. gr. xv.
 M. F. Pulv. diuid. in 4. partes. S. *Alle Stunden
 eins zu nehmen.*

Ad §. 302.

- R. Effent. Cort. Œrant.
 Absynth.
 Gentian. rubr.
 Liqv. min. anod. Hoffm. ana ʒj.
 Effent. Myrrhae ʒiſs.
 M. D. S. *Zuweilen einige Tropfen zu nehmen.*

R. ʒœi

R. ꝰei Amygdal. dulc. rec. ℥j.
 Sperm. Ceti rec. ℥iſſ. l. ij.
 Croci oriental. gr. vj. l. v.
 ꝰei deſt. Foenicul. gtt. x. l. viij.
 M. D. tertia vel dimidia pars pro doſi et repeta-
 tur, donec lochia proueniant.

R. ꝰei Verbaſci ℥iſſ.
 deſt. Maioran.
 Rutae.
 Macis ana ℥ſſ.
 M. Illiniatur abdomini.

Ad §. 303.

R. ∇ae Meliſſ. f. v.
 Ceraſor. nigr. ana ℥iij.
 Lap. 69. +do Citri.
 Matr. perlar. ppt. ana ℥ij.
 Citri depurat. ℥j.
 ℥℥is ℥ii ppt. gr. xv.
 Syrup. Cort. Citrant. ℥iij.
 M. D. S. *Alle zwey Stunden ein paar Löffel
 voll zu nehmen.*

R. Lap. 69. c. +do Citri.
 Matr. Perlar. ana ℥ij.
 Citri depur. gr. xij.
 ℥℥is ℥ii ppt. gr. viij.
 M. F. Pulv. diuid. in 4. part. D. S. *Alle Stun-
 den eins zu nehmen.*

Ad §. 310.

R. Tamarind. ℥j.
 Paſſul min. ℥ij.
 Mann. Calabr. rec. ℥iſſ.
 M. Coqv. c. f. q. Seri lactis D. Colat. prouna doſi.
Potio.

Potio.

Rx. ∇ ac Millefol. libr. j.
 \odot tri depur. \mathfrak{z} j.
 Diacod. Montani \mathfrak{z} j.
 M. D. \mathfrak{z} j.-ij. pro dosi.

Ad §. 312.

Rx. ∇ ri \odot -lati grosso modo pulueris. \mathfrak{z} j.
 Lap. 69. c. +do Citri \mathfrak{z} ij.
 \odot tri depurat. \mathfrak{z} j.
 M. F. Pulv. diuid. in 4. partes.

Ad §. 313.

Rx. Limat. \mathfrak{z} tis purae \mathfrak{z} j.
 Cort. Peruv. elect. \mathfrak{z} ij.
 M. F. Pulv. D. in Cilicio, cui affundatur Menf. j.
 Vini Rhenani meracioris.
 Capiat aeger bis per diem \mathfrak{z} ij. circiter.

Ad §. 320.

Aluus soluenda &c.

Rx. Tamarind. \mathfrak{z} ij.
 Coqv. in Seri lactis libr. j. adde
 Mann. Calabr. rec. \mathfrak{z} ij.
 \odot tri depurat. \mathfrak{z} j.
 F. Clyster, tepide immittatur in aluum.

Ad §. 331.

Compositio STAHLII.

Rx. \odot tri depurat.
 ∇ ri \odot -lat. ana \mathfrak{z} j.
 \mathfrak{z} is ppt. gr. xij.
 M. F. Pulv. diuid. in 4. l. 6. partes, D. S. *Alle*
2. bis 3. Stunden eins in Wasser zu nehmen,
bis die Kopffschmerzen nachlassen.

Ad

Ad §. 335.

R_x. Sacchari ʒʒ.

Flor. Benzoes.

Rad. Ireos Florent. ana ʒʒ.

M. F. Pulv. D. S. *Schnupftoback.*R_x. Cort. Cascarill.

Lap. 69. c. +do Citri ana ʒj.

M. F. Pulv. diuid. in 4. partes. D. S. *Alle 4.
Stunden eins zu nehmen.*R_x. Conserv. Rosar. antiqv. ʒj.

Cort. Cascarill. Pisat. ʒij.

Syr. Papau. rhoad. q. s.

M. F. Electuarium.

R_x. Conserv. Fumar. ʒʒ.

Cort. Cascarill. gr. xv.

Syr. Flor. Papav. rhoad. q. s.

M. F. Bolus.

Ad §. 336.

R_x. Herb. Betonic. Mj.

Serpilli.

Maioran.

Meliss. f. Menthae ana Mʒ.

Flor. Anthos

Stoechad. Arab.

Lauendul. ana p. ij.

Lign. Rhodii.

Sassafras ana ʒij.

M. C. F. Species pro Cucupha, consperg. cum

ʒci Ligni Rhodii, f. Lauendul. gtt. x.

Ad

Ad §. 337.

R̄. Fri ☉-lat. 3iſſ.

Conchar. f. △e ppt. 3j.

☉tri depurat. 3ſſ.

M. F. Pulv. diuid. in 6. partes. D. S. *Vormittags um 10. Nachmittags um 4. Uhr oder 6. eins zu nehmen.*

R̄. Medull. Rhabarb. opt. gr. xxv.

Fri ☉rifat. 3ſſ.

M. F. Pulv. diuid. in aequales partes. D. S. *Beim Schlafengehen eins zu nehmen.**In cruditatibus biliosis.*

R̄. Magnes. alb. per calcin. ppt.

Fri ☉lati ana 3j.

☉tri depurat. 3ſſ.

M. F. Pulv. diuid. in 6. partes. D. S. *Alle 2. Stunden eins zu nehmen.**Essentia carminatiua.*

R̄. Essent. Gentian. rubr.

Absynth.

Cort. ☉rant. ana 3j.

Cort. Cascaril. 3ij.

M. D. S. *Magenessenz 40 - 50 Tropfen pro dosi.**Elixir*

Elixir stomach. HOFFMANNI.

Rx. Cort. flav. rec. raspat. fruct. \odot rant. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Extr. Centaur. min.

Gentian. rubr.

Card. bened.

\ominus is \mathfrak{F} ri ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

M. exacte in mortario lapideo, sub mixtione affunde

\mathcal{O} \mathcal{C} ei del Cedro gtt. xx.

Tandem affunde

Vini meracioris dulcis Canariensis vel Hungar. libr. j.

Digere in balneo Mariae; decanta Liquorem

D. pro dosi 80-90-100 *Tropfen*.

Rx. Empl. Oxycrotei

de Tacamah. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Malax. c. f. q. Balsam. Peruv.

Ducatur. super corium, consperg. c.

\mathcal{O} \mathcal{C} ei Macis.

Caryophyll.

Maioran. ana gtt. vj-viij.

D. S. *Magenpflaster*.

Rx. \mathcal{O} \mathcal{C} ei express. Nucistae $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Balsam. Peruv. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

\mathcal{O} \mathcal{C} ei dest. Caryophyll.

Cardamom.

Macis ana $\mathfrak{D}\mathfrak{ss}$.

M. F. Balsamum.

Ad §. 341.

Rx. Conserv. Fumar. $\mathfrak{D}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Aethiop. mineral. $\mathfrak{D}\mathfrak{ss}$.

Syr. Cort. \odot rant. q. s.

M. F. Bolus.

Rx. Rad.

R. Rad. Chin. ponderos.

Sassaparill. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Lign. Sassafras.

Guaiaci ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

M. Coqv. per horam in ∇ ae font. Mens. rv . sub
finem adde

Rad. Polypod. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Coque adhuc per quadrantem horae; coletur, de-
puretur.

Ad §. 373.

R. Spec. emoll. $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}$.

Rad. Pyrethri $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.

Pulp. Colocynth. in petia ligatae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. C. coqv. in f. q. ∇ ae.

R. Colatur. libr. j. adde

Elect. Hierae picrae pro clysteribus $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. F. Clyster.

R. Flor. Chamom. Mij .

Summit. Cent. min. Mij .

Fol. Peti $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.

Pulp. Colocynth. in petia ligatae $\mathfrak{z}\mathfrak{iss}$.

M. Coqv. in f. q. ∇ ae font.

R. Colat. adde

Mellis anthosat. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Extr. Hellebor. nigr. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

M. F. Clyster.

R. Agarici $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Colocynth. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Extr. Hellebor. nigr. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

M. F. c. Melle inspissato Suppositorium.

R. $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}$

- R.** Fri emet. gr. iv. l. v.
Teratur soluaturque c. f. q.
∇ae flor. Acaciae, adde
Oxym. squillit. ℥j.
M. D. pro vna dosi.
- R.** Resin. Ialapp. gr. xv.
Diagryd. ℥ti gr. v.
Solue in Spir. vini s. q. siue ℥iij-℥ss. adde
Syr. de Spina ceruina ℥v-vj. l. ℥j.
M. D. pro dosi.
- R.** Euphorb. ℥risat.
Sem. Piperis longi ana ℥j.
M. Excipe f. q. Mellis, imponatur cuti ad ma-
gnitudinem vnus floreni.
- R.** Caricar. pingv. ℥ss.
Coqv. in f. q. ∇ae font. adde
Sem. Sinapi contus. ℥j.
Euphorb. ℥risat. ℥ij.
M. exacte. F. Cataplasma, quod cuti imponatur.

Ad §. 383.

- R.** ∇ae Lil. conuall. c. Vino
+ti dest. ana ℥iij.
Liqv. C. C. succinat. ℥iiss.
Syr. Cort. Orant. ℥ss.
M. D. omni bihorio ℥j.

Ad §. 385.

- R.** Spec. emoll. ℥ij.
Summit. Cent. min. Mj.
Fol. Peti Mss.
Agarici in petia ligati ℥j.
Coqv. in f. q. ∇ae font.

Ii

R. Colat.

R. Colat. ℥vñj.
 Mellis anthosat.
 Elect. Hierae picrae pro clysteribus ana ℥j.
M. F. Clyster.

R. Spec. emoll. ℥iij.
 Coqv. in f. q. ∇ae font. adde
 Oxymell. squillit. ℥iij.
 Tri emet. gr. v.
M. exacte, E. Clyster.

Ad §. 386.

R. Rad. Pyrethri
 Sem. Piper. longi ana ℥ss.
 Mastichis ℥iij.
 Puluerisentur et c. Cerae albae f. q. F. Pastilli
 mastificandi.

R. Rad. Irid. Florent. ℥ij.
 Pyrethri
 Sem. Sinapi ana ℥j.
 Excipe cum Syr. Rosar. pallid. f. q. et succa.
 F. Pastilli manfiles.

Ad §. 393.

R. Vngu. neru. rec. ℥ij.
 Balsam. Peruv. ℥ij.
 Coei dest. Caryophyll.
 Lauendul.
 Macis ana ℥ss.
M. D. pro vsu externo.

R.actus

R. Lotus Rosar. ℥ij.
 Axung. rec. Capon. ℥j.
 Lotus Eris ammon. ℥ij.
 Olei dest. Serpilli
 Maioran.
 Caryophyll. ana ℥j.
 M. D. in Fictili pro usu externo.

Ad §. 395.

In Asthmate humido.

R. Rad. Ari
 Pimpinell. alb. ana ℥ss.
 Herb. Marrub. alb.
 Cuscut. ana Mj.
 Summit. Cent. min. Miß.
 Bacc. Lauri
 Cort. Winteran. ana ℥ij.
 Rad. Bryon.
 Fol. Sennae f. f.
 Rhabarb. opt. ana ℥j.
 Eris Therm. Carolin. ℥vj.
 M. C. C. F. Species pro nodulo, D. in Cilicio.
 Adfunde more consueto Vae font. feruid.
 Mensj. Vini Rhenan. meracior. Mens. iß.
 Dosis est ℥iß-ij.

Formula BRUNNERI.

R. Gummi ammon. ℥ij.
 Solv. in Vin. Rhén. merac. ℥ij.
 Adde Vae dest. Veronicæ ℥iv. D. tertia l. quarta
 circiter pars huius compositionis tertia quaque
 hora.

R. Gummi ammon. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Solv. in +ti squill. $\mathfrak{z}\text{j}$. adde
 ∇ ae flor. Acaciae $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Oxymel. squill. $\mathfrak{z}\text{j}$.
M. D. S. vt supra.

Decoctum Squillae pro robustioribus.

R. Rad. Squill. $\mathfrak{z}\text{ss}$.
 Coqv. in Vin. Rhenan. merac. libr. j. ad rema-
 nentiam octo circiter vnciarum.
D. bis per diem $\mathfrak{z}\text{j}$ - $\mathfrak{z}\text{ij}$ - $\mathfrak{z}\text{ij}$.

R. Gummi ammon.
 MP. Becheri ana $\mathfrak{z}\text{j}$.
M. F. c. f. q. Essent. Succin. Pilul. ex $\mathfrak{z}\text{j}$. de-
 cem. **D.** $\mathfrak{z}\text{j}$. horis matutinis et iterum vesper-
 tinis, superbibat aeger Decoctum aliquod, v. g.
Rad. v. aperient.

Pulvis Squilliticus.

R. Rad. Squill. puluerif.
 Q tri depur. ana gr. v.
 Rad. Vincetox. puluerifat. $\mathfrak{z}\text{ss}$.
M. F. Pulv. repetatur quinta l. sexta hora.

Ad §. 396.

R. S is cathart. $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Solv. in f. q. ∇ ae font. adde
 Fol. Sennae f. f. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Digere leni calore per octauam circiter horae
 partem.
D. Colat. pro Dosi.

Pro

Pro infirmis.

Rx. Fol. Senn. f. f.

Cremor. Fri ana ℥iſſ.

Coqv. in ∇ae flor. Acaciae ℥vj. per quartam partem horae, sub finem adde

Mann. Calabr. recent. ℥ſſ.

Solue leni calore, filtra, adde, cum tantillo Sacchari,

℞ci dest. Anisi gtt. ij.

D.

Rx. ∇ae Flor. Acac. ℥vj.

Mellis despumat.

Syr. de Althaea ana ℥ſſ.

M. D. ℥j. pro dosi.

Ad §. 397.

Rx. Rad. Polypod.

Glycyrrh.

Gramin. ana ℥j.

M. C. coqv. c. Mens. iv. ∇ae font. per quadrant. horae,

Rx. Colat. Mens. ij. adde

Syr. de Althaea.

Diacodii Mont. ana ℥j.

M. D. Capiat aeger altera quaque hora ℥ij-iiij.

Rx. Rad. Althaeae.

Glycyrrh.

Foenicul.

Passul. min. ana ℥j.

Caric. pingv. no. v.

M. C. Coqv. in ∇ae font. Mens. iv. per quadr. horae, sub finem adde Flor. Papav. rhoead. p. iv.

D. Colatura, cui admisceri potest Syr. Capill.

Vener. ℥j. pro dosi.

li 3

Rx. Gummi

R. Gummi ammon. ʒss.
ti squill. ʒss.

Terendo solue, adde

∇ae Veronicae

Syr. de Althaea ana ʒss.

D. ad Vitr.

Ad §. 404.

R. Syr. de Eryfimo Lobel. ʒijss.
Diacod. Montan. ʒvj.

M. D. ad Fictile. S. *Zuweilen einen halben
Löffel voll.*

Ad §. 421.

R. ∇ae Hyssopi.

Scabios. ana ʒij.

Amygdal. dulc. ʒij. adīce atque cum rīsdem
tere et mīſce Balsam. de Copaiua gtt. vj.

M. F. Emuls. D. ʒj. altera quaque hora, *oder
täglich etlichemal ein paar Löffel voll.*

Ad §. 442.

R. Essent. carminat. Wedel.

Gent. rubr. ana ʒij.

Mixt. simpl.

Liqv. anodyn. min. ana ʒj.

M. D. S. 50. *Tropfen zu nehmen.*

R. T. ae O-II mart. Ludovici.

Essent. Centaur. min.

Liqv. ∇ae fol. Tri ana ʒij.

D. D. 50-60. gtt. pro dosi.

Ad

Ad §. 443.

℞. Empl. Oxyroc.

de Tacamah. ana q. s.

Malax. c. f. q. Balsam Peruv. dein ℥iſſ.

ducatur super alutam et

F. Scutum stomachale, cui adsperge

℞ci Macis.

Caryophyll.

Absynthii ana ℥ſſ.

D.

℞. Empl. de Crusta panis ℥ij.

℞ci Nucistae express.

Balsam. Peruv. ana ℥iſſ.

℞ci dest. Caryophyll.

Rutae.

Maioran. ana gtt. xv.

Malax. F. Empl. ducatur. super alutam, et F.

Scutum stomachale.

℞. Corporis pro Balsamo ℥ij.

Balsam. Peruv. ℥ſſ.

℞ci dest. Macis.

Anisi.

Foenicul. ana ℥ſſ.

M. D. ad Pyxidulam, S. *Die Gegend des Magens zu bestreichen.*

Ad §. 445.

℞. Extr. Centaur. min. c. vino parati

Cascarill. ana ℥ij.

℥ae fol. Fri ℥iij.

℥ae Cort. Orant. l. Meliss. ℥ij. M. Dig.

per breue tempus. S. ℥ſſ. pro dosi,

Ii 4

℞. Magnes.

R. Magnes. albae ʒij.
 ℞ is cathart. ʒw.
 ℞ tri depur. ʒij.
 M. F. Pulv. diuid. in 4. partes.

R. Magnes. alb. ʒij.
 ℞ is cathart. ʒss.
 M. F. Pulvis tenuior, D. S. *Laxierpulver auf einmal in einem Glase Wasser zu nehmen.*

Ad §. 454.

R. Cretae subtil. candid. ʒiʒ.
 Calami aromat. condit. ʒj.
 Macis ʒij.
 Sacch. albi in ∇ a fol. q. s.
 M. F. Morfuli.

R. Lap. 69. ppt. ʒiʒ.
 Corall. rubr. ppt. ʒvj.
 Nucis myrist. pulueris. ʒij.
 Sacch. in ∇ a Rosar. fol. q. s.
 M. F. Morfuli.

Ad §. 460.

R. Herb. Melissae
 Matricariae
 Melilot.
 Rutae ana Mʒ.
 Flor. Chamom. Mʒ.
 M. C. coqv. in f. q. ∇ ae font.
 R. Colatur. viij-x. adde
 Terebinth. c. vitello oui fol. ʒij.
 ℞ ei Laurin. ʒij.
 ℞ tri depur. ʒj.
 M. F. Clyster.

R. Essent.

R. Essent. Castorei ℥j.
 Liqv. anod. min. Hoffm. ℥iij.
 — tus bezoard. Buffii ℥℥.
M. D. 40. *Tropfen.*

R. ∇ae dest. Menth. f. vino
 Meliss. f. vino
 flor. Sambuc. ana ℥ij.
 Laudani opiat. gr. ij.
 Ess. Castorei ℥ij. l. ℥iss.
M. Capiat aeger omni bihorio ℥j.

R. Vnguent. Dialth. Fernel.
 Gumm. Galbani in vitello oui sol.
 Olei Chamom. vulg. coct. ana ℥j.
 dest. Carui.
 Menth. ana ℥℥.

M. F. Linimentum. Adplicetur calidum abdomini
 c. multa frictione.

Vel si aegra deglutire adhuc potest, profunt
 Pilulae.

R. MP. Becheri ℥ij.
 Gummi Galbani.
 Asae foetidae.
 Myrrhae.
 Extr. Castor. ana gr. xv.
 Croci orient. gr. viij.

M. F. Pilul. ex ℥j. no. viij. Capiat aegra ℥j. ho-
 ris matutinis, alterum vespertinis per aliquot
 dies; superbibat Decoctum quoduis, v. g. Rad.
 Cichorei, si fieri potest, recentis.

Ad §. 466.

℞. Magnes. alb. per calcinat. ppt. ʒij.

℞ei ʒri per deliqv. ʒj.

℞tri in ∇ae solut. ʒj.

His affunde ∇ae font. Mens. viij.

Coqv. per dimid. hor. Colaturam ferna ad vsum.

Ad §. 467.

℞. Rad. Cichor. rec. libr. iʒ.

Contunde in mortario lapideo,

Coqv. c. ∇ae Mens. iij.

adde Colaturae.

Oxymellis ʒj. l.

Syr. v. Rad. aperient. ʒj.

℞tri depur. ʒj.

Bibat aeger calide.

℞. Gummi ammon.

Galbani

Asae foetid. ana ʒj.

Extr. Rhab. ∇si ʒiʒ.

Balsam. Peruv. ʒj.

Terebinth. Venet. q. f.

M. F. Pil. Capiat aeger bis vel ter per diem ʒss.
superbibat Decocti Cichorci rec. ʒij-iiij-iv.

Ad §. 473.

℞. Vnguent. de Althaea

℞ei Cappar. ana ʒj.

dest. Cumini

Foenicul. ana ʒj.

M. F. Linimentum pro vſu externo.

℞. Empl.

R. Empl. de Gumm. ammoniac. Foresti

Cicuta ana q. s.

Malaxetur c. Oei Cappar. f. q.

Ducatur super alutam et F. Empl. ad magnitudinem palmarum.

Ad §. 477.

R. Ois cathart. Angl. ʒvj. l. ʒj.

Solv. in ∇ae font. ʒiij. l. ʒij.

adde

Rhabarb. puluerifat. ʒij.

Stent in leni digestionem per noctem. Filtra. D. pro vna dosi.

Compositio Saponis LENTILII.

R. Cinerum Absynth.

Iuniperi.

Agrimoniae ana Mij-iiij.

C. f. q. ∇ae font. F. Lixiuum forte.

R. Huius Lixiui Mens. vj.

Coque ex eo

Rad. Rubiae tinct.

Filicis ana ʒij.

Bardanae ʒiij.

Herb. Marrub. alb. Mij.

Summit. Cent. min. Mij.

Cola et cum Colatura et Sebo bouillo liquato f. a. coque ad consistentiam Smegmatis vel Saponis; sub finem adde

Croci orientalis pulueris. ʒij.

Effunde in Capsulas lineas et vsui serua. Huius Smegmatis ʒj-ʒiij-ʒij. soluantur c. lacte vaccino calido, et bibat aeger bis per diem calide eandem quantitatem.

R. Empl.

R. Empl. de Melilot.
Cicuta ana ℥j.

Gummi ammon.

Galbani cum Spir. vini solut. ana ℥iij.

M. F. c. f. q. ℞ ei Cappar. Emplastrum. Ducatur
super alutam ad magnitudinem duarum palma-
rum, imponatur hypochondrio dextro, vel re-
gioni hepatis.

R. ℞ ei Anethi ℥ss.
dest. Absynthii.
Carui ana ℥ss.

M. F. Linimentum.

Ad §. 482.

R. Rad. Polypod.
Cichor. ana ℥ss.

Tamarind. ℥i℥.

Crem. Fri 3vj.

M. C. C. coqv. in ∇ae font. Mens. iv. per dimi-
dium horae adde

℞tri depurat. ℥i℥.

M. D. S. Capiat aeger omni bihorio ℥ij.

R. Rad. Polypod. ℥j.
Cichor.

Vincetox. ana ℥ss.

Bryoniae ℥j.

Rhabarb. ℥i℥.

Summit. Cent. min. Mij.

Sem. Petrosel.

Nasturt. aquat. ana ℥ij.

℞is Therp. Carolin. ℥i℥.

M. D. in Cilicio, S. *Species zum Kräuterwein.*

Adfundatur primo ∇ae font. feruidae Mens. j.

et post Vini Rhenan. eadem quantitas, bibat

aeger horis matutinis ℥ij. circiter.

Ad

Ad §. 483.

R. Auen. excortic. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Rad. Graminis

Cichorei

Tamarind. ana $\mathfrak{z}\text{ss}$.M. C. coqv. in ∇ ae font. Mens. j. per dimidium horae,

Colaturae adde

Oxym. simpl. $\mathfrak{z}\text{ss}$. \odot tri depurat. $\mathfrak{z}\text{j}$.M. Capiat aeger subinde et omni bihorio $\mathfrak{z}\text{j}$ -ij.R. Tamarind. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Prunor. + do - dulcium

Passul. minor. ana $\mathfrak{z}\text{ss}$.Rad. Cichor. $\mathfrak{z}\text{ij}$.Coqv. in ∇ ae font. Mens. iv. per quadrant. horae,

R. Colat. libr. ij. adde

Syrup. Flor. Persicor. $\mathfrak{z}\text{j}$. \odot tri depur. $\mathfrak{z}\text{j}$.M. Capiat aeger quaque hora $\mathfrak{z}\text{j}$. circiter, donec alius sit soluta.

Ad §. 483.

R. Syrup. de Cichor. c. Rhab. $\mathfrak{z}\text{ss}$.Sapon. Venet. $\mathfrak{z}\text{ij}$. ∇ ae Cort. \odot rant.Cerafor. ana $\mathfrak{z}\text{ss}$.M. D. S. *Dem Kinde nach und nach einzuflossen.*

Ad §. 492.

R. Rad. Ipecac. gr. xxv.

Medull. Rhabarb. $\mathfrak{z}\text{ss}$. l. gr. xv.

M. F. Pulv. D. pro dosi.

R. Spec.

R. Spec. emoll. ℥ij.

carminat. ℥j.

M. Coqv. in f. q. lactis pinguioris.

R. Colat. ℥x. adde

℞ ei Amygdal. dulc. ℥j.

Terebinth. Venet. c. vitello oui subact. ℥ss.

M. F. Clyster.

Ad §. 500.

R. Cort. Cascarill.

Corall. rubr. ppt. ana ℥ij.

Theriac. coelest. gr. iv.

M. F. Pulv. diuid. in 4. partes. Capiat aeger
vnam altera quaque hora ex ∇a Meliss. f. vino.

R. ∇ae dest. Meliss. f. v.

Cort. Crant. ana ℥ij.

Cinnam. cydon. ℥j.

Corall. rubr. c. +do Citri satur.

Matr. Perlar. ppt. ana ℥ss.

Theriac. Andromach. ℥j.

Capiat aeger altera quaque hora ℥j-ij.

Ad §. 501.

R. Rad. Althaeae.

Valer. hortenf. ana ℥ss.

Herb. Abrotani

Centaur. min. ana Mj.

Flor. Chamomill. vulg. Mij.

Sem. Carui

Foenicul. ana ℥ij.

M. C. C. coqv. in f. q. ∇ae,

R. Colatur. ℥viiij-x. adde

Terebinth. Venet. c. vitello oui solut. ℥ij.

℞ ei cocti Rutae ℥j.

M. F. Clyster.

Ad

Ad §. 511.

℞. Rad. Ipecacuanh. ℥i℥.

▽ae flor. Acac. ℥vj.

Stent in leni calore per aliquot horas vel noctem;
 aeger horis matutinis bibat mox huius Infusi
 ℥ij-iiij. et post, donec vomitus sequatur suffi-
 ciens, quaque hora ℥j.

Ad §. 513.

℞. Cort. Simaroubae minutim sectae ℥ij.

Coqv. in ▽ae commun. libr. ij. ad remanent. dua-
 rum tertiarum. Div. in 4. partes, ex quibus
 quarta pars tepide tertia quaque hora propi-
 netur.

Ad §. 517.

℞. Spec. emoll. ℥ij.

Fol. Sennae ℥℥.

Coqv. in f. q. ▽ae font.

℞. Colatur. ℥x. adde

Electuar. de Hiera picra

Mellis anthosat. ana ℥℥-℥℥.

Extract. Hellebor. nigr. ℥℥.

M. F. Clyster.

℞. Fol. Sennae ℥℥.

Peti ℥j.

Coqv. in ▽ae q. s.

℞. Colatur. ℥x. adde

Elect. de Hiera picra

Mellis anthosat. ana ℥℥.

M. F. Clyster.

℞. □ae

Rx. \square ae fani hominis $\mathfrak{z}\text{viij}$.

Coqv. c. fol. Peti adde

Colaturae

Mellis $\mathfrak{z}\text{j}$.

\ominus is Gemmae $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. F. Clyster.

Rx. ∇ ae font. $\mathfrak{z}\text{x}$. in ea solue.

\ominus is Gemmae $\mathfrak{z}\text{ss}$ - $\mathfrak{z}\text{vj}$.

M. F. Clyster.

Rx. \mathcal{O} ei Amygdal. dulc. rec. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

Mann. Calabr. depur. rec. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

\mathcal{O} ei dest. Rutae l. alius gtt. iiij .

M. D. S. *Mit dünner Hünnerbrähe nach und nach zu nehmen.*

Rx. Tamarind.

Passul. min. ana $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Crem. \mathfrak{F} ri.

Rhab. elect. ana $\mathfrak{z}\text{iss}$.

Coqv. in f. q. ∇ ae font.

In Colatur. solue

Mann. Calabr. rec. $\mathfrak{z}\text{iss}$.

Clarificetur, adde

\mathcal{O} ei dest. Cort. \bigcirc rant. gtt. iv-v .

Sumat. acger pedeatentim intrunius vel alterius horae tempus.

Ad §. 518.

Rx. Spec. emoll.

carminat. ana $\mathfrak{z}\text{iss}$.

M. C. C. coqv. in f. q. ∇ ae, adde

Mellis anthosat. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Terebinth. vitello oui subact. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

M. F. Clyster.

Ad

Ad §. 520.

R̄. Mann. Calabr. rec. ℥iij.

Crem. Fri ℥ij.

M. Coqv. leni \triangle e in f. q. ∇ ae font.

Colatur. adde

℞tri depur. ℥ij.

M. bibat aeger quaque hora aliquot vncias, donec alius soluta fuerit.

R̄. Herb. Adianth. alb.

Flor. Chamom. vulg. ana Mij.

Sem. Foenicul. ℥ij.

Flaued. Cort. \odot rant. mali rec. rasp. no. j.

M. C. C. F. Species D. ad Scatulam, S. *Species, davon als von Thée zu trinken.*

Ad §. 524.

R̄. Herb. Fumar. rec.

Cochlear.

Chaerephyll. ana Mij.

M. C. ebulliant c. Seri lactis libr. iv. in vase clauso, exprimantur fortiter, et aeger bibat quaque hora ℥j-ij.

Conducunt etiam Pilulae cum Gummi ammon.

Ad §. 530.

R̄. S̄rii dule. gr. v.

Sacchar. albissimi gr. xv.

M. F. Pulv. D. in duplo S. *Abends eins, das andere früh zu nehmen.*

K k

R̄. Rad

Rx. Rad. Ialapp. gr. xxv.

Diagryd. $\frac{1}{2}$ rat. gr. v.

M. F. Pulv. catharticus pro homine adulto post anthelminticorum usum.

Rx. Semin. Santon. $\mathfrak{z}\text{j}$.

\mathfrak{Q} rrii dulc. rite ppt. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Sacch. albi $\mathfrak{z}\text{v}$. l. q. s.

M. F. Morfuli no. 24. circiter.

D. vna portio pro dosi.

Vel

Rx. Conserv. Absynth. vulg.

Semin. Santon. f. Cinae

Tanaceti ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Aethiop. mineral. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Sacchar. albi in ∇ a Rosar. sol. $\mathfrak{z}\text{v}$.

M. F. Morfuli.

Rx. \mathfrak{Q} rrii curr. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Coqv. per spatium horae c. ∇ ae font. libr. j.

Decantetur et D. pro dosi $\mathfrak{z}\text{j}$ - $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Rx. Vnguent. de Althaea $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Aloes pur. puluerif.

Fellis Tauri ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. F. Vnguentum, cuius $\mathfrak{z}\text{j}$ -ij. abdomini illi-
niatur.

Rx. Asae foetidae

Extr. Rhabarb.

Tanaceti

Aloes depur.

Myrrh. elect.

\mathfrak{Q} rrii dulc. ana $\mathfrak{D}\text{j}$.

Croci

Castorei ana gr. iv.

M. F. Pilul. ex $\mathfrak{D}\text{j}$. no. xv. Pro dosi exhiben-
tur yij - x.

Rx. Stanni

R. Stanni pulueris. ℥iſſ.

Syrup. vulgar. ℥viiij.

Div. in partes aequales, dimidium detur vespere,
altera pars iterum diuisa ſqq. diebus.

R. Herb. Absynth.

Tanacet. ana Mj.

Semin. Santonici ℥ſſ.

M. C. C. coqv. in f. q. Lactis, adde

Mellis ℥j.

Elect. de Hiera picra pro Clysteribus ℥ſſ.

M. F. Clyster pro adulto.

R. Herb. Centaur. min. Mij.

Sem. Santonici ℥ſſ.

M. C. C. coqv. c. f. q. Lactis,

R. Colatur. ℥viiij. adde

Œei Amygdal. amar. ℥j.

Fellis Tauri ℥ſſ.

M. F. Clyster pro adulto.

Ad §. 538.

R. ▽ac flor. Acaciae

Fragor.

Ceraſor. nigr. ana ℥ij.

Oxymel. squill.

Gummi ammon. vitello oui ſol. ana ℥ſſ.

M. Capiat aeger altera vel tertia quaque
hora ℥j-iſſ.

Ad §. 552.

Rx. Gummi Galbani
 Asae foetidae
 Gummi ammon.
 Extr. Castorei ana $\mathfrak{z}\text{j}$.
 Myrrhae $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 Croci oriental. gr. xv.

M. F. c. Balsam. Peruv. Pilul. ex $\mathfrak{z}\text{j}$. no. x. Totidem deglutiat aeger horis matutinis et vespertinis per plures dies.

Ad §. 553.

Rx. Cort. Peruv. elect. puluerifat. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Winterani

Limat. $\mathfrak{z}\text{is}$ purae ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

M. D. in Cilicio, adfundatur Vini Rhenani merac. non manganifat. libr. iss .

Stent per 24. horas in cella.

Capiat aeger bis per diem vacuo ventriculo $\mathfrak{z}\text{ij-ij}$.

Rx. Limat. $\mathfrak{z}\text{is}$ pur. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

Vini Rhenan. aciduli frigid. libr. ij .

Stent in loco frigido per 48. horas, post Colatura coquatur c. f. q. Sacchari. D. ad $\mathfrak{z}\text{ii-}\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ aliquoties per diem.

Ad §. 567.

Rx. Cort. med. Sambuc. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Coqv. in Seri lactis libr. j . ad remanentiam duarum tertiarum. Div. in 3. l. 4. partes, quas aeger intra tempus xxiv. horarum bibat.

Rx. Rad.

R. Rad. Squillae rec. lib. j.

Vincetox. $\frac{1}{2}$ rifat. $\frac{3}{4}$ iv.

Contund. in pulpam, quae, in vmbra ficcata,
iterum terendo in puluerem redigenda est.

R. Huius pulueris \mathfrak{ss} .

Rad. Ari

Pimpin. alb. $\frac{1}{2}$ rif. ana gr. v.

\odot tri depurat. gr. ij.

M. F. Pulv. D. pro vna dosi pro viribus aegro-
tantis semel vel bis per diem.

R. Rad. Squill. rec. $\frac{3}{4}$ j.

Coqv. in vase clauso c. Vini Rheñani libr. j. ad
remanentiam duarum tertiarum.

D. $\frac{3}{4}$ j. semel vel bis per diem.

R. Rad. Ialapp. gr. xxv.

Diagryd. $\frac{1}{2}$ ti gr. v.

M. F. Pulv. pro vna dosi.

Ad §. 560.

R. \ominus is Stipit. Fabar. $\frac{3}{4}$ ij.

adfunde

Vini Rhenani merac.

∇ ae font. ana libr. j.

Stent per noctem, mane bulliant. D. per diem
 $\frac{3}{4}$ j. ij. pro dosi.

R. Ciner. Stipit. Fabar.

Genistae ana libr. \mathfrak{ss} .

Vini Rhenani frig. libr. ij.

Stent per 48. horas in loco frigido, et aeger ca-
piat $\frac{3}{4}$ ij. ij. pro dosi per diem.

R. Rad. Ari

Squillae

Bryon. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Herb. Trifol. fibr.

Summit. Cent. min. ana $\mathfrak{M}\mathfrak{j}$.

Bacc. Lauri

Cort. Winteran. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Fol. Senn. f. f. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

Agar. in petia ligati $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$.

Öis $\mathfrak{r}\mathfrak{i}$ \mathfrak{z} .

M. C. C. F. Species pro nodulo, cui adfun-

datur

√ae feruidae libr. \mathfrak{j} .

Vin. Rhenan. merac. libr. \mathfrak{rv} .

D. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. circiter pro dosi.

R. Rad. Mechoacann. \mathfrak{f} fat. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$.

Adfunde Vini merac. $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$. Stent per noctem, ma-

ne deglutiat et pulvis et vinum.

R. Pilul. aloëphang. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Elaterii gr. $\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. l. $\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

cum Bals. Peruv. q. \mathfrak{f} .

F. Pilul. D. pro vna dosi.

R. Rhab. opt. \mathfrak{f} risat. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

√ae fol. $\mathfrak{r}\mathfrak{i}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$.

M. Coqv. in f. q. √ae flor. Acac. l. simpl. per

dimidium horae, sub finem adde

Fol. Sennae \mathfrak{j} .

D. Colatura pro dosi.

Ad §. 570.

℞. Extr. Gentian. rubr.

Cent. min.

Cort. Cascarill. ana ʒj.

℞is ʒri ʒij.

▽ac Meliss. c. vino ʒiij.

Digere leni calore ad solutionem vsque. Colaturae adde

℞ei dest. Cort. 〇rant. in Spir. vini solut. ʒj.

D. ad Vitrum. S. *Früh und bey Tische 80. Tropfen in Wein zu nehmen.*

℞. Flor. Chamomill. Mij.

Centaur. min. Mj.

M. C. coqv. in f. q. ▢ae sani hominis.

℞. Colat. ʒvij.

Terebinth. c. vitello oui solutae-ʒvj.

℞is commun. ʒiʒ.

M. F. Clyster.

Ad §. 587.

℞. Extr. panchymag. Crollii

ʒii dulc. ana gr. viij.

Resin. Ialapp. gr. v.

Diagryd. ʒti gr. iij.

M. F. Pilul. c. Ess. Succin. no. xxiv. D. pro dosi.

℞. Resin. Ialapp. gr. viij.

Tere c. totidem Amygdal. dulc. excort. adde

▽ac flor. Acac. ʒij.

ʒrii dulc. gr. vij.

℞ei dest. Macis c. tantillo Sacch. gtt. ij.

M. F. Emulsio. Superbibat aeger haustum ▢ae font. et eluat os.

Kk 4

℞. Rad.

Rx. Rad. Ialapp.
 Zrii dulc. ana gr. viij.
 Diagryd. ʒti gr. ij.
 Conserv. Rosar. pallid. gr. xv.
 Syr. Rosarum pallid. q. f.
M. F. Bolus. D. pro vna dosi.

Ad §. 589.

Rx. Rad. Helenii
 Bardan.
 Scorzon.
 Lapathi ana ʒʒ.
 Herb. Fumar.
 Card. bened.
 Agrimon. ana Mʒ.
 ʒii in petia ligati ʒʒ.
 Bulliant in ∇ae font. Mens. iij. adde
 Colaturae
 Syr. Fumar. ʒi-ij.
 Capiat aeger bis vel ter per diem ʒij-iiij.

Ad §. 590.

Rx. Vnguent. de Cerussa ʒj.
 Lap. 69 in tenuiss. pollinem tritorum ʒij.
 ʒci Ligni Rhodii gtt. v.
M. F. Vnguentum pro vsu externo.

Formula ad Aquam phagadaenicam.

Rx. Calcis viuae, quantum fieri potest, recentis, libr.ʒ.
 ∇ae font. feruidae libr. iv.
M. agitando aquam, dein per inclinationem effunde.
Rx. ae huius Calc. viv. libr. I.
 Zrii sublimat. gr. xij
 Tere in mortario lapideo in tenuissimum pollinem
 mercurium sublimatum, atque subtritura ad-
 funde ab initio guttatim ∇am Calc. viuae, et
 sic misce.

Lana-

Lauamentum GORTERI.

R. Ciner. clauell. ℥ij.
 \ ae comm. libr. iv.

Liquentur et ebulliant moderato admodum ∇
 in vase aeneo; in filtrato liquore extingue
 Calc. viuae ℥iv. quibus extinctis adde Plumbi
 vsti j. bulliant inuicem.

D. Colatura pro vsu externo.

R. Pingued. Omenti vitul. post huius coctionem
 ∇ae innatantis ℥j.

Spermat. Ceti

Cerae alb. ana ℥ss.

Vnguent. Neapol. ℥vj.

Balsam. de Copaiua ℥j.

℞ei Ligni Rhodii gtt. viij.

M. per triturationem c. ∇a Rosar. in mortario.
 F. Vnguentum.

R. Pulp. rad. Enulae rec. ℥ij.

Vngv. Neapol. ℥vj.

Pomat. ℥iss.

Flor. Benzoes ℥j.

M. F. Vnguentum, quod vesperi ad pisi magni-
 tudinem illiniendum est carpo manus atque
 dorso pedis.

R. Fri calcinat. ℥iss.

℞rii dulc. ℥ss.

Flor. Aris ℥j.

Rad. Ireos Flor. puluer. ℥ss.

℞ei Ligni Rhodii gt. iv.

Sapon. Venet. ℥ss.

M. F. Globuli.

Ad §. 591.

R. C. C. f. ∇ e ppt.ßii diaphoret ana $\mathfrak{D}\text{ss}$.Flor. \mathfrak{A} ris gr. v.

M. F. Pulv. D. vnus bis per diem.

Ad §. 600.

R. \mathfrak{O} tri depurat. $\mathfrak{Z}\text{ss}$.Solue in ∇ ae font. libr. v. addeLigni Santali rubr. $\mathfrak{Z}\text{ss}$.Spir. Vini camphorat. $\mathfrak{Z}\text{ij}$.

Digerantur leni calore.

Capiat aeger bis per diem vel ter $\mathfrak{Z}\text{j}-\text{ij}$.

Ad §. 601.

R. Gummi ammon. depur.

Sagapeni

Extr. Hellebor. nigr.

Torchisc. Alhandal

 \mathfrak{S} rii dulc.

Res. Lign. Guaiaci

Balsam. de Copaiua ana $\mathfrak{Z}\text{j}$.M. F. c. Eff. Succini Pilul. ex $\mathfrak{D}\text{j}$. no. xx. quarum capiat aeger xxi i. pro dosi.R. Mann. rec. depur. $\mathfrak{Z}\text{j}$.Solue in Seri Lactis $\mathfrak{Z}\text{iv}$.

Colaturae adde

Pulp. Cassiae rec. extr. $\mathfrak{Z}\text{ij}$. \mathfrak{D} ei del Cedro c. tantillo Sacch. gt. ij.

M. D. pro dosi.

R. Rad.

R. Rad. Sassaaparill.

Chin. ponderos.

Scorzon. ana ℥ss.

Vesperi adfund. ∇ae font. Mens. ij. Mane coque
ad remanentiam duarum tertiarum, sub finem
coctionis adde

Rad. Polypod. ℥ss.

Fol. Senn. f. c. ℥ij.

M. D. Bibat aeger hoc decoctum intra spatium
xxiv. horarum, quod seqq. diebus continuan-
dum est.

Ad §. 602.

R. Ess. Succini

℞ae ℥ij ana ℥j.

Balsam. Peruv. nigr. ℥ss.

M. D. 30. gtt. bis l. ter per diem.

R. Balsam de Copaiua ℥ss. l. ℥ss.

Solve c. f. q. Vitelli oui, adde

∇ae Plantag. ℥vj.

Syr. Papav. alb. ℥ss.

M. Bibat aeger repetitis vicibus hanc Emulsionem
intra spatium xxiv. horarum.

R. Terebinth. vulg.

Rhab. opt. ana ℥ij.

Pulv. Glycyrrh. q. s.

M. F. Pilul. ex ℥j. no. x. Sumat aeger quotidie
per vices ℥ss. - ℥ij.

Ad §. 603.

R. Aloes hepat. ℥j.

Coqv. in ∇ae Calc. viv. ℥vñj.

R. Colatur. ℥ij. adde

Tutiae subtiliss. ℥iij. ℥ss.

℥ij - ti c. Tutia bene triti gr. ij.

M. pro Iniectione in vrethram.

Ad

Ad §. 604.

R_x. ∇ ae Petrofel.Flor. Tiliae ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.Sem. iv. frigid. maj. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

M. F. Emulsio, adde

Balsam. Peruv. vitello. oui sol. gtt. iv - vj - viij.

 C tri depurat. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Capiat aeger quarta l. sexta quaque hora quartam
huius potionis partem, quae per aliquod tem-
pus continetur.

Ad §. 606.

*Formula QVERCETANI.*R_x. Herb. Menthae

Distamni

Rad. Ireos Florent. ana $\mathfrak{z}\text{j}$.

Sem. Agni casti

Rutae

Lactucae ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Puluerisatis adde

Terebinth. $\mathfrak{z}\text{iv}$.

Vini albi libr. ij.

M. Coniic. in Alembicum et destillentur per bal-
neum vaporosum. Dosis est $\mathfrak{z}\text{i}$ - $\mathfrak{z}\text{iss}$. et bis l.
ter potest repeti per diem.

Ad §. 613.

R_x. Rasur. Ligni Sanct. pond. $\mathfrak{z}\text{vj}$. C is $\mathfrak{z}\text{ri}$ \mathfrak{ss} .

Infund. c. ∇ ae font. Mens. vj. post iv. circiter ho-
ras coque in vaso clauso per horam, tunc adde

Rad. Polypod. $\mathfrak{z}\text{iss}$.Cort. Ligni Sassafr. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Cum prioribus iterum in vase clauso coque per di-
midium horae. D. Colatura. Huius decocti
aeger bibat sexta quaque hora circiter $\mathfrak{z}\text{iv}$.

Ad

Ad §. 619.

- R. Vini albi libr. j.
 ∇ae Plantag. Rosar. ana ℥iij.
 ○pigmenti natiui ℥ij.
 Virid. aeris ℥j.
 Myrrhae
 Aloes ana ℥ij.

Terantur subtilissime, et post misce exacte. Hoc
 collyrio imbuitur penicillum, quo detergantur
 vlcera valde impura. Si iusto valentius est, ad-
 fundi potest maior ∇ae copia.

Ad §. 620.

- R. Conserv. Scabios. ℥℥.
 Grii dulc. rite ppt. gr. xv.
 Syrup. Fumariae. q. s.
 F. Bolus obduc. fol. ○i, l. consperg. Saccharo.

Ad §. 628.

*Infusum pro homine valde robusto et agresti
 scorbutico.*

- R. Raphan. rust. rec. radula rasi ℥ij.
 Herb. rec. Cochlear.
 Fumar. ana Mij.
 Sem. Sinap. contus. ℥℥.
 Vini Rhenan. merac. Mens. iij.
 M. Stent in loco frigido. Bibat aeger ter l. quater
 per diem ℥iij, circiter.
 R. Succo rec. Cochlear.
 Nasturt. ∇tici ana ℥iv.
 Raphan. rust. ℥iij.
 M. D. ℥j-iij. aliquoties per diem c. Saccharo.
 R. Calcis viuae ℥ij.
 Coqv. in ∇ae font. libr. ij. Colaturae sumat aeger
 bis per diem ℥℥. et superbibat semper ℥iv.
 circiter Seri Lactis.

Ad

Ad §. 630.

- ℞. Mellis rosati
 Succ. Citri ana ʒj.
 Lutus Ois comm. 3ʒ.
 Vae Rutae ʒiv.
 M. D. S. *Im Munde zu halten.*
 ℞. Vae Rutae ʒviiij.
 Lutus O li ʒj.
 M. D. S. vt supra.
 ℞. Succ. Cochlear.
 Mellis rosat. ana ʒj.
 Tinct. Laccae ʒij.
 Lutus Otri duic. ʒiʒ.
 M. Adplic. mediante penicillo.

Ad §. 636.

*In declinatione Rheumatismi laudatur formula
 sequens ab HOFFMANNO.*

- ℞. Vae Anhaltinae ʒij.
 Balsam. Peruv. ʒij.
 Theriac. veter. ʒj.
 Digerantur. Colat. adde
 Essent. Croci
 Castorei
 Nucistae ana ʒij.
 Camphor. ʒj-ʒiʒ.
 M. D. pro vsu externo.

*Aduersus torporem membri post rheumatis-
 mum relictum.*

- ℞. Axungiae hum. ʒij.
 Balsam. Peruv.
 Olei Caryophyll. ana ʒij.
 M. D. S. pro vsu externo.

Ad §. 667.

R. Rhabarb. puluerifat. opt. ℥j.

Mann. opt. rec. ℥iſſ.

Cremor. ꝑri ℥ij.

His affunde ∇ae flor. Chamomill. vulgar. ℥vj. leni calore digere, adde Paſſul. min. bene lotarum ℥ij. inſpiſſentur leni calore in vaſe ſtanneo, ſub finem adde

Cort. Cinnam. puluerifat. ℥j.

Capiat aegra aliquoties per diem harum paſſularum tantum, quantum cochleari commodè excipi poteſt.

R. Crem. ꝑri ℥j.

Ꝑtri depur. ℥j.

Coqv. in ∇ae font. ℥iij. et in Colat ſolue

Mann. Calabr. ℥iſſ.

D. pro doſi.

Ad §. 668.

R. Rhab. opt. puluerifat. ℥ſſ.

Lap. 69 c. +do Citri ppt.

Corall. rubr. ppt. ana gr. v.

℞ei Syrae gtt. j.

M. F. ⚄is in triplo, quorum vnus detur tertia quaque hora c. ∇a Meliſſ. et Cort. Cram. Vbi aetus vrget, loco ℞ei deſt. adici poſſunt ij. iij. gr. Ꝑtri.

R. Caſtorei ℥ſſ.

Corall. rubr. gr. xv.

Ꝑtri depur. gr. v.

M. F. Pulv. diuid. in tres aut quatuor partes. De-
tur vna in tertia quaque hora.

Ad

Ad §. 681.

- R. Rhabarb. opt. ʒj.
 Crem. Fri ʒʒ.
 Passul. min. ʒiʒ.
 M. C. coqv. in f. q. ∇ ae font. leni Δ e, in Colat.
 solve leni calore
 Mann. Calabr. rec. et elect. ʒj.
 Depura, adde c. tantillo Sacchari
 ʒei Syrae, l. ʒei dest. Rutae gtt. ij.
 M. D. S. *Laxiertrank früh auf einmal warm
 zu nehmen.*

Ad §. 683.

- R. Pulv. Stomach. Birkmanni ʒj.
 Crytall. mont. ppt.
 Sem. Nigellae
 Anisi ana ʒij.
 Sacchari ʒiʒ.
 M. F. grosso modo Pulv. D. ad Scatulam.
 Sumat foemina bis l. ter per diem ʒj.

Ad §. 686.

- R. Syr. de Cichoreo c. Rhab. ʒʒ.
 Violar. ʒij.
 M. D. S. *Saft vor das Kind.*
 R. Syr. de Cichor. c. Rhab.
 ∇ ae Meliss. f. v. ana ʒʒ.
 Sapon. Venet. ʒj.
 M. D. S. vt supra.

Ad §. 688.

HOFFMANNI Formula.

- R. Vini dulc. Canariens. ʒiʒ.
 ∇ ae Meliss. f. v. ʒj.
 Vitell. ouor. rec. ʒij.
 Sacchari q. s. pro sapore
 D. Subinde infanti valde debili ʒʒ.

Ad

Ad §. 690.

- R_x. Seri lactis ℥iij.
 Sapon. Venet. ʒj.
 Solue leni calore, adde
 Mellis ʒiſſ.
 M. F. Clyster pro infante.
 R_x. Rad. Lilior. albor. ʒiſſ.
 Flor. Chamomill. Mj.
 Sem. Foenicul. contus. ʒiſſ.
 Coqv. in f. q. Seri lactis.
 R_x. Colat. ʒiij.
 ℞ei Lilior. alb. ʒij.
 Sacchari ʒiſſ.
 M. F. Clyster.

Ad §. 691.

- R_x. ℞ei Amygdal. dulc. rec. f. ∇^e ppt. ʒj.
 destill. Foenicul. gtt. vj.
 Sacchari Candi q. s.
 M. F. Eleosaccharum.
 R_x. Sperm. Ceti rec.
 Sacchari Candi puluerisat. ana ʒiſſ.
 ℞ei Amygdal. dulc. rec. f. Δ^e express. q. s.
 destill. Anisi gtt. jv.
 M. F. Eleosaccharum.

Ad §. 692.

- R_x. ℞ei costi Anethi ʒj.
 Balsam. Peruv. ʒj.
 ℞ei dest. Absynth.
 Macis
 Lauendul. ana gtt. xv.
 M. D. ad Fictile. S. *Aeufferlich den Leib da-*
mit zu bestreichen.

Ad §. 694.

- R_x. ℞ei Lilior. alb. rec. ʒiſſ.
 destill. Maioran. gtt. xv.
 M. D. S. *Aeufferlich an die Nase zu schmieren.*

L 1

Ad

Ad §. 695.

R_x. Mucilag. Sem. Cydon. ℥j.

Ceruss. ppt.

℥ii diaphoret. ana ℥j.

M. D. in Fictili.

R_x. Vnguent. alb. camphor.

℞ei Amygdal. dulc. ana ℥ss.

Cerussae alb. ℥i ss.

M. D. in Fictili.

Ad §. 696.

R_x. ∇ae flor. Tiliae ℥iv.

Pulv. bezoard. Angl.

Specif. cephal.

Tri depurat. ana gr. xv.

Matr. Perl. ppt. ℥ss.

Syr. Papav. alb. ℥ij.

M. D. S. *Alle 2. bis 3. Stunden einen Löffel voll.**Formula BOERHAAVII.*R_x. Crem. Lactis rec.

Vitell. oui ana ℥ss.

Syr. Violar. ℥iij.

∇ae Rosar. ℥i ss.

M. D. S. *Zum äußerlichen Gebrauch.*

Ad §. 706.

R_x. Medull. Rhab. elect. gr. viij.

Srii dulc. rite ppt. gr. ij.

Syrup. Rosar. pallid. ℥j.

∇ae flor. Tiliae ℥vj.

M. F. Haustus, D. pro vna dosi, S. *Einem Kinde von 2. Jahren.*

667220 * 667220

CON

CONSPECTVS ARTIS MEDENDI SINGVLIS MORBIS ACCOMMODATAE PROLEGOMENA.

De Febris in genere.

pag. 9

De Febris in specie.

Febres intermittentes.

Tertiana.	35
Febris quotidiana.	41
Quartana.	43
<i>Febres epidemicae vagae, ast malignae.</i>	47
Semitertiana.	48
Febris catarrhalis benigna.	49
- - - maligna vulgo dicta petechizans.	51
- - - petechialis vera.	55
Pestis	57
Purpura, seu Febris miliaris.	60
Variolae.	66

MORBILLI

76

Febres continuae.

Febris ephemera, seu diaria.	77
Synochus simplex et putrida.	78
Causus et Febris ardens seu biliosa.	81
Phrenitis, Paraphrenitis.	88
Angina.	94
Pleuritis et Peripnevmonia.	100
Hepatitis.	107
Inflammatio ventriculi.	110
Nephritis.	114
De Ileo morbo, seu Intestinorum inflammatione.	121
Febris lenta et hectica.	126
- - scarlatina et vtricata.	133

CONSPECTVS.

De Plethora et morbis, qui ex Plethora oriri dicuntur. 134

Haemorrhagiae.	Pag.	137
Haemorrhagia narium.		139
Haemoptysis.		142
Vomitus cruentus.		147
Vitia mensium.		150
Mensium suppressio.		153
Menstrua non boni coloris.		155
Sanguinis nimium profluuium menstruum.		156
Abortus		158
Lochiorum fluxus.		162
Haemorrhoidum fluxus.		167
Mictus cruentus.		174
Varices.		178

Morbi capitis.

Cephalalgia.	180
Coryza et Grauedo.	191
Otalgia.	193
Grauitas auditus et Surditas.	197
Tinnitus aurium.	199
Odontalgia.	200
Vertigo.	202
Morbi soporosi.	208
Apoplexia.	213
Paralysis.	221

Morbi pectoris.

Asthma.	229
- - siccum.	233
Tussis.	237
Raucitas.	243
Vomica pulmonum.	244
Phthisis.	248
Pleuritis spuria.	253
Palpitatio cordis.	254

Catarrhus

C O N S P E C T V S.

Catarrhus suffocatiuus.	Pag. 255
Polypus cordis.	260

Morbi abdominis.

Atonia ventriculi.	262
Dyspepsia.	264
Appetitus laesus, seu Anorexia.	268
Bulimus et Fames canina.	269
Malacia et Pica.	270
Ardor ventriculi, seu Cardialgia vel Soda.	271
Malum hystericum.	273
- - hypochondriacum.	279
Tumor et Scirrhus Lienis.	286
- - - Hepatis.	289
Icterus.	292
Fluxus hepaticus.	299
Cholera morbus.	302
Diarrhoea.	306
Lienteria et Coeliaca	310
Dysenteria.	313
Colica.	320
Tenesmus.	327
Vermes.	328

De Urinae excernendae difficultatibus.

Stranguria, Dysuria, Ischuria.	332
Diabetes.	337
Urinae incontinentia.	340
Fluor albus benignus.	342
Chlorosis et Furor vterinus.	345
Satyriasis et Priapismus.	350
Cacochymia et Cachexia.	351
Hydrops.	355
Tympanitis.	366
Scabies.	369
Elephantiasis et Lepra.	375

C O N S P E C T V S.

Morbi veneri, eorumque diuersi gradus et symptomata.

Gonorrhoea in utroque sexu.	Pag. 378
Lues venerea.	386
Scorbutus.	397
Rheumatismus et Arthritis vaga.	403
Podagra.	407
De Nervorum Distentione et praecipue de Epilepsia.	412
Lipothymia et Syncope.	420
Melancholia et Mania.	423

Morbi Grauidarum et Parturientium.

Sterilitas.	428
Vomitus grauidarum.	429
Alui obstructio grauidarum.	430
Diarrhoea grauidarum.	431
Foetus imbecilli curatio.	432
Partus difficilis.	ibid.
Dolores nocti et veri.	433
Vrinae suppressio grauidarum.	ibid.
De cura Mulieris sub partu.	434
Vteri inflammatio.	436
Genitalium tumor.	438
Diarrhoea Puerperarum.	439
Abdominis tumor post partum.	ibid.
Febris lactea.	440

Morbi infantum. 442

Rhachitis.	451
------------	-----

De Marcione Senum et Regimine illorum. 456



INDEX I.

R E R V M N O T A B I L I O R V M.

N V M E R V S P A R A G R A P H V M I N D I C A T.

A.

- A** *abortus.* Definitio [292.](#) quibus mensibus foemina abortum fecisse dicatur? ib. eius imminenti signa [292.](#) eius causae [293.](#) oritur quandoque ab umbilici breuitate. [293.](#)
- Abscessus* post febres [20.](#) in angina. [204.](#) eius futuri signa. ib. in hepatitide eius futuri signa. [224.](#) funestus est, si rumpitur. ib. raro soluit vertiginem. [362.](#)
- Acida* in febribus vehementioribus [54.](#) in redundantia bilis [58.](#) in peste [151.](#) magni usus sunt in febre petechizante [135.](#) aliena in purpura [159.](#) in variolis, quando omittenda? [172.](#)
- Acrida* aliena in febribus pertinacioribus [65.](#)
- Adstringentia* pestifera in ventriculi inflammatione [230.](#) aliena in mictu cruento [320.](#) in tussi [414.](#)
- Aestus* pessimum signum, si intus ab aegro percipitur frigentibus externis. [8.](#) febrilis quandoque temperatur clysteribus. [87.](#)
- Alius* post superatam tertianam adstricta, non solvenda est purgantibus, sed lotionibus [106.](#) quomodo moderari debeat in purpura [159.](#)
- Amaurosis* a phrenitide relicta [197.](#)
- Analeptica* in febribus intermittentibus, si vires deficiunt [55.](#)
- Angina* eius definitio [201.](#) diversae species ib. magnum discrimen inter veram et spuriam [202.](#) symptomatica pessima in febribus exanthematicis [204.](#) in variolis non ita timenda ib. in variolis cum delirio mala [167.](#) post delirium non ita funesta ib.
- Anglicus morbus.* vid. Rhachitis
- Anorexia* eius definitio [443.](#) variae causae ib.
- Anthrax* pestilentialis. [11.](#) Anthraces in ventriculo reperi [232.](#)
- Anxietas.* praecordiorum sub horrore [7.](#) oritur in febribus ab impedito humorum tran-

INDEX I.

- transitu: 26. a polypo cordis
ib. in febre petechizante,
qua ratione leuanda? 140.
in purpura: 154
- Apepsia* 444
- Apbonia* 644
- Apoplexia* definitio 376. mor-
bi historia ib. discrimen in-
ter exquisitam et leniorem
ib. sanguinea et serosa ib.
morbī sedes ib. quid in de-
mortuorum cadaveribus re-
periatur ib. *serosa*. eius cau-
sae 384. dignoscitur a san-
guinea colore faciei 385.
exquisita 380. apoplexiae
differentiae ab aliis morbis
377. a syncope 654. relin-
quitur a malo hypochon-
driaco 465. metuenda est
senibus, qui narium hae-
morrhagia laborant 269.
- Ardor ventriculi*. vid. Cardia-
gia.
- Arthritis* fixa 637. vaga 631.
morbo venereo superuenit
611. repressa Cephalacae
inducit 339.
- Ascites* 562
- Asthma*. morbi historia 394.
interdum periodicum est, ib.
eius sedes non semper in
pectore, sed interdum in
ventriculo; ib. *flatulentum*
ib. differt a catarrho suffo-
catorio, ib. *humidum* 395.
ficum 400. *spasticum* 403.
omnium periculosissimum,
ib. cur huic obnoxii fiant
gibberosi? 403. *Stomacha-*
le 405
- Atrophia* in pueris rachiticis
702
- Auditus* grauitas variae cau-
sae 354
- E.
- Balnea* in lue venerea 615. ad
reuocandos morbos cuta-
neos 591. eum scoriis me-
tallicis minus tuta in scabie
590.
- Bradypepsia* 444
- Brandstühle* 49
- Bulimus* 450. qua ratione dif-
ferat a fame canina? ib..
- C.
- Cachexia*. quomodo differat ab
atrophia? 559. facile mu-
tatur in Anasarcam ib. apo-
plexiam futuram indicat
315. relinquitur a febribus
20. a nimia haemorrhagia
narium 270. a nimio pro-
fluuio menstruo 290. a ma-
lo hypochondriaco 465.
- Cacochymia* post febres 20. a
plethora 264.
- Calculus*, eius partes constitui-
uae 238. in hepate vel viis
biliferis causa icteri 480.
in renibus, mictus cruenti
358. epilepsiam symptoma-
ticam inducit 648.
- Calor animalis* ab attritu san-
guinis ib. in febre a vi vi-
tae ib. bonus in febre, si in
toto corpore aequalis 10.
augetur eo tempore, quo
nouus chylus sanguini af-
funditur 12. aequalis est
interdum igni elementari 11
- Cardiacae* nocent in partu 673
- Cardiognus* infantum 692.
quibus a causis oriatur?
ib.
- Cardi-

INDEX. I.

- Cardialgia** eius definitio [402.](#)
 variae causae ib. a vermibus [527.](#) a malo hysterico [496.](#) signum instantis icteri [479.](#) symptoma in febre petechizante [131](#)
- Caries** dentium [357](#)
- Carminata** pestifera sunt in colica sanguinea [520](#)
- Carus**, eius causae [369.](#) est cum febre ib. finitur saepe nernorum distentione ib. in acutis [34.](#) significat corticis gangraenam ib.
- Catalepsis.** [644.](#)
- Catamenia.** vid. Menstrua
- Catarrhus** cohibitus causa lethargi [372.](#) frequens symptoma morbillorum [179.](#) causa odontalgiae [357.](#) *susfocatus* differt ab Apoplexia [420.](#) et asthma ib. frequens est senibus [429.](#) et infantibus [701.](#) in pueris non ita periculosus ac in senibus [432](#)
- Catoche** seu Catochus [644](#)
- Cephalalgia**, variae eius causae [329.](#) cur a male affecto ventriculo ib. *venerea* ib. scorbutica ib. gradu differt a Cephalaea et Hemisrania [328.](#) podagram praecedit [637.](#) soluitur nonnunquam sputo cruento [273](#)
- Cephalaea** [328.](#) idiopathica et symptomatica [333](#)
- Cereus** aliena in febre quartana [416.](#) in purpura [159](#)
- Chiragra** [637](#)
- Chlorosis**, nominis origo [550.](#) quomodo differat a Leucophlegmatia ib. [---](#)
- Cholera** eius definitio [489.](#) origo nominis ib. *sicca* et *humida* ib. quomodo differat a dysenteria ib. eius sedes praecipua in duodeno [490.](#) periculosior est, ubi febris accedit [491.](#) humida melior est quam *sicca* ib. accedente febre saepe mutatur in Causum [489.](#) raro salutaris est in soluendis viscerum obstructionibus [491](#)
- Claus** hystericus, morbi historia [342.](#) morbi causae [343.](#) est species cephalalgiae [328](#)
- Coeliaca** quibus a causis oritur? ib. quomodo variae eius causae dignoscantur ib. a vermibus [503](#)
- Colica**, eius definitio, [515.](#) causa morbi non posita in solo colo ib. differt a morbo Iliaco, ib. differt a nephritide ib. quando praefertim periculum afferat? ib. varia eius genera ib. causa abortus [295.](#) podagram praecedit [637.](#) *convulsiva* [516.](#) *haemorrhoidalis* [519.](#) quibus ex causis oritur? ib. *convulsiva* frequens infantibus [521.](#) *Pittonum* [523.](#) quid in cadaueribus hoc morbo demortuorum repertum fuerit? ib. huius morbi sedes princeps est in mesenterij nervis [524](#)
- Colostrum** [682](#)
- Coma somnolentum** et *vigil* [369](#)
- Comedones** infantum, an vera insecta? [693](#)
- LI** [5](#) **Con-**

INDEX I.

Convulsio, eius definitio 37.
causae ib. in febre distingu-
ui debent tempora 38.
pessima in acutis, quae ori-
tur a lentore inflammato-
rio 39. a repressione exan-
thematum 40. critica in a-
cutis ib. a nimis tenuata
febre 93. ab opiatas in
quartana adhibitis 114. in
variolarum eruptione 164.
in phrenitide, si inflamma-
tio ad cerebri medullam
penetrat 194. in nephritide
234. ante variolarum eru-
ptionem non adeo timenda
167. praecipue in infanti-
bus ib. post variolarum e-
ruptionem plerumque le-
thalis est 167. pessimum
signum in febre petechiali
144. malum signum in in-
flammatione ventriculi 229.
in ileo morbo 244. 245.
critica in ardentibus et
phrenitide non turbanda
90. eius therapia in febre
ibid.

Coryza differt a grauedine et
phlegmorrhagia narium.
347. soluit quandoque Ce-
phalalgiam 333.

Crampus 644.

Exuditates 445. vel ab ile, vel
a pituita, vel ab acido ori-
untur ib.

D.

Debilitas oritur a denegato
influxu sanguinis et fluidi
nervei in musculos s. pe-
riculosa in malignis 31. au-
getur sanguinis missione

ib. a spirituosiss et narco-
ticis 30.

Diectioes nigrae in inflam-
matoriis sub finem 49. in
febris. Earum causae

45

Delirium, si materia peccans
ad cerebrum fertur 30. a
podagra repressa 33. a re-
tenta vrina ib. febrile tem-
peratur excretionibus iu-
uandis 88. symptoma
quartanae 111. in inflam-
matione ventriculi 228. in
syncho simplici 183. in
febre petechizante 131.
malum signum in inflam-
matione ventriculi 229. in
variolis 167. non raro in-
dicat variolas ad caput con-
uersas esse 171. in phreni-
tide sine intermissione est
193. in ileo morbo. pess-
imum signum 244. malum
signum in dysenteria 510.
in phrenitide melius est
cum risu, quam cum anxi-
etate 197.

Dentitio, difficilis 696. varia
mala habet symptomata 696

Diabetes, definitio morbi 539.
quomodo differat a nimio
profluuii vrinæ? 540. va-
riae morbi causae 542

Diaphoretica in exanthemati-
bus repressis proficiunt 81.
quando in purpura dati
possint? 159

Diarrhoea, eius definitio 495.
morbi causae ib. critica
saepe expellit coagulum in-
flammatorium ib. differt a
dysenteria 496. et cholera
ib. a passione coeliaca ib. a
liente.

INDEX I.

Nenteria ib. toleranda in
 catarrhalibus malignis 92.
 quomodo moderanda, si
 febribus exanthematicis su-
 peruenit? ib. ex quibus si-
 gnis cognoscatur? 498.
 venereis in pyralismi cura-
 tione superuenit 618. in
 dentitione bonum signum
 696. puerperarum 679. in-
 terdum est symptoma in-
 flammationis uteri ib. sol-
 uit interdum febrem pete-
 chialem 142. raro in feбри-
 bus ardentibus critica 189.
 quatenam eius futurae in
 hoc morbo signa? ibid.
 quandoque soluit Anginam
204. Cephalalgiam 333. O-
 talgiam 350. Apoplexiam
 rarius 376. causa abortus
293. in febre biliosa orta
 quomodo moderanda? 190.
 in quotidiana febrem bre-
 uem futuram esse significat
109. in variolis mala ab
 initio et sub eruptione 167.
 in confluentibus bona ib.
 post eruptionem toleranda
 ib. pessimum signum in
 morbillis malignis 180. in
 hydrope saepius letifera
 quam critica est 566. criti-
 ca in pleuritide et peri-
 pneumonia 216. *colliquati-*
ur 497

Dulcia nocent in Dysenteria
512

Δυσεντερία

27

Dysenteria, eius definitio 807.
 eius futurae signa ib. mor-
 bus contagiosus est ib. eius
 historia ib. deiectiones mu-
 cosae periculosissimae ib.

benigna est, quae febrem
 non habet ib. maligna cum
 febre ib. critica in sanos lie-
 nososque causas dicitur
 ab Hippocrate ib. quae
 discrimen positum sit in
 affectis intestinis? 508.
 quomodo differat a fluxu
 hepatico? 486. est caus-
 sa abortus 193. secta
 cadauera demortuorum
 quid ostenderint? 509 et
511

Dyspepsia, morbi definitio et
 causae 444

Dysuria, definitio 531. an eius
 causa quaerenda sit in ca-
 runculis ib. oritur inter-
 dum ex abscessu ib.

E.

Elephantiasis 592. quomodo
 differat a lepra ib. morbi
 historia ibid. morbi sedes.

593

Emmenagoga quando imperan-
 da? 285

Epilepsia, morbi descriptio 644.
 quomodo differat ab aliis
 similibus morbis? 644 et
 645. variae morbi causae
 647 et 648. morbi imminen-
 tis signa 646. quomodo di-
 gnosci possint, qui hunc
 morbum simulant? 645.
 metuenda a Cephalaea 340.
 a malo hypochondriaco re-
 licta 465. a materia rheu-
 matismi in cerebrum re-
 pressa 631. si pueris in ca-
 tarrho suffocatio accedit,
 malum signum 412

Ery-

Erysipilas post febres 20. non fert venaesectionem 71
Exanthemata unde nascantur? § 2. febris moderamen postulant 93. earum eruptio interdum iuuatur venaesectione 69. repressa iuuantur fricatione 81. repressa ventriculi inflammationem faciunt 227. repressa, causa asthmatis sicci 400. pariunt catarrhum suffocatiuum 432. palpitationem cordis inducunt 427. leuant nonnunquam rheumatismum 633

F.

Fames canina 450. quomodo differat a bulimo ib.
Febris, est morbus vniuersalis, idiopathica et symptomaticea, 1. causa proxima non satis nota 21. symptomata fiunt a turbatis actionibus vitalibus 23. eiusdem essentialia et accidentalibus ib. soluitur vel crisi, vel excretionem 18. mutatur in alium morbum, si materia peccans nec immutatur, nec expellitur 20. nonnumquam magis accendenda est § 5. praesertim intermittens ib. varia methodus eas curandi § 3. salubres nonnumquam effectus 16. si scabiei accedit, negligenda sunt specifica § 89. cur oritur in Hydrope? § 64. perniciofa in variolis confluentibus 164. assidua in phthisi malum signum 424.

ictero superueniens quomodo moderanda? 483.
 dysenteriae superueniens quomodo moderanda? § 14.
 podagrae superueniens quomodo moderanda? 642.
 quartana saepe Epilepsiam tollit ib. quae vomicae pulmonum accedit, malum signum 420. quae Apoplexiae accedit, bonum signum, praecipue in serosa 380. quae paralyfi accedit, salutaris interdum 390. raro soluit apoplexiam 376. acuta pertinacior redditur purgantibus 63. non admittit curationem per specifica 72. Intermittens, eius definitio 94. diuisio 95. duplicata ib. non confundenda cum quotidiana 95. tertiana frequentissima ib. eius historia 96 sqq. reuertitur intempestiuo purgantium usu 63. mutata in continuam, periculum facit 71. raro venaesectionem postulat ib. causa eius probabilis in nervis 98. aliae causae ib. primis diebus continuae saepe similis est 97. aliquando epidemica 99. benigna simplex tollitur abstinencia 100. signa, quae hanc futuram esse indicant ib. salutaris non raro ib. si diuturnior fuerit, non salubris est ib. mutata in acutam ib. vernalis et autumnalis magnum discrimen ib. emeticis quandoque curatur 101. reliqua curatio ib. sqq. quotidiana 108.

INDEX I.

708. differt a tertiana duplici et catarrhali ib. facile mutatur in continuam vel lentam ib. eius causae [109.](#) eius curatio talis fere, qualis in tertiana [110.](#) accommodanda paroxysmo ib. *quartana*, eius historia [111.](#) frequentior autumnio ib. eius curatio [115](#) sqq. interdum epidemica [112.](#) eius sedes in visceribus abdominis chylicationi inferuentibus [113.](#) mutatur in tertianam ib. quibus potissimum frequens esse soleat ib. plerumque sine periculo [144.](#) hyeme raro veram medicationem admittit ib. interdum soluitur haemorrh. fluxu et purpura scorbutica ib. pertinacior, expugnatur interdum usu thermarum [118.](#) quandoque soluit scirrhum hepatis [476.](#) male curata relinquit scorbutum [624.](#) malum signum superueniens icterus [481.](#) epidemica vaga [120.](#) raro fert euacuantia ib. *semitertiana* eius historia [120.](#) non est contagiosa ib. apud nos non ita frequens [122.](#) finitur saepe inflammatione interna ib. soluitur nonnumquam diarrhoea ib. *catarrhalis benigna* [124.](#) eius causae [125.](#) *maligna* s. *petechialis*, plerumque est contagiosa [131.](#) morbi historia [132.](#) *Petechialis*, eius historia [142.](#) differt a petechizante ib. *Ephemera* [187.](#) si

sine excretionē se remittit, mutatur in hecticam ibid. *Lenta*, morbi historia [249.](#) a venae sectione in catarrhali benigna praeter necessitatem instituta oriri potest [126.](#) differt ab hectica [249.](#) saepe mutatur in hecticam [250.](#) *exanthematica* certa ratione semper inflammatoria est [52.](#) *hectica* differt a lenta [249.](#) plerumque lethifera est ib. si rachitidi superuenit, mortis indicium est [705.](#) *lactea* [681.](#) non semper postulat medicamenta ib. *urticata* [260.](#) *scarlatina* [260.](#) sqq. *Fluor* albus benignus, morbi definitio [545.](#) morbi sedes [546.](#) quomodo differat a maligno? [547.](#) est morbus haereditarius [545.](#) causa sterilitatis [665.](#) *Fluxus hepaticus*, eius definitio [485.](#) est morbus rarior ib. morbi symptomata ib. quomodo distinguendus sit a dysenteria? [486.](#) *Foetus* imbecillis [669.](#) in utero mortui signa [296.](#) *Fomenta* pedibus admouenda in variolis, si in caput conuertuntur videntur [171.](#) *Fonticuli* in catarrhis diuturnis [347.](#) in vertigine idiopathica senum [365.](#) in grauitate auditus [354.](#) *Frictiones* in exanthematibus repressis [93.](#) in Cephalalgia [331.](#) in vitiiis mensium [285.](#) in Chlorosi [553.](#) in odontalgia [358.](#) in paralyti [393.](#) in asthmate spastico [404.](#)

Frigida

INDEX I.

Frigus in febre oritur, quia sanguis spasmo magis versus cor exprimitur **4**

G.

Gangraena a lentore febrili **19**. in phrenitide indicatur sudore frigido **194**. in angina eius futurae signa **204**. in pleuritide **216**

Gonagra **637**

Gonorrhoea benigna, eius differentiae **605**. interdum reuocanda est, si stranguriam pertinaciorem reliquit. **523**. *maligna*, morbi causae **596**. eius diagnosi ib. variae eius species **597**. facilius interdum curatur, quam benigna **599**. raro tollitur ptyalismo **601**

Grauedo unde oriatur? **334**

347

Gruidae syncope corripuntur ex motu infantis in utero **655**

H.

Haemoptysis, definitio **273**. quomodo differat a spuito cruento ib.

Haemorrhagia metuenda in scorbuto, si magnae maculae rubicundae adsunt **625**. soluit quandoque phrenitidem. **197**. raro hepatitidem **223**. et apoplexiam **376**. critica in pleuritide et peripneumonia magna esse debet **276**. parca pessima ib. narium critica et symptomatice **269**. in seni-

bus apoplexiae metum facit ib. critica in convulsionibus **40**. in Cephalalgia **330**. in Otalgia **350**. mortis indicium est in hydropse **566**. lethifera quandoque in hecticis **269**

Haemorrhoides, variae huius morbi causae **305**. diuersae species **306**. quo aetatis anno salutes? **507**. qui homines iis praecipue obnoxii sint ib. non omnes sunt salutes **305**. difficile restituntur **311**. Iq. *coecae* **314**. quomodo moderandae ib. eorum profluvium saepe est criticum **305**. in Cephalaea **339**. in vertigine symptomatice **363**. in angina **284**. in phrenitide **197**. in nephritide **236**. in scirrho hepatis **476**. in Colica sanguinea **519**. in mania **661**. in scorbuto **625**. *suppressae* varios morbos gignunt **507**. phrenitidem **106**. anginam **203**. haemoptysin **274**. vomitum cruentum **279**. *varices* **326**. cephalalgiam **329**. odontalgiam **357**. vertiginem **361**. stranguriam **331**. scabiem **585**. cachexiam **558**. scorbutum **624**. rheumatismum **632**. podagram **639**. epilepsiam **648**. podagram leuant non tollunt **639**. funestae sunt cachecticis **309**

Hectica **249**. in ea pessifera est sanguinis missio **71**. a nimio profluvio menstruo **290**. a Cholera male curata

91

Hemi-

INDEX I.

Hemicrania 328

Hemiplegia 326

Hepatitis, eius diuersa genera 223

Hepatis tumor et scirrhus, variae eius causae 474

Horror, signum pathognomonicum febris 2. vnde oritur 3

Hydatides 562

Hydrocele 562

Hydrops, variae eius causae 565. 576. diuersae species 563. oriri potest a tertiana nimis diuturna 100. a quartana 113. a nimio profluvio menstruo 290. a fluxu hepatico 487. a diarrhoea diuturna 498. in ictero quando metuendus 481. *pectoris*, morbi signa 574. differt ab asthma humido. ib. *uteri* quomodo a gravitate differat 563

Hypochondriacum malum, definitio morbi 462. differt a malo hysterico 462. causa eius proxima 463. oriri potest a cortice peruiano in febre quartana intempestiue adhibito 114. causa saepe est apoplexiae sanguineae 379. morbo venereo superuenit. 611

Hystericum malum, eius futuri signa 456. morbi sedes 455. quid statuendum de causa eius proxima? 459. quomodo differat a variis morbis 457. ante pubertatem vix eo afficiuntur puellae 458

I.

Iterus, morbi definitio 479. variae eius causae 480. *criticus* 479. *flauus* et *niger* ib. a quartana relictus 113. ab intempestiuo usu corticis peruui. in quartana 114. pessimus, qui cum hepatitide est 480. *lethiferus*, qui quartanae accedit 481. et in hydrope ib. pessimus est in febre sine signis coctionis ib. salutaris quandoque in febribus acutis ib. oritur interdum a calculis 480

Ileus morbus, definitio 243. origo nominis ib. indicia morbi 244

Incontinentia urinae 544

Incubus 644

Infans recens natus, quomodo tractandus? 681 sqq. *infantum* morbi 684

Infarctus viscerum ab intempestiue datis purgantibus in febre 63

Inflammatio semper est cum febre L. a lentore febrili 19. metuenda est in febre, si pars prae altera calet 10. in variolis 164

Intertrigo infantum, morbi definitio 695

Ischuria, eius definitio 536. esse solet quandoque cum ileo morbo 244. huius rei causa ib.

L.

Lac, quando irruat in mammas? 681. bonitatis notae 682. eius defectus ib. vitium

INDEX I.

atum in infantibus causa
morborum 684

Lepra 594

Leibargus, morbi historia 370.

eius causae 372. distin-

guendus est a critico som-

no 371. raro soluitur sup-

uratione 370

Leucophlegmatia quomodo dif-

ferat ab aliis hydropis spe-

ciebus 562. relinquitur in-

terdum a diarrhoea diutur-

na 498

Lien in scabiosis post mortem

tumidum et scirrhusum re-

pertum 585

Lienis tumor et scirrhus 469.

morbi instantis notae 470.

quomodo dolor differat a

colico et nephritico ib. ra-

ro soluitur suppuratione

472

Lienteria, morbi definitio et

sedes 502. variae eius caus-

ae ib. quomodo differat

a passione coeliaca ibid. si

orta fuit a potu glaciali,

corrigitur carminatiuis 586

Liporhymia, morbi descriptio

654. quomodo differat a

syncope ib.

Lochia, eorum descriptio 298.

quibus maiori in copia flu-

ant ib. quibusdam foemi-

nis nulla fluunt 302. *pro-*

fluuium nimium 298. eorum

defectus unde oriatur?

300. *obstructa* post partum,

causa sunt sterilitatis 364

Lues venerea 607. dolores in

hoc morbo quomodo ab

aliis dignoscendi 608. quo-

modo differat a scorbuto

610. facilius tollitur in

foeminis 611. si scorbuto

superuenit, quomodo su-

peranda? 629

Lumbrii lati 529. *teretes* 528

M.

Malacia 457

Mania 657. raro tollitur 661

Marcor senum 708 sq.

Materia peccans in febribus

quomodo expellatur 59

Melancholia, morbi definitio

657. quomodo differat a

delirio et mania ib.

Menstrua, quo tempore proue-

nire soleant? 283. quibus

naturaliter non proueni-

ant? 287. eorum defectus

non semper est cum mulie-

ris aegritudine. ib. pendet

interdum a mala vteri con-

formatione 286. non defi-

ciunt semper in lactantibus

682. proueniunt interdum

in grauidis 292. quomodo

distinguantur a sanguine,

qui in abortu fluit? ib. ni-

mium profuuium 290. quib-

us causis turbentur?

284. nimis interdum flu-

unt a retenta parte placen-

tae 291. si venereis sub

ptyalismis curatione veni-

unt, omittendus est Mer-

curius 618. sub eruptione

variolarum periculum faci-

unt 174. suppressa omnis

generis morbos pariunt,

phrenitidem 196. anginam

203. odontalgiam 357. vo-

mitum cruentum 279. ver-

iginem 361. malum hy-

stERICUM 458. scabiem 555.

cach-

INDEX I.

cachexiam 558. rheumatismum 632. scorbutum 624. epilepsiam 648. haemoptysin 274. sunt interdum causa sterilitatis 664. saepe sunt critica: in phrenitide 197. in angina 204. nephritide 236. mania, 625. colica 579. solvunt quandoque epilepsiam, quae cum pubertate veniunt 650. *Mictus* cruentus, definitio 317. variae causae 318. raro criticus 321. *Morbilli* 179 sqq. quandoque relinquunt phthisin 423.

N.

Nausea vid. Vomitus. *Nephritis*, variae species 233. historia morbi 234. quomodo differat a dolore Ischiadico 235. est morbus haereditarius 237. inflammatoria 237. calculosa, quando periculum afferat 241. ex inflammatoria interdum relinquitur 238.

O.

Obstructio alui, cur Cephalalgiam inducat? 330. in gravidis metum facit abortus 667. *narium* in infantibus 694.

Oculi signum in cephalalgia 328. in apoplexia sanguinea 378. in phrenitide 194. *torui* in pleuritide indicant futuram phrenitidem 216. *oculorum vitia* a variolis relicta 167. quomodo auerenda 175.

Odontalgia, eius divisio 358. lenatur interdum sanguinis missione ib. *Oedema* quomodo differat a Leucophlegmatia? 563. *Opisthorchus* 644. *Otalgia*, morbi sedes 348. differentiae quaedam ib. oritur interdum ex dentitione ib. in febribus ardentibus cum coctionis signis bonum est 351. cum cruditate mortem denuntiat ibid.

P.

Pallor in febre. *Palpitatio* cordis, definitio 427. eius causae ib. in malo hysterico 456. in chlorosi 550. in malo hypochondriaco 462. in scorbuto 623. *Paracentesis* 575. in ascite ib. *Paralysis*, definitio et causae morbi 387 seq. pendet saepe a laxa cohaesione elementorum 388. eius futurae indicia 390. ex Anatomiae illustratio 389. frequentior est in apoplexia sanguinea, quam in serosa 385. sublata interdum fuit repentinis animi commotionibus 390. *Paraphrenitis*, definitio 193. symptomata 195. quomodo differat a phrenitide ib. *Paraplegia* 376. *Paresis* 376. *Partus* 673. difficilis 669. dolores veri et spurii 671. *Pestis*

Pestis eius origo [146.](#) morbi historia et symptomata [148](#) sq. quid in demortuorum cadaueribus repertum fuerit? [147](#)

Petechiae optimae sunt rubellae, pessimae obscurae et liuidae [133.](#) si cum purpura erumpunt, malum signum [158](#)

Phlegmatorrhagia [347](#)

Phrenitis, definitio et diuisio [193.](#) quomodo differat a delirio? [197](#)

Phthisis, morbi definitio [422.](#) quomodo distinguatur a morbis similibus ib. est interdum cum contagio ib. quando praesertim periculosa sit? [424](#)

Pica frequens symptoma grauidarum [451](#)

Plethora, eius definitio et diuisio [261.](#) mali eius effectus [264.](#) mutatur in cacochymiam ib. qua ratione auerti possit? [265.](#) causa est plurimum morborum: vertiginis [361.](#) apoplexiae sanguineae [379.](#) chlorosis [357.](#) Cachexiae [558.](#) multum confert ad scorbutum [624](#)

Pleuritis, origo nominis [211.](#) diuersa genera ibid. spuria [426.](#) soluitur quandoque mictu cruento [321.](#) Symptomatica pessima est [215.](#) an solui possit sputo cruento? [214](#) [216](#)

Podagra, morbi signa [637.](#) eius causae [638](#) sq. natura materiae morboiae [638.](#) oritur quandoque post metastasim ex malo hypochondriaco ad articulos factam

[463.](#) male curata varios inducit morbos: anginam, [203.](#) pleuritidem [215.](#) phrenitidem [196.](#) vertiginem [362.](#)

paralysin [393.](#) asthma [400.](#) palpitationem cordis [427](#)

Polypus cordis, eius definitio [438.](#) nominis origo ib. causa est apoplexiae sanguineae [379.](#) in sinibus durae matris haerens causa apoplexiae serosae, [384.](#) in vasis inguiaribus syncopen inducit [655](#)

Priapismus quomodo differat a satyriasi? [555](#)

Ptyalismus criticus in variolis confluentibus [167.](#) [173](#)

Pulsus velox semper in febre [6.](#) [6.](#) velox est, quia sanguis maiori copia versus ventriculum dextrum et in arterias coronarias congeritur

ib. sub horrore febrili velox est, sed debilis [12.](#) in paroxysmo febris durus est [15.](#) mollior fit per aestum

ib. eius phaenomena in febre tertiana [96.](#) in quartana [111.](#) in febre petechizante [131.](#) in peste [149.](#)

in purpura [154.](#) in peripneumonia [213.](#) in febre ephamera [177.](#) in pleuritide [213.](#) in hepatitide [223.](#)

in ventriculi inflammatione [228.](#) in nephritide [235.](#) in apoplexia [377.](#) in catarrho suffocatio [394.](#) in asthma [394.](#) in syncope [377.](#) in

ileo morbo [244.](#) in phrenitide [194.](#) in febre lenta [249.](#) in hectica ib. in malo

hypo-

INDEX I.

hypochondriaco [462.](#) in cachexia [557.](#) in hydropse [584.](#) in tympanitide [577.](#) in scorbuto [623.](#) in epilepsia [645.](#) in lipothymia [645.](#) in syncope vel nullus vel debilis et *intermittens* ib. in chlorosi [550.](#) *celer* atque *fortis*, in inflammatione ventriculi, venae sectionem indicat [230.](#) fallacia eius signa in pleuritide et peripneumonia [216.](#) paulo *celerior* bonum signum in apoplexia exquisita [380.](#) *magnus* et *tardus* bonum signum in hydropse [566.](#) *fortis* et *velox* periculum indicat in apoplexia sanguinea [378.](#) ex duro in mollem mutatus malum signum in febre biliosa [189.](#) *debilis* et *inaequalis* malum signum in dysenteria [510.](#) *debilis* et *inaequalis* malum signum in febre petechiali [144.](#) *celerior* et debilis mortis quandoque indicium in febre lenta [250](#)
Purgantia in febre petechiali [145.](#) in febre tertiana, quomodo exhibeantur? [105.](#) in lethargo [373.](#) in apoplexia sanguinea [382.](#) in asthma humido [396.](#) in Cephalalgia serosa quando adhibenda? [336.](#) [337.](#) in asthma sicco [401.](#) in dysenteria [511.](#) in scabie. [587.](#) in rheumatismo [635.](#) in scorbuto ab initio bona sunt, pestifera, ubi morbus adoleuit [626.](#) aliena sunt in febribus tempore cruditatis

[63.](#) in semitertiana plerumque sunt fugienda [123.](#) validiora nocent in Cephalalgia [331.](#) in hydropicis, ubi febris vrget [569.](#) *nocent* in peste [57.](#) in cachexia, quae a magna euacuatione relicta est [561.](#) in mania [663.](#) *eorum abusus* in febre quartana continuam et hecticam relinquit [114.](#) *nocet* in malo hypochondriaco [467.](#) inflammationem ventriculi parit [227.](#) *non temere adhibenda sunt* ad euitandum variolarum contagium [177.](#) in febribus acutis turbant materiae coctionem [63.](#) possunt interdum febrem reuocare [106](#)
Purpura, eius historia [153.](#) diuifio ib. morbi sedes [155.](#) bonitatis et malignitatis signa [153.](#) cur frequentior sit puerperis? [156.](#) in his saepe oritur ab obstructione lochiorum ib. metueda est in petechiis, si aeger his praesentibus de magna anxietate conqueritur [133.](#) raro soluitur ptyalismo critico [154.](#) quandoque soluit vteri inflammationem [676.](#) *repressa* reuocanda est vesicatoriis [81.](#) [93.](#) *scorbutica*, morbi historia [161.](#) soluit quandoque rheumatismum [633](#)
Pus in inflammatoriis raro cum aegri leuamine excernitur [47.](#) *foetidum*, malum signum in phthisi [427](#)

INDEX I.

R.

Raucitas, morbi sedes [415](#).
acuta et chronica ib. eius
caussa ib. in morbillis infi-
gnem malae materiae acrimo-
niam significat ib.

Rhachitis, morbi causae [703](#).
est morbus, quem a paren-
tibus accipiunt infantes ib.
nominis origo [702](#). morbi
symptomata ib. quid in de-
mortuorum cadaveribus
reperiatur? ib. morbo ve-
nereo superueniens [611](#).
est causa lienteriae coelia-
cae [502](#)

Rhachiticus puer vsu ext.
Therm. Aquisgr. conua-
luit [707](#)

Rheumatismus, morbi descri-
ptio [631](#). gradu differt ab
arthritide vaga ib. repres-
sus, hepatitidem gignit [223](#)

Rigor Celsi [644](#)

Rifus Sardonius [644](#)

Rubefacientia in delirio fe-
brili [88](#)

S.

Sanguinis missio. vid. Venae
sectio.

Sanguis in aestu febrili coa-
ceruatus in pulmonibus
anxietatem facit [26](#)

Satyrasis quomodo differat a
Priapismo? [555](#). morbi
sedes ib.

Scabies, morbi definitio [583](#).
humida et sicca ib. morbi
sedes [584](#). variae eius causae
[585](#). quomodo interdum
renocanda sit? [591](#).

critica varios soluit mor-
bos [586](#). male curata mul-
tos adfert ib. male curata
caussa lethargi [372](#). repres-
sa Paralyfin inducit [393](#).
asthma siccum relinquit
[482](#). palpitationem cordis
inducit [427](#). soluit quan-
doque rheumatismum [633](#).
interdum epilepsiam [650](#)

Scurbi viscerum a corticis
peruiani intempestiuo vsu
in quartana [114](#)

Scorbutus, morbi definitio [621](#).
quomodo differat a morbo
venerco? [610](#). materiae
morbosae descriptio [623](#).
differentia inter calidum et
frigidum [626](#). variae eius
causae [624](#). a nralo hypo-
chondriaco relictus [465](#).
causae cephalaeae [339](#)

Singultus [644](#)

Sitis in febre oritur ab anhe-
losa respiratione, quae flui-
da in faucibus abstergit [28](#)

Soda, vid. Cardialgia.

Somnus criticus est in febre
post euacuationem criticam
[36](#). et si aegri post profun-
dum et longiorem somnum
conualeseunt ib. frequens
infantibus ib. huius causa
ib. *criticus* [371](#)

Sopientia quando ferri possint
in diarrhoea? [501](#). quando
adhibenda in cholera? [493](#).
pestifera post partum [162](#)

Sopor post graue delirium in
febre plerumque funestus
[89](#)

Soporosi morbi. Causae [369](#).
varia nomina ib.

Spat-

INDEX I.

- Spasmus* cynicus 644. quomodo differat a convulsione ib.
- Spastica* contractio in febre ab internis causis 2
- Specifica* nunquam in acutis, sed solis interinittentibus, locum habent 72
- Sphacelus* in febribus exanthematicis adesse creditur, si pustulae ex purpureo colore in atrum mutantur 52. in phrenitide futurus indicatur sudore frigido 194
- Sterilitas* 664. relativa ib.
- Stomacace* 630
- Stranguria* 531. quomodo differat a dysuria et Ischuria ib. variae eius causae ib.
- Sudor frigidus* in Ileo morbo 244. foetidus in purpura 154. pinguis in febre lenta 249. *colliquatius* in magnis suppurationibus 44. in febribus 41. *criticus* soluit interdum anginam 204. hepatitidem 223. cephalalgiam 330. inflammationem uteri 676. rarius malum hystericum 456. salutaris est in rheumatismo 631. *criticus* raro occurrit in cholera 489. in apoplexia 376. leniter iuvandus in febre petechizante 136. in quartana non facile mouendus 115. in febribus ab initio raro bonus est 42. in inflammatoriis augeat lentorem ib. in quotidiana, febrem breuem futuram esse indicat 109. bonum signum est nonnumquam in peste 150. *foetidus* cum coctionis signis bonum signum in purpura 158. *calidus* in phrenitide 197. *copiosus* malum quandoque signum in purpura 158. *frigidus* malum signum in inflammatione ventriculi 229. in phrenitide 194. in dysenteria 510. *cohibitus* causa asthmatis spastici 403. dysenteriae 509. rheumatismi 630
- Sudorifera* aliena sunt tempore cruditis 65
- Suppuratio* variolarum 164. in pleuritide eius futurae signa 216. in nephritide 236. arte producenda est in lethargo 373
- Surditas* oritur quandoque a redundantia bilis 254. relinquitur a phrenitide 197. huius rei causa ib. est in angina 203. bonum quandoque signum est in febre petechizante 130. in phrenitide 197
- Syncope*, morbi descriptio 654. quomodo differat a lipothymia et apoplexia ibid. morbi sedes 655. in gravidis metum facit abortus ib. hoc morbo correpti quomodo a mortuis dignoscantur 654
- Synochus* putrida, morbi historia 184

T.

- Tenesmus*, morbi definitio 525. variae eius causae ib. in gravidis unde oriatur? ib.
- M m 3 signum

INDEX L

signum quandoque est futuri abortus ib.

Tetanus 644

Tinea repressa causa vertiginis. 362

Tumores a febris relicti 20
genitalium post partum 678.
abdominis post partum 680

Tussis definitio 406. variae eius causae ib. diuersae species ib. interdum epidemica est ib. frequens est in morbis exanthematicis ib. raro oritur a vermibus ib. quomodo dignoscatur vtrum sit ex ventriculo, an ex pulmonibus 408. causa potest esse abortus ib. sub dentitione plerumque est consultiua 696

Tympanitis, morbi definitio 577. quomodo differat ab Ascite ib. ab Emphysemate ib. et Cholera sicca ib. magna eius causa posita est in bile 578. ei magis obnoxiae sunt foeminae 579

V.

Varices, origo nominis 324. definitio ib. variae causae 325. in gravidis edito partu evanescent 327. quandoque solvunt malum hypochondriacum 465

Variolae, nomen 163. earum divisio ib. morbi futuri indicia 164. historia morbi

ib. diuersa stadia ib. quandoque inhaerent visceribus 165. interdum sine febre sunt ibid. *confluentes* 164. earum indicia 166. signa bonitatis et malignitatis. 166. *spuriae* 178. earum genera ib. si ad caput nimium conuerti videntur, quid faciendum? 171. malum signum, si eo tempore, quo pus alunt, noua febris accenditur 173. magnum periculum, si variolis erumpentibus catamenia fluunt. 174. *cicatrices* unde oriantur 176. quomodo auertendae? ib. *Inoculatio* 177. malignae asthina quandoque relinquunt 400. quandoque relinquunt phthisim 423

Venae sectio, ei non temere adfue fieri debet aetas iuuenilis 265. saepius instituta obesos reddit homines ib. et cachexiam relinquere potest 558. non negligenda est in senibus 709. in pueris ante partum neglecta, purpura effecere potest 156. imperanda est in febribus acutis et inflammatoriis 66. in febribus optima est ab initio 67. in acutis non facile post tertium diem 68. auertere potest inflammationem 66. medetur aliquando debilitati febrili 86. mitigat febrem iusto vehementiorem 54. proficit ad auertendum a gravidis variolarum contagium

gium [174.](#) et ad auertendam purpuram [162.](#) necessaria est in phrenitide [198.](#) in angina [205.](#) in pleuritide [217.](#) in hepatitide [225.](#) in nephritide calculosa plethoricis [241.](#) in Ileo morbo [246.](#) in haemorrhagiis variis [268.](#) in nimio profluio menstruo [291.](#) in repente suppressis menstruis [288.](#) in haemoptysi [276.](#) ubi abortus imminet [294.](#) in varicibus [326.](#) in otalgia [351.](#) in odontalgia [358.](#) in apoplexia sanguinea [381.](#) in Ischuria, quae a vitio renum pendet [338.](#) in colica convulsiva [322.](#) in fluore albo benigno [349.](#) in Satyriasi [556.](#) in venereis ante curationem per pytalismum [615.](#) in variis symptomatibus, quae pytalismum superueniunt [618.](#) in podagra [641.](#) in gonorrhoea maligna [600.](#) in vteri inflammatione [677.](#) in epilepsia plethoricis salutaris est [652.](#) in paralyfi ab initio instituenda [391.](#) quibus conditionibus institui debeat in febribus exanthematicis? [69.](#) quando necessaria sit in febre biliosa [190.](#) quo pacto in purpura concedi possit [159.](#) quibus conditionibus in nephritide, inflammatoria instituenda sit? [239.](#) in vomitu eruento [287.](#) in haemorrhoidibus [313.](#) in mictu cruento [320.](#) in pleuritide [218.](#) in

peripneumonia ib. in vertigine [364.](#) in lethargo [374.](#) in vomica pulmonum [421.](#) in catarrho suffocatio [433.](#) in tussi [414.](#) quid de ea statuendum in malo hypochondriaco [467.](#) in lochiorum obstructione [302.](#) [304.](#) non statim imperanda est in vitiis mensium [285.](#) et in phthisi [425.](#) raro necessaria est in febribus intermittentibus [70.](#) in febre petechizante [135.](#) in dysenteria [514.](#) in scabie [587.](#) rarissime in febre quartana [70.](#) dubia in variolis [169.](#) in melancholia et mania non semper salutaris [663.](#) aliena est in febribus acutis et continuis durante exacerbatione [67.](#) in febribus exanthematicis inflammationem saepe affert lethalem [69.](#) nocet plerumque in erysipellate [71.](#) in gravidis, ubi febricula accessit [174.](#) in febre quotidiana [110.](#) in catarrhali benigna [126.](#) in chlorosi, nisi plethora hoc iubeat [552.](#) in Cephalaea [340.](#) in scorbuto [629.](#) in scirrho lienis [472.](#) in hydrope [570.](#) durante delirio [88.](#) pestifera est in febribus malignis [71.](#) in hectica [249.](#) in vertigine corporibus infirmis [368.](#) in paralyfi confirmata [391.](#) in obstructione lochiorum, si febris iam accessit [304.](#) in podagra durante paroxysmo [641.](#)

INDEX I

Veneriei morbi 595. an materies morbosae acidae indolis sit? ib.

Ventriculi atonia; quibus ex causis cognoscatur 441. quomodo differat a dyspepsia et cruditatibus. 440

Ventriculi inflammatio, variae eius species 227. eius signa 228. quomodo differat ab erosione ib. peior est symptomatice ib. quanam pessima sit? 232

Vermes tria horum genera 526. quibus signis adesse cognoscantur? 527. frequentiores sunt infantibus ib. quomodo icterum parere possunt? 480. causa sunt interdum inflammationis intestinorum 244. vertiginis 362. raucitatis 415. diarrhoeae diuturnae 497. passionis coeliacae 502. dysenteriae 509. colicae 516. in infantibus praecipue inducunt epilepsiam 648. et rhachitidem 703. in calvaria reperti cephalaeam concitant 339. in morbis acutis, si sponte vel per os vel per alium efferuntur, mortem instigare significant 527

Vertigo, definitio morbi 360. magnum discrimen inter idiopathicam et symptomatice 361. idiopathica pessima est. 363 *symptomatice*

crisis interdum antecedit 361. ex ventriculo orta eius indicia et curatio 366. malum symptoma est in malo hypochondriaco 465. signum est instantis apoplexiae 330. et paralyfis 390

Vesicatoria in purpura reprefa 93. 159. in febre petechizante 140

Volvulus intestinorum 243

Vomica pulmonum, definitio 417. quomodo differat a phthisi et empyemate ibid. quomodo ab initio dignosci debeat? ib. variae eius causae 418. ex peripneumonia relicta 216

Vomitoria, quibus conditionibus indicentur 61. eorum utilitas in febribus 60. in intermittentibus dari debent tempore *anapexis* 61. in malignis ab initio ib. quando dari possint in tertiana? 101. et 105. medentur aliquando anxietati 84. quae ratione *adhibenda* in febre biliosa? 190. in vertigine 366. in Cholera 492. in Dysenteria 511. in Diarrhoea 501. in Lienteria 505. in Scorbutico 626. *non semper tuta* sunt in malignis, ubi morbus iam adolevit 61. in epidemicis intermittentibus 101. in asthmate stomachali 405. in febre lenta, nisi robustioribus 454.

INDEX I.

454. in Ictero 482. *aliena* sunt in inflammationibus, praesertim ventriculi 62. quando tamen possint adhiberi 231 sq. in peste 157. in vertigine idiopathica 367. senibus in catarrho suffocatiuo 435

Vomitus a variis causis oritur:

a laesa aponeurosi muscutorum abdominalium 29. a deprauatis humoribus in ventriculo ib. a spasmis ib. a male affecto cerebro ib. *in febribus*, quia sanguis difficilius per neruosum ventriculum mouetur ib. in acutis a putrescente in ventriculo humore 83. *fre- quens* est in acutis ibid. in tertiana 96. in quotidiana 109. in quartana ab initio 164. in nephritide 234. in Ileo morbo 244. in obstructione lochiorum 301. in asthma humido 395. in fluxu hepatico 485. in Cholera 489. in colica 516. *solvit* interdum febrem biliosam 189. eius futuri in hoc morbo signa ib. Cephalalgiam ferosam 337. vertiginem 362. apoplexiam 376. leuamen affert in nephritide calculosa 235. *ra- ro criticus* est in Cholera 489. non semper criticus in vertigine, sed saepius symptomaticus est 362. in quotidiana breuem febrem futuram esse indicat 109. *Spontaneus*, in dysenteria ab

initio aliquando salutaris 510. *malum signum est* in febre petechizante 133. in variolis post eruptionem 167. in apoplexia sanguinea 379. et plerumque in dysenteria 510. *in gravidis* abortus metum facit 666. *cruentus* raro sanatur 278. variae eius causae 279. quomodo dignoscatur a haemoptysi 278. *non ita malus* est, qui a suppressis menstruis oritur 280. *lethiferus* in morbis acutis 280. in hominibus lienosis 471

Urina rutilans 54. spumida ib. *eius vicissitudines* in tertiana 96. in purpura 154. in phrenitide 194. in hepaticide 223. in nephritide calculosa 235. in febre lenta 249. in febre hectica ib. in vitiis mensium 283. in apoplexia 378. in phthisi 424. in malo hysterico 456. in malo hypochondriaco 462. in hominibus lienosis 469. in scirrhus hepatis 475. in fluxu hepatico 485. in colica 515. in Chlorosi 550. in Cachexia 557. in tympanitide 577. in Gonorrhoea maligna 599. in podagra 637. in scorbuto calido et frigido 623. *critica* in hepaticide 223 et 225. in Cephalalgia 330. in Ictero 487. in Rheumatismo 631. rarissime in vomica pulmonum 417. *Notae bonitatis* in nephri-

INDEX I.

phritide inflammatoria 236.
 in ictero 487. in hydropse
 566. in Cachexia 559. ma-
 la eius signa in purpura
 158. in variolis 167. in fe-
 bre biliosa 189. in phreni-
 tide 197. in angina 204.
 in hepatitide 224. in ne-
 phritide inflammatoria 239.
 in ictero 487. in hydropse
 566. in ascite 577. in tym-
 panitide 582. *crassa, areno-*
sa et aliquantulum sangui-
nea in nephritide calculosa,
 calculum in vesicam de-
 volutum esse, significat
235. *cruda, crassa et palli-*

da vermes indicat 527.
aquosa signum est mali hy-
 sterici 456. cruda et aquo-
 sa signum quandoque im-
 minentis epilepsiae 646.
 lixiuiosa et nigricans mor-
 tis indicium in febre lenta
 250. eius *suppressio* in ne-
 phritide calculosa 235. in
 Colica Pictonum 523. in
 gravidis 672. *Defectus* in
 infantibus a spasmis 698.
 ab imperforata vrethra ib.

Vteri inflammatio unde oria-
 tur? 675. eius differen-
 tiae ib.



INDEX



INDEX II.

MEDICAMENTORVM.

PASSIM LAUDATORVM.

A.

- A**cerum 192. 268. 373. 454. 494. *Squilliticum* 397. 568.
liliorum conuallium 651.
Acida valentia aliena sunt in purpura 160.
Aethiops mineralis 341. 412. 416. 510. 589.
Agaricus 392. 395. 396. 365. 560. 385. 613.
Alcibol 271.
Alexipharmaca 160.
Aloë 266. 529.
Amygdalae 128. 159. 200. 219. 232. 514. 529.
Alumen pro specifico habetur in febribus 72.
Anima rhabbari 700.
Antimonium crudum 594. 613. *diaphoreticum* 110. 137.
 159. 169. 174. 253. 341. 426. 433. 589. 594. 654.
 692. 695.
Antimonialia emetica nocent in cholera 492.
Aquae minerales 549. 553. in epilepsia, quando salutares sunt
 652. laudantur in melancholia 662.
Aqua Egrana 312. in melancholia 662.
 - Pyrmontana 118. 312. 416. 606. 641.
 - Schwalbacensis 312. 315. 627. 641. 662.
 - Sedlitzeris 582.
 - Selterana 82. 161. 182. 225. 239. 240. 253. 255.
310. 416. 467. 522. 533. 552. 606. 642.
 - Spadana 315. 627. 662.
 - *Thermarum Carolinarum* 636.
 - Calceis viuae 628. laudatur in scorbuto ib.
Ceraforum 673.
Cinnamomi 1210. 656. 669. 673.
Corticum aurantium 303. 533. 673. 686. 698.
Foeniculi 560.
Fragorum 538.

Aqua

INDEX II.

- Aqua* Melissae 139. 303. 499. 517. 522. 673. 677.
 - Phagedaenica 590.
 - Prophylactica Syluii 65.
 - Reginae Hungariae 669.
 - Salviae 630.
 - Sambuci 692.
 - Sclopetorum 695.
 - Fl. Tiliae 652.
Arcanum duplicatum. 84. 110. 364. 414. 445. 520. 690.
 700. 706.
Aromata nocent in nephritide 239.
Arsenicum pro specifico habetur in febribus intermittenti-
 bus 72.
Asa foetida 460. 461. 467. 529. 552.
Avena 230. 239.
Aurum fulminans 529.
Axungia fuilla. 615.

B.

- Baccae* Juniperi 240. 247. 352. 391. 395. 366. 434.
 567. 707.
 - Lauri 391. 434. 567. 606.
Balsama nocent in nephritide 239. non tuta sunt in dysen-
 teria 533. quid de eorum usu statuendum in vomica
 pulmonum? 421. laudata 494. 581. 606.
Balsamum Augustanum 656.
 - de Copaiua 421. 602.
 - Embryonum 669. 671.
 - Peruvianum 337. 386. 393. 421. 443. 602.
 - Scherzeri 336. 656.
 - Stomachicum 505.
 - Vitae 386. 391. 434.
Bilis Lucii piscis 532. anguillaris. ib.
Borax 673.

C.

- Camphora* 175. 433. 529.
Cantharides 89. 150. 353. 395. 618. in purpura repressa
 81. in delirio febrili 881. alienae sunt in variolis con-
 fluentibus 173. si febris adest, vel metuenda sanguinis
 resolutio 373. in lethargo nervorum distentionem pro-
 tulerunt ib.
Cardannomum 146. 707.
Caricae pingues 128. 220. 239. 397. 401. 411. 635.
Caryo

INDEX II.

- Caryophyllus aromaticus* 359.
Cassia lignea 116. 255. 398. 442. 446. 488. 543. 549. 600.
C. floreana 344. 460. 677.
Cerasa 136. 137. 169. 190. 438. 627.
Cerussa 659.
Chocolata 700. 706.
Cinnabaris 90. 127. 161. 173. 303. 359.
Cinnamomum 139. 145. 499. 500. 707.
Clyssus Antimonii 135. 445.
Coffee 667. 697. 700. 706. eius abusus multum confert
 ad purpuram scorbuticam 161.
Colocynthis 385.
Colysium Lanfrancii, 619.
Conchae praeparatae 127. 425. 454. 482. 666. 667. citra-
 tie 281.
Confectio Alkermes 145. 656.
 Strobilorum Pini 606.
Conserua florum persicorum 530.
 - rosarum pallidarum 601.
 - rosarum rubrarum 421.
 - visceralis 248. 313. 337. 442. 505.
Corallia 91. 268. 281. 310. 420. 488. 529. 606. 652. 668.
Cornu cerui 79. 116. 159. 161. 256. 276. 281. 321. 322.
 335. 466. 511. 529. 549. 683. 695. 707.
Cortex Aurantiorum 104. 553. 560.
 - Cascarillae 72. 130. 330. 340. 412. 442. 446.
 - Peruvianus, qua ratione agat? 73. sqq. 105. 107.
 110. 117. 174. 203. 248. 255. 277. 366. 391.
 421. 425. 442. 468. 500. 505. 529.
 - Simaroubae 513.
 - Winteranus 286. 391. 395. 396. 442. 446. 505.
 553. 567.
Cremor tartari 103. 105. 110. 120. 145. 178. 192. 199. 266.
 287. 291. 353. 359. 364. 382. 386. 396. 401. 405. 445.
 467. 482. 483. 517. 520. 568. 600. 601. 627. 662. 667.
Creta 454.
Crocus 128. 175. 398. 461. 477. 618.
 - antimoniatu 313. 468. 482.
 - Martis. 505. 581.
Crystallus montana 191. 604. 683. 690. aliena est in in-
 flammatione ventriculi 230.
Cuminum 506.
Cydonia 446. 506. 543. 606.

INDEX II.

D.

- Decoſtum* Antiuenerereum 613. proficit obefis, nocet adſtri-
ctis corporibus ib.
- Auenae excorticatae 123. 128. 136. 180. 303.
320. 325. 416. 425.
- Chinae 322. 341. 367.
- Cichorei 467. laudatur in malo hypochondr.
ib. in ſcirrho lienis 472. in ſcirrho haepatis
477.
- Cornu cerui 355.
- Euiſeti 321.
- Furfuris 533.
- Graminis 501.
- Hordei 85. 126. 136. 161. 295. 310. 321. 416.
419. 425. 533.
- Mercurii viui 353.
- Sedi vermicularis, laudatur in ſcorbuto 626.
- Tartari 268. 291.
- Vrticae maioris 321.
Dentes Hippopotami 281.
Diacodium Montani 230. 320. 401. 416. 425. 652.
Diagrydium 287. 373. 387. 530. 569. 681.
Diaſcordium Fracaſtorii 92. 174. 290. 425. 493. 501. 506.
512. 525. 618. 668. 679.

E.

- Ebur* 255. 683.
Elaeterium 569.
Electuarium de Hierapicta 517. 618.
Eleoſaccharum 128. 180. 691.
Elixirium ſtomachicum Hofmanni 119. 312.
- proprietatis 285. 312. 507. 643.
- viſcerale Hofmanni 337.
- veterinum Crollii 285. 460.
Emplaſtrum de Ammoniaco 473.
- de cicuta 473. 478.
- de cumino 340.
- diaphoreticum Mynſichti 323. 478. 681.
- Malacticum 307. 323.
- de Meliloto 159.
- Oxycroceum 443.
- Saponarum Barbette 426. 643.

Empla-

INDEX II.

- Emplastrum* de spermate Ceti 687.
 - de Tacamahaca 443. 544.
Essentia Absynthii 255. 499. 517. 533.
 - Alexipharmaca, 104. 129. 169. 172. 182. 220.
 225. 391. 643.
 - Amara 312.
 - Aristolochiae 359.
 - Carminatiua 119. 337.
 - Cascarillae 344. 499. 500. 512.
 - Castorei 344. 354. 460. 533. 631. 636. 686.
 - Centaurii minoris 482.
 - Corticum Aurantiorum 517. 553. 668.
 - Euphorbii 359.
 - Gentianae 517. 553.
 - Fumariae 588.
 - Glycyrrhizae 130. 220. 397.
 - Myrrhae 90. 285. 588. 613.
 - Pimpinellae 130. 160. 220. 285. 359. 426. 601.
 619. 630.
 - Succini 336. 347. 352. 353. 402. 412. 588. 640.
Extractum Absynthii 252. 472.
 - Cascarillae 219.
 - Castorei 288. 461.
 - Centaurii minoris 445. 472.
 - Cichorei 552.
 - Cochleariae 472.
 - Esulae 569.
 - Fumariae 472.
 - Hellebori 312. 373. 392.
 - Opii 340.
 - Panchymagogum Crollii 287. 347. 365. 386.
 392. 435. 601. 613. 681. 709.
 - Peti 395.
 - Squillae 395. 567.

F.

- Fel tauri* 373. 530.
Flores Chamomillae 129. 162. 207. 220. 240. 299. 303. 335.
 395. 410. 482. 483. 520. 555. 600. 619. 664. 678. 680.
 694.
 - Hyperici 421.
 - Lavendulae 391.
 - Liliorum alborum 207. convallium 391.

Fibres

INDEX II

Flores Naphae 172.

- Papaveris 410. 634.
- Perficorum 425.
- Rosarum 225. 258. 277. 421.
- Sambuci 129. 160. 162. 225. 226. 588.
- Sulphuris 341. 421. 433. 589. 591.
- Verbasci 160. 230. 241. 335. 410. 482. 485. 619. 664.

Folia

- Lactucæ 606.
- Lauri 606.
- Parietariæ 600.
- Sennæ 105. 123. 128. 266. 286. 336. 351. 353. 359. 382. 386. 395. 396. 412. 419. 421. 477. 569. 594. 601. 606. 617. 618. 626. 634.

Fruentum Saracenicum 169.

Furfur 230. 590.

G.

Gelatinæ 55.

Gilla Paracelsi. 375. 385. 433. 700.

Gossypium 359.

Gummi Ammoniacum 302. 395. 397. 411. 412. 435. 446. 467. 472. 524. 538. 552. 574.

- Benzoe 347. 549. 707.

- Elemi 665.

- Galbanum 460. 461. 467. 529. 552.

- Tacamahaca 549.

H.

Herba Abrotani. 286. 529. 567.

- Absynthii 182. 286. 442. 446. 473. 529. 567. 664.

- Acetosæ 137. 182. 205. 255. 472. 478. 487. 627. 629.

- Acriuiolæ 472.

- Adianthi albi 520.

- Agrimonie 529. 543. 594. 606.

- Alchymillæ 271. 421. 606.

- Angelicæ 286.

- Artemisiæ 552. 553. 664. 707.

- Beccabungæ 482. 567. 628.

- Betonicæ 172. 352. 386. 391. 544. 641.

Herba

INDEX II.

- Herba* Bistortae 271.
 - Bryoniae 482.
 - Capillorum Veneris 172. 220. 240. 256. 402. 589.
 - Cardui benedicti 172. 182. 226. 252. 255. 402. 416.
 434. 561. 594.
 - Cardui Mariae 276.
 - Centaurii minoris 182. 252. 442. 446. 482. 529.
 560. 567.
 - Centumpodii 276.
 - Chamaedrios 641.
 - Cicutae Epilepsiam inducit 648.
 - Cochleariae 252. 416. 425. 472. 524. 567. laudatur in
 scorbuto 628. eius praeparata nullius usus sunt
 ibid.
 - Cuscutae 567. 588.
 - Endiuiae 205. 627. 662.
 - Fagopyri 239.
 - Fumariae 182. 252. 396. 402. 524. 552. 560. 567.
 588. 594. 628.
 - Hyoscyami 351.
 - Hyperici 258.
 - Hyssopi 399. 549.
 - Lactucae 230. 627. 662.
 - Lauendulae 352.
 - Maioranae 352. 549. 664. 707.
 - Malicorii 606.
 - Maluae 241. 410. 680.
 - Marrubii 396. 544. 552. 567.
 - Matricariae 286. 349. 664.
 - Meliloti 482.
 - Melissae 104. 247. 303. 352. 391. 543. 549. 552.
 588. 606. 641. 664. 707.
 - Menthae 286. 544. 549. 606.
 - Millefolii 255. 256. 271. 399. 421. 488. 543. 606.
 - Nasturtii 182. 472. 478. 482. 561. 594. 628.
 - Origani 549.
 - Pareirae brauae 240.
 - Parietariae 410. 664.
 - Petroselinii 205. 239. 240. 255. 287. 478.
 - Peti 246.
 - Pulegii 606. 707.
 - Raphani 628.
 - Rorismarini 286. 352. 544. 567. 606. 707.
 - Rutae 226. 529. 553.

N

Herba

INDEX II.

- Herba Salviae* 172. 182. 225. 253. 352. 386. 391. 606. 641.
 Saniculae 421.
 Saponariae 594.
 - *Scabiofae* 219. 277. 399.
 - *Scolopendrii* 473. 588.
 - *Scordii* 182. 226. 402. 529. 567.
 - *Sedi vermicularis* 626.
 - *Serpilli* 352. 544. 707.
 - *Tanacetii* 529.
 - *Trifolii fibrini* 396. 434. 529. 594. 628.
 - *Tormentillae* 271.
 - *Verbasci* 225.
 - *Veronicae* 129. 182. 219. 253. 256. 258. 277. 399.
 402. 421.
 - *Vrticae minoris* 421.
Hirudines 313. 391. in lethargo ex suppressis haemorrhoidibus 374.
Horaei fructus 162.
Hordeum 63.

I.

- Infusum* *Corticis aurantiorum* 543.
 - *Corticis peruuiiani cum limatura Martis* 110. 113.
 442. 467. 545. 570.
 - *Foeniculi* 543.
 - *Malicorii* 543.
 - *Millefolii* 543.
 - de pedra del porco 93.
Lulapjum rosatura 425.

L.

- Lac* 161. 225. 240. 295. 567. 600. 671. vomicae rapturam maturare potest 419.
 - *asuinum* 182. 257. 561.
 - *caprillum* 182. 467. 478.
Lactuca 205. 466.
Lapides cancerorum 110. 225. 282. 303. 322. 364. 412.
 420. 425. 442. 454. 482. 488. 589. 681.
Lapis Bezoar 93. 145. 159. 170.
 - *infernalis* 354.
 - *Manati* 310.
Laudanum liquidum 241. 288. 340. 635.
 - *opiatum* 288. 340.

Lignum

INDEX II.

- Lignum Guaiacum* [549.](#) [588.](#) [613.](#)
 - Santalinum [352.](#) [549.](#)
 - Sanctum [341.](#) [601.](#)
 - Sassafras [341.](#) [347.](#) [352.](#) [392.](#) [402.](#) [434.](#) [561.](#) [588.](#)
[594.](#) [601.](#) [613.](#) [619.](#)
Limnura Martis [441.](#) [442.](#) [448.](#) [553.](#) [560.](#)
Liquor anodynus Hoffmanni [85.](#) [90.](#) [225.](#) [336.](#) [386.](#) [404.](#)
[426.](#) [460.](#) [517.](#) [520.](#) [581.](#) [582.](#) [635.](#) [642.](#) [654.](#)
[668.](#)
 - Cornu cerui succinatus [374.](#) [386.](#) [391.](#) [434.](#)
 - Perlarum [139.](#)
 - terrae foliatae tartari [84.](#) [110.](#) [127.](#) [182.](#) [252.](#) [282.](#)
[338.](#) [414.](#) [425.](#) alienus est in phthisi, vbi diar-
 rhoea superuenit ib. [445.](#) [446.](#) [472.](#) [482.](#) [483.](#)
[488.](#) [517.](#) [520.](#) [569.](#) [634.](#)
Lucii mandibulae [281.](#)
Lumbrici terrestres [653.](#)

M.

- Macis* [499.](#)
Magnesia alba [105.](#) [231.](#) [445.](#) [448.](#) [451.](#) [454.](#) [482.](#) [499.](#)
[532.](#) [569.](#) [681.](#)
Mamma Calabrina [120.](#) [123.](#) [145.](#) [162.](#) [173.](#) [246.](#) [251.](#) [276.](#)
[287.](#) [291.](#) [302.](#) [315.](#) [336.](#) [338.](#) [359.](#) [386.](#) [396.](#) [401.](#) [419.](#)
[421.](#) [425.](#) [445.](#) [461.](#) [467.](#) [472.](#) [517.](#) [570.](#) [600.](#) [601.](#) [617.](#)
[634.](#) [642.](#) [662.](#) [667.](#) [697.](#)
Margaritae [681.](#)
Martialia [107.](#) [360.](#) [366.](#) [468.](#) [482.](#) [505.](#) [517.](#) [553.](#) [558.](#)
Massa Pilularum de Succino Cratonis [287.](#)
Masslix [347.](#) [353.](#) [359.](#) [374.](#) [549.](#) [707.](#)
Mater Perlarum [159.](#) [514.](#) [652.](#) [690.](#)
Medulla Rhabbarbari [652.](#) [690.](#) [692.](#)
Mel [225.](#) [295.](#) [373.](#) [472.](#) [520.](#) [550.](#)
 - rosatum [619.](#) [630.](#)
Mercurius [594.](#) in Ileo morbo [246.](#) in [surditate] laudatus
[354.](#) ad ptyalismum datus raro bonus in paralyfi [392.](#)
 quomodo in Lue venerea adhibendus sit? [614.](#) sqq. in
 scorbuto non sine periculo est [629.](#)
 - dulcis quid de eo statuendum in variolis confluenti-
 bus? [173.](#) [287.](#) [365.](#) [386.](#) [529.](#) [530.](#) [587.](#) [591.](#)
[594.](#) [601.](#) [604.](#) [613.](#) in Lue venerea laudatur
[614.](#) [681.](#) [695.](#) [707.](#) [709.](#)
Millepedae [240.](#) [538.](#)

INDEX II.

- Mina Cydoniorum* 606.
Nixtura simplex 137.
Mixa §17.
Mucilago feminum Cydoniorum 659.
 corticis medii florum Tiliae 590.
Muscus Corallinus §29. 653.
 Cranii humani 653.
Myrrha 461. §29. §52.

N.

- Nitrum* 82. 85. 87. 91. 103. 110. 115. 120. 127. 137. 138.
 159. 162. eius abusus varia oculorum vitia relinquit
 168-169. 172. 190. 225. 231. 246. 276. 281. 288. 291.
 310. 320. 322. 364. 420. 433. 445. 451. 454. 482. 483.
 488. 499. §20. §74. §38. §54. §67. 600. 604. 628. 630.
 634. 652. 666. 667. 668. 671. 681. 692. 694. 706. 707.
 710.
Nux Myristica 499. §06.

O.

- Oleum* 138. 295. 492. §20. §79. 667.
 - *Abfinibii* 443.
 - *Amygdalarum dulcium* 162. 230. 320. 410. 492.
 §12. §17. §33. §44. 618. 698.
 - *Anethi* 323. §17. 698.
 - animale Dippellii 653.
 - *Anisi* 443.
 - *Capparum*, specificum in scirrho lienis 473.
 - *Carui* 443.
 - *Caryophyllorum* 359. 386. 443. 656.
 - *Castorei* §17.
 - *Chamomillae* §17.
 - *Foeniculi* 443.
 - *Hyoscyami* 351.
 - *Lauendulae* 336. 368. 382. 386.
 - *Ligni Rhodii* 336.
 - *Liliorum alborum* 221. 316. 425. 618. 670. 695.
 - *Lni* 176.
 - *Macis* 386. 443.
 - *Maioranæ* 443.
 - *Melissæ* 443.
 - *Menthae* 443.

Oleum

INDEX II.

- Oleum Nuciflae* [337.](#)
- Salviae [386.](#)
- Tartari per deliquium [148.](#)
- Verbasci [316.](#) 425.
Opiata nocent in febris 88. in Colica [522.](#) [524.](#) in Rheumatismo 655.
Opium nocet in phrenitide [199.](#) potest tamen ab initio nonnumquam dari ib.
Oroponax [529.](#)
Offi sepie [529.](#)
Oxycratum 198. [271.](#)
Oxymel 83. 138. [169.](#) 190. [219.](#) 225. 323. 351. [483.](#) [492.](#) 662. [686.](#) [691.](#)
- Squilliticum [84.](#) 335. [366.](#) 392. [397.](#) [411.](#) [435.](#) [446.](#) [538.](#) 574. 686. 691. 699. 700. 706.
Oxyfaccharum [483.](#)

P.

- Panacea Lemery* [589.](#) [591.](#) 601. 614.
Passulae [83.](#) [123.](#) [128.](#) [231.](#) [246.](#) [276.](#) [287.](#) 291. 315. 397. [401.](#) [411.](#) 419. 425. [482.](#) [483.](#) [488.](#) [517.](#) 520. [532.](#) 606. 627. 634. 635. 662. 667.
Pilulae de Ammoniac [118.](#) [396.](#) [446.](#)
- Bècheri 105. [110.](#) 115. [120.](#) [162.](#) [246.](#) 285. [291.](#) 395. [412.](#) [446.](#) 454. [461.](#) [499.](#) 505. 511. [517.](#) 522. 530. [532.](#) 549. 552. [576.](#) 581. 673. 677. 680. 709.
- de Panchymagogo Crollii [587.](#)
- Stahlii [247.](#) [252.](#) [253.](#) [286.](#) [287.](#) [289.](#) [299.](#) [303.](#) [312.](#) [461.](#) [467.](#) [477.](#) [482.](#) [518.](#) 552. 560. [567.](#) 662.
- de Succino Cratonis [336.](#) [338.](#) 347. 353. 365. 386. 601. [613.](#)
- Wildegansii 635.
Pulvis Beroardicus 110. 145. [159.](#) 174. [426.](#) [433.](#)
- Birkmanni [107.](#) [337.](#) [366.](#) [442.](#) 581.
- Cascarillae 500.
- Castorei 668.
- de Cynoglossa [412.](#)
- rad. Iulappae [560.](#)
- Rhabarbari 405. [412.](#) [437.](#) [446.](#) [499.](#) 618. 667. 668. 679. 694. 699.
- Squillae compositus Stahlii 567.

INDEX II.

R.

- Radix Allii** 173. 529. 567. laudatur in delirio febrili 88.
- **Althaeae** 160. 239. 241. 247. 335. 351. 410. 416.
483. 492. 553. 555. 588. 600. 619. 680.
 - **Angelicae** 395. 529.
 - **Apii** 239. 286. 416. 478. 525. 561.
 - **Ari** 395. 396. 446. 505. 506. 553. 707.
 - **Aristolochiae** 286. 395. 396. 529. 553. 567.
 - **Asparagi** 240. 484.
 - **Bardanae** 392. 412. 588. 594. 601. 613.
 - **Bistortae** 606.
 - **Bryoniae** 395. 396. 505. 560. 567. 594.
 - **Capparis** 473.
 - **Cariinae** 529.
 - **Caryophyllatae** 253. 395. 402. 434.
 - **Chelidonii** 484.
 - **Chinae** 258. 312. 392. 398. 402. 442. 446. 488.
543. 588. 594. 601. 613. 629.
 - **Cichorei** 104. 116. 159. 169. 172. 182. 205. 220.
225. 253. 255. 256. 287. 312. 335. 416. 482.
488. 543. 560. 561. 600. 606. 634. 635. 641.
662. 680.
 - **Costi dulcis** 434. 505. 553.
 - **Curranae** 484.
 - **Cyperi rotundi** 288.
 - **Dictamni albi** 529.
 - **Enulae** 446.
 - **Eryngii** 535.
 - **Foeniculi** 239.
 - **Galangae** 446. 529.
 - **Gentianae rubrae** 442. 446. 529. 567. pro-specifico
habetur in febribus intermittentibus 72.
 - **Glycyrrhizae** 219. 239. 240. 247. 256. 321. 397. 401.
410. 416. 482. 483. 535. 543. 588. 615. 634.
635.
 - **Graminis** 219. 225. 239. 253. 322. 478. 488. 543.
615.
 - **Helonii** 553. 560. 567.
 - **Hellebori** 286. 365.
 - **Isatippae** 373. 569. 594. 613.
 - **Imperatoriae** 567.
 - **Ipecacuanhae** 84. 110. 192. 405. 502. 511. 666.
optimum emeticum est in Cholera 492.

Radix

INDEX II.

Radix Iridis Florentinae 367. 396.

- *Leuistici* 707.
- *Mecchoacannae* 505. 569. 594.
- *Pareirae bravae* 635.
- *Petasitidis* 567.
- *Petroselinii* 416. 478. 483. 561.
- *Pimpinellae* 286. 353. 354. 359. 379. 395. 396. 434.
505. 553. 560. 567. 594. 601. 613.
- *Polypodii* 402. 482. 543.
- *Pyretri* 353. 354.
- *Rhabarbari*, magni vsus est in febribus 63. 105. 110.
145. 162. 173. 182. 188. 192. 253. 256. 282.
286. 302. 338. 353. 367. 386. 391. 396. 412.
445. 446. 477. 482. 485. 492. 505. 511. 517.
530. 532. 543. 552. 560. 582. 617. 626. 666.
667. 671. 677. 691. 700. 701. 706.
- *Saffaparillae* 104. 116. 129. 159. 161. 182. 220.
253. 256. 341. 402. 561. 588. 601. 613. 615.
629. 635. 641.
- *Scorzonerae* 104. 116. 159. 161. 164. 172. 182. 205.
225. 231. 239. 247. 253. 255. 256. 303. 321.
335. 402. 410. 419. 466. 478. 511. 535. 543.
561. 588. 600. 635. 680.
- *Squillae* 395. 529. 567.
- *Symphyti* 421.
- *Taraxaci* 104. 228. 478. 482. 553.
- *Tormenthillae* 606.
- *Valerianae* 396. 567. 594.
- *Vincetoxici* 104. 129. 396. 402. 434. 482. 545. 553.
594. 606.
- *Zedoariae* 446. 505. 529.
- *Zingiberis* 446. 505.

Resina Lalappae 347. 587.

Regulus Antimonii medicinalis specificum in scabie 589.

Rheum 120. 123. 160. 178. 247. 336. 414. 451. 454. 477.
662.

Ribesum 190. 206. 527. 627.

Roob Ceraforum 136. 169. 483.

- *Ribesiorum* 169. 483.

Rubinus Sulphuris Rulandi 421.

Rubus Idaeus 190.

INDEX II.

S.

Sabina 286.

Saccharum 128. 145. 434. 505. 509. 533.
- Saturni 607.

Sal alienum in purpura 160.

- *Abfynthii* 115. 448. 482. 467. 569. 662.
- *Ammoniacum* 581. specif. in febribus intermittenti-
bus 72.
- *Anglicum volatile* 656.
- *Cardui benedicti* 103. 115. 448. 467. 482. 552. 662.
- *Catharticum* 84. 103. 105. 266. 359. 382. 395. 396.
405. 412. 421. 445. 454. 461. 477. 482. 532.
626. 630. 681.
- *Commune* 190. 271. 571. 667.
- *Cornu Cerui volatile* 368.
- *Gemmae* 517.
- *Hellebori nigri* 552.
- *Mirabile Glauberi* 115. 482.
- *Scipitum fabarum* 482. 569.
- *Tachenii* 626.
- *Thermiarum Carolinarum* 103. 115. 118. 364. 454.
467. 482. 505. 560. 569. 626. 662.
- *Vitrioli albi* 375. 700.
- *Volatile Cornu Cerui* 641.
oleosum Syluii 386. 391. 434. 446.

Sanguis Draconis 630.

- humanus decoctus 653.

Sapo Venetus 324. 425. 446. 467. 472. 552. 560. 662.
691. 700.

Saturnina aliena in malo hysterico 461.

Sebesten 128. 401. 411.

Semen Anisi 172. 182. 220. 336. 391. 395. 399. 506. 533.
694. 707.

- *Cardui benedicti* 253.
- *Cardui Mariae* 159. 172. 219. 232. 397. 514.
- *Carui* 286. 336. 347. 398. 442. 446. 501. 512. 518.
520. 668. 683.
- *Chaerephylis* 220. 225. 255. 256. 277. 303. 421. 524.
- *Coriandri* 386. 391.
- *Cubebarum* 386.
- *Foeniculi* 104. 116. 159. 161. 172. 182. 220. 255.
286. 347. 352. 391. 395. 398. 399. 402. 434.
442.

INDEX II.

442. 446. 482. 484. 501. 506. 512. 533. 543.
600. 707.
- Nasturtii aquatici 482.
 - Nigellae 668. 683. 694.
 - Papaveris 88. 129. 159. 172. 205. 219. 225. 230.
239. 241. 268. 276. 397. 482. 514. 634.
 - Petroselinii 482. 707.
 - Santonici 529. 530.
 - Sinapi 173. 529. alienum in vertigine 368.
- Serum Lactis 169. 190. 239. 254. 320. 402. 483. 533. 588.
622. 662. chalybeatum 321. 472.
- Sigillum Salomonis 271.
- Species de Hyacintho 91.
- Specificum Cephalicum 90. 359. 652. 653. 698.
- Scabii antiphlogisticum 653.
- Sperma Ceti 128. 180. 410. 466. 698. 699.
- Spiritus bezoardicus Buffii 90. 336. 391. 404. 634. 642.
- Cochleariae 630.
 - Cornu Cerui 374. 386. 412. 434.
 - Formicarum 393.
 - Lumbricorum terrestrium 393.
 - Nitri 135. 282. 517. 634.
 - Salis ammoniaci 368. 382. 460. 656. alienus in epilepsia 651. anisatus 412. cum calce viva 373. communis 135.
 - Sanguinis humani 653.
 - Sulphuris 443.
 - Vini camphoratus 354. 393.
 - Vitrioli 135. in variolis confluentibus 173. specificum in Soda 454.
- Stannum pulverisatum 529.
- Stercus Pauonis 653.
- Succinum 336. 606.
- Succus Citri 91. 110. 127. 136. 164. 225. 276. 295. 310.
375. 412. 420. 425. 454. 488. 492. 549. 629. 668. 681.
- Glycyrrhizae 128. 401.
- Sulphur 412. omittendum in Scabie, si febris accessit 589.
Antimonii 433. 594.
- Syrupus, acetositis citri 136. 205.
- de Althaea 128. 219. 220. 230. 240. 396. 401. 416.
574. 652.

I N D E X II.

Syrupus Capillorum Veneris [128.](#) [220.](#) [396.](#) [401.](#) [410.](#) 425.
574. 673. 699.

- de Cichoreo cum Rhabarb. [276.](#) 483. 587. 690. 691.
- Coralliorum 656.
- de Eryfimo Lobelii [401.](#)
- Fumariae [591.](#)
- Persicorum 530. 690.
- Rhamni Cathartici [567.](#)
- Rosarum pallidarum [425.](#) 601.
- Rubi Idaei [433.](#)
- de Spina Cerni [567.](#) [587.](#)
- Violarum 225. [230.](#) 634.

Syrupi alieni sunt in phthisi, vbi diarrhoea superuenit
425.

T.

Tabacum, eius abusus plurimum confert ad purpuram scorbuticam 164.

Tamarindi [83.](#) 105. 123. [145.](#) [190.](#) [199.](#) 225. [246.](#) 255.
[276.](#) [287.](#) [291.](#) [302.](#) [315.](#) [338.](#) [351.](#) [382.](#) 401. [419.](#) [421.](#)
425. 445. [461.](#) [467.](#) [472.](#) [482.](#) [483.](#) 520. [532.](#) 587. 600.
626. 634. 662.

Tartarus emeticus 385. [392.](#) [405.](#) [433.](#) [569.](#) non fatis tu-
tus in Cholera [492.](#)

- *tartarifatus* 115. [414.](#) [443.](#) [482.](#) 505. [517.](#)
- *vitriolatus* [84.](#) 105. 115. [266.](#) [338.](#) [433.](#) [437.](#) [443.](#)
[482.](#) 700.

Terra Catechu [271.](#) [281.](#)

- foliata tartari. [238.](#) [414.](#) 445. [482.](#) [568.](#)
- Sigillata. [281.](#) aliena in inflammatione ventriculi
[230.](#)

Terrea aliena sunt in Cephalalgia 338.

Testudines [425.](#)

Thee 128. 410. [697.](#)

There.

INDEX II.

Terebinthina 492. 501. 514. 529. 581. 602. aliena in nephritide 239.

Theriaca 230. 340.

- Andromachi 92. 174. 425. 493. 501. 525.
- coelestis 493.

Thermæ 254. 266. 289. 340. 366. 392. 450. 461. 529.
in Epilepsia quando salutares? 652. in sterilitate mul-
tum efficiunt 664. vomitam pulmonum relinquunt.
419.

- Aquisgranenses 446. 707. in Soda laudatæ 454.
- Carolinae 286. 405. 446. 461. 466. 482. 505 549.
552. 560. 641. 665. dubiæ in gonorrhoea
606.
- Toeplitenses 549. 606. 636. 665. in chlorosi lau-
dantur 553.
- Wildungenfes 636.
- Wolkensteinenses 636.

Tibus 549. 707.

Tinctura Antimonii 336. 347. 352. 352. 374. 402. 412.
434. 549. 560. 569. 588. 601. 604. 613. 635.

- Antivenerea 613.
- Coralliorum 282. 386.
- Fuliginis cum Spiritu Salis Ammoniaci 760.
- Martis helleborata Wedelii 286.
- Martis Ludovici 107. 282. 286. 313. 337. 442.
477. 482. cum succo pomorum Borsdorf.
477. cum vino Maluatico 442.
- Martis tartarifata 442.
- Salis tartari 570. Harucana 560.
- Tartari 560.
- terræ Catechu 276.

INDEX II.

V.

Vinum [104.](#) 116. [119.](#) 136. 145. 477. [484.](#) 500. 501.
517. 543. 552. 553. 567. 570. 594. 643. 662. 665.
709.

Viperae 588.

Virga aurea [421.](#)

Viscus quernus 653.

Vitellum onorum [276.](#) [277.](#) [425.](#) [460.](#) [492.](#) 501. 581. 604.
613. 618. 662. 679.

Vnguentum Agrippae [530.](#)

- de *Althaea Fernelii* [460.](#)

- de *Cerussa* [590.](#)

- de *Linaria* [525.](#)

- *Neapolitanum* [590.](#) 601.

- *Pomatum* 670.

Vngula Alcis 653.



